C. DUMITRESCU FL. SMARANDACHE

METODE DE CALCUL ÎN ANALIZA MATEMATICĂ

TEORIE ȘI PROBLEME

PROBLEME
de
MATEMATICA si FIZICA
SERIE PENTRU LICEU

EDITURA INFOMED

Craiova - 1995

METODE DE CALCUL

ÎN

ANALIZA MATEMATICĂ

Teorie și probleme

Referenți științifici:

Lect.dr. Paul Popescu
Prof. Gheorghe Constantin

METODE DE CALCUL

ÎN

ANALIZA MATEMATICĂ

Teorie și probleme

C. Dumitrescu Fl. Smarandache

Editura INFOMED

Craiova 1995

© 1995 Editura INFOMED

METODE DE CALCUL ÎN
ANALIZA MATEMATICĂ.
C. Dumitrescu , Fl. Smarandache
Toate drepturile rezervate Editurii INFOMED.

ISBN : 973 - 96940 -0 - 4

Editura INFOMED Craiova
Calea București
bl. b4, sc. 1, ap. 4.
Tel. 051 / 416759

Consilier editorial: Ing. Saul Pasăre

Tehnoredactare computerizată:
Constantin Antoniu Dumitrescu

Motto: Iubirea este ţelul,porunca sacr-a firii.
Mânaţi de ea vulturii se caută prin spaţii,
Delfinele iau marea în piept să-şi afle mirii
Chiar stelele în ceruri se-njugă-n constelaţii.

(Vasile Voiculescu)

CUVANT INAINTE

Ne bucurăm exprimând mulţumirile noastre faţă de toţi acei,cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi,care de-a lungul anilor ne-au ajutat să ajungem la această carte.Sunt mulţi,sunt foarte mulţi cei care ne-au ajutat... Unii ne-au dat sugestii,alţii ne-au oferit idei, uneori ne-am străduit împreună să descifrăm un amănunt nelămurit, alteori învăţam din întrebările meşteşugite sau poate chiar naive ale interlocutorilor noştrii.

Devenirea spre această carte este un foarte bun exemplu de altruism,de bunătate şi dăruire,de mers împreună pe drumul descoperirii frumuseţilor vieţii.

Cine gândeşte nu doar la mama sa şi la tatăl său,la sine şi la familia sa,descoperă o familie mult mai mare,descoperă pretu-,

tindeni viața,pe care începe să o iubească tot mai mult în toate formele ei de manifestare.

Matematica ne ajută pe acest drum,solicitându-ne și îmbogățindu-ne nu doar capacitățile intelectuale,gândirea,logica și algoritmii noștrii de decizie,dar în multe feluri contribuie și la îmbogățirea noastră sufletească.Ne ajută să facem ordine și lumină acolo unde la început simțeam că este posibilă doar o evoluție empirică - în noi înșine.

Pentru elevi și profesori,pentru candidații la concursul de admitere în învățământul superior,pentru toți cei interesați,oferim această succesiune de metode întîlnite în studiul analizei matematice de liceu,care să le permită reducerea a cât mai diverse probleme noi la cât mai multe scheme de lucru deja cunoscute.

Am urmărit prezentarea într-o manieră metodică,avantajoasă pentru cititor,a celor mai frecvente metode de calcul întâlnite în studiul analizei matematice la acest nivel.

Astfel,în această carte puteți găsi:

- metode pentru demonstrarea egalităților de mulțimi,
- metode pentru demonstrarea bijectivității funcțiilor,
- metode pentru studiul monotoniei șirurilor și funcțiilor,
- metode comune pentru calculul limitelor de șiruri și de funcții,
- metode specifice pentru calculul limitelor de șiruri,
- metode pentru studiul continuității și a derivabilității,
- metode pentru a determina existența rădăcinilor unei ecuații,
- aplicații ale teoremelor lui Fermat,Rolle,Lagrange,Cauchy,

- metode pentru demonstrarea unor egalităţi şi inegalităţi,
- metode pentru a arăta că o funcţie are primitive,
- metode pentru a arăta că o funcţie nu are primitive,
- metode pentru a arăta că o funcţie este integrabilă,
- metode pentru a arăta că o funcţie nu este ingrabilă.

Pentru îmbunătăţirea acestei prezentări suntem bucuroşi să primim sugestiile şi observaţiile dumneavoastră.

C. Dumitrescu, Căsuţa Poştală 811
Craiova (1100), Romania

F. Smarandache, P.O. Box 42561
Phoenix, Arizona, U.S.A.

CUPRINS

1. TEORIA MULTIMILOR 13

Operaţii cu mulţimi 14

Metode pentru demonstrarea egalităţilor de mulţimi 18

Proprietăţi ale funcţiei caracteristice 19

Exerciţii 20

2. FUNCTII 34

Definiţia funcţiei 34

Inversa unei funcţii 39

Graficul funcţiei inverse 43

Metode pentru a arăta că o funcţie este bijectivă 44

Exerciţii 47

Monotonie şi mărginire pentru şiruri şi funcţii 54

Exerciţii 60

3. LIMITE DE SIRURI SI DE FUNCTII 66

Limite de funcţii 66

Exerciţii 71

Limite de şiruri 75

Metode pentru calculul limitelor de funcţii şi de şiruri.. 77

Metode comune pentru şiruri şi pentru funcţii..... 77

1. Utilizarea definiţiei 77

2. Darea factorului comun forţat 78

3. Amplificarea cu conjugata 80

4. Utilizarea limitelor fundamentale 81
5. Ceva mărginit înmulţit cu ceva care tinde la zero, tinde la zero 85
6. Metoda majorării şi minorării 86
7. Exerciţii în care apare partea întreagă 90
8. Utilizarea definiţiei derivatei 93
9. Utilizarea teoremei lui l'Hospital 97
10. Utilizarea criteriului cu şiruri (criteriul lui Heine) 100
Metode specifice pentru şiruri 105
11. Orice şir monoton şi mărginit este convergent ... 105
12. Utilizarea lemelor Cesaro-Stolz şi Rizzoli 109
13. Utilizarea teoremei lui Lagrange 114
14. Siruri date prin relaţii de recurenţă 120
A. Recurenţă liniară 120
Recurenţa liniară de ordinul întâi 120
Recurenţa liniară de ordinul doi 120
Recurenţa liniară de ordinul h>2 123
B. Recurenţa neliniară 125
Recurenţă de forma $a_{n+1} = \alpha . a_n + \beta$ 125
Recurenţă de forma $a_{n+1} = \alpha . a_n + f(n)$ 128
Recurenţă de forma $a_{n+1} = f(n)$ 127
Exerciţii 129
15. Orice şir Caúchy de numere reale este convergent 130
16. Utilizarea definiţiei integralei 133

4. CONTINUITATE SI DERIVABILITATE 136
Continuitate 136
Metode pentru studiul continuităţii 136
Tipuri de puncte dediscontinuitate 139
Prelungirea prin continuitate 140
Continuitatea funcţiilor compuse 140
Exerciţii 141
Derivabilitate 144
Definiţie,interpretare geometrică,consecinţe 144
Derivarea funcţiilor compuse 145
Derivate de ordinul n 149
Studiul derivabilităţii 149
Aplicaţii ale derivatei in economie 152
Exerciţii 153
5. TEOREMELE FERMAT,ROLLE,LAGRANGE,CAUCHY 158
Teorema lui Fermat (Enunţ,Interpretare geometrică şi algebrică,Exerciţii) 158
Teorema lui Rolle (Enunţ,Interpretare geometrică şi algebrică,Consecinţe,Exerciţii) 161
Metode pentru studiul rădăcinilor unei ecuaţii 166
Teorema lui Lagrange (Enunţ,Interpretare geometrică şi algebrică,Corolar,Exerciţii) 169
Teorema lui Cauchy (Enunţ,Interpretare geometrică şi algebrică,Exerciţii) 174
6. EGALITATI SI INEGALITATI 177
Egalităţi 177

Inegalităţi 178
Metoda 1 (Utilizarea teoremei lui Lagrange) 178
Metodă 2 (Metoda minimului) 180
Metoda 3 (Inegalităţi pentru integrale fără calculul integralelor) 181
Metoda 4 Utilizarea inegalităţilor din definiţia funcţiilor convexe şi concave) 183
Exerciţii 185
7. PRIMITIVE 191
Conexiuni cu alte noţiuni specifice funcţiilor 191
Metode pentru a arăta că o funcţie are primitive 196
Metode pentru a arăta că o funcţie nu are primitive 197
Exemple 198
Exerciţii 204
8. INTEGRABILITATE 209
Conexiuni cu alte noţiuni specifice funcţiilor 215
Metode pentru a arăta că o funcţie este integrabilă (Riemann) pe [a,b] 217
Metode pentru a arăta că o funcţie nu este integrabilă (riemann) pe [a,b] 217
Exerciţii 223
BIBLIOGRAFIE 228

1. TEORIA MULTIMILOR

O mulţime este determinată cu ajutorul uneia sau mai multe proprietăţi pe care cerem să le satisfacă elementele sale.

Cu această definiţie s-ar părea că putem considera ca mulţime orice totalitate de obiecte. Totuşi lucrurile nu stau aşa.

Dacă presupunem, prin absurd, că orice totalitate de obiecte formează o mulţime atunci totalitatea mulţimilor ar forma la rândul ei o mulţime, pe care să o notăm de exemplu cu M.Dar atunci şi familia $\mathfrak{P}(M)$ a părţilor sale ar forma o mulţime. Am avea deci $\mathfrak{P}(M) \in M$.

Notând prin card M numărul elementelor lui M, vom avea :

$$\text{card } \mathfrak{P}(M) \leq \text{card } M$$

Dar o teoremă datorată lui Cantor arată că avem întotdeauna

$$\text{card } M < \text{card } \mathfrak{P}(M)$$

Prin urmare, în mod surprinzător poate, nu orice totalitate de obiecte poate fi considerată mulţime.

DEFINITIE: Se numeşte mulţime totală, notată cu T , mulţimea obiectelor matematice cu care se lucrează la un moment dat.

De exemplu,

- desenând mulţimi pe foaia de caiet, mulţimea totală este foaia de caiet;
- desenând mulţimi pe tablă, mulţimea totală este mulţimea punctelor tablei.

Prin urmare mulţimea totală nu este unică, ea depinde de felul obiectelor matematice cu care lucrăm la un moment dat.

În diagramele următoare vom reprezenta mulţimea totală printr-un dreptunghi, iar submulţimile lui T prin suprafeţe interioare acestui dreptunghi. O astfel de diagramă se numeşte diagramă Euler-Venn.

Avem în vedere următoarele operaţii cu mulţimi :

1. *INTERSECTIA.*

$$A \cap B = \{ x \in T \mid x \in A \text{ şi } x \in B \}$$

Deoarece la un moment dat lucrăm doar cu elemente din T , condiţia $x \in T$ poate fi subânţeleasă, deci putem scrie:

$$A \cap B = \{ x \mid x \in A \text{ şi } x \in B \}$$



$A \cap B$

Mai general,

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{ x \mid \forall i \in \mathbb{N}, x_i \in A \}$$

Să observăm că:

$$x \notin A \cap B \iff x \notin A \text{ sau } x \notin B$$

2. *REUNIUNEA.*

$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \text{ sau } x \in B \}$$



$A \cup B$

Ca şi în cazul intersecţiei, putem considera:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \{ x \mid \exists i \in \mathbb{N}, x_i \in A \}$$

Se observă că:

$$x \notin A \cup B \iff x \notin A \text{ şi } x \notin B$$

3. *DIFERENŢA.*

$$A - B = \{ x \mid x \in A \text{ şi } x \notin B \}$$



$A - B = C_A B$

Reţinem că:

$$x \notin A - B \iff x \notin A \text{ sau } x \in B$$

4. *COMPLEMENTARA.*

Complementara unei mulţimi A este diferenţa dintre mulţimea totală şi A.

$$C_T A = \{ x \mid x \in T \text{ şi } x \notin A \} = \{ x \mid x \notin A \}$$

Complementara unei mulţimi se mai notează cu CA sau cu $\overline{A}$.



C A

Să observăm că

$$x \notin CA \iff x \in A$$

Mai general, putem vorbi de complementara unei mulţimi faţă de o altă mulţime,oarecare. Astfel,

$$C_A B = \{ x \mid x \in B \text{ şi } x \notin A \}$$

este complementara mulţimii B faţă de mulţimea A.

5. *DIFERENTA SIMETRICA.*

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$



A Δ B

Avem $x \notin A \Delta B \iff x \notin A - B$ şi $x \notin B - A$.

6. *PRODUSUL CARTEZIAN.*

$$A \times B = \{ (x,y) \mid x \in A \text{ şi } y \in B \}$$

Produsul cartezian a două mulţimi este deci o mulţime de pe-

rechi ordonate de elemente, primul element fiind din prima mulţime, iar al doilea element fiind din a doua mulţime.

De exemplu, $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{ (x,y) \mid x \in \mathbb{R} , y \in \mathbb{R} \}$, iar o imagine intuitivă a acestei mulţimi este dată în figura 1.1.



$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Fig. 1.1

Prin analogie, produsul cartezian a trei mulţimi este o mulţime de triplete:

$$A \times B \times C = \{ (x,y,z) \mid x \in A , y \in B , z \in C \}$$

O imagine intuitivă a lui $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ este dată în figura de mai jos.



$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Fig. 1.2

Mai general,

$$\prod_{i=1}^{n} A_i = \{ (x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in A_i \text{ pentru orice } i \in \overline{1,n} \}$$

METODE PENTRU DEMONSTRAREA EGALITATII A DOUA MULTIMI

Dificultăţile şi surprizele întâlnite încercând să definim riguros noţiunea de mulţime nu sânt singurele din teoria mulţimilor.

O altă surpriză este că binecunoscutul (şi intuitiv evidentul) procedeu de demonstrare a egalităţii a două mulţimi prin <u>dubla incluziune</u> este - la nivelul definirii riguroase a mulţimilor - <u>doar o axiomă.</u>

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ şi } B \subseteq A \qquad (1.1)$$

Acceptând această axiomă, vom exemplifica în cele ce urmează următoarele două metode pentru demonstrarea egalităţilor de mulţimi:

(A) DUBLA INCLUZIUNE (exprimată prin echivalenţa (1.1))

(B) UTILIZAREA FUNCTIEI CARACTERISTICE A UNEI MULŢIMI

Dăm mai întâi câteva detalii ale acestei a doua metode, care în practică este mult mai rapidă, deci mai comod de utilizat decât prima metodă.

DEFINITIE. Se numeşte funcţie caracteristică a mulţimii A funcţia $\varphi_A : T \longrightarrow \{0,1\}$ definită prin :

$$\varphi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } x \in A \\ 0 & \text{dacă } x \notin A \end{cases}$$

După cum se observă numerele 0 şi 1 folosesc pentru a împărţi elementele mulţimii totale T în două categorii:

(1) o categorie conţine acele elemente x în care valoarea lui φ_A este 1 (elementele lui A) ,

(2) din a doua categorie fac parte acele elemente în

care valoarea lui φ_A este 0 (elementele care nu sunt in A).

Procedeul (B) de demonstrare a egalității a două mulțimi se bazează pe faptul că orice mulțime este determinată în mod unic de funcția sa caracteristică, în sensul că:

există o bijecție de la mulțimea $\mathcal{P}(T)$ a submulțimilor lui T la mulțimea $\mathcal{F}(T)$ a funcțiilor caracteristice definite pe T. (vezi exercițiul VII)

Așadar,

$$A = B \quad <===> \quad \varphi_A = \varphi_B \tag{1.2}$$

PROPRIETATI ALE FUNCTIEI CARACTERISTICE

φ_1) $\varphi_{A\cap B}(x) = \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x)$

φ_2) $\varphi_{A\cup B}(x) = \varphi_A(x) + \varphi_B(x) - \varphi_{A\cap B}(x)$

φ_3) $\varphi_{A-B}(x) = \varphi_A(x) - \varphi_{A\cap B}(x)$

φ_4) $\varphi_{CA}(x) = 1 - \varphi_A(x)$

φ_5) $\varphi_{A\Delta B}(x) = \varphi_A(x) + \varphi_B(x) - 2\cdot\varphi_{A\cap B}(x)$

φ_6) $\varphi_{A\times B}(x,y) = \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(y)$

φ_7) $\varphi_A^2(x) = \varphi_A(x)$

φ_8) $\varphi_\emptyset(x) \equiv 0$, $\varphi_T(x) \equiv 1$

φ_9) $A \subseteq B \quad <===> \quad \varphi_A(x) \leq \varphi_B(x)$ pentru orice $x \in T$.

Să demonstrăm de exemplu φ_1). Pentru aceasta să observăm că mulțimea totală T este împărțită de mulțimile A și B în cel mult patru regiuni :

1) pentru punctele x care nu aparțin nici lui A nici lui B avem $\varphi_A(x) = \varphi_B(x) = 0$ și $\varphi_{A\cap B}(x) = 0$.

2) pentru punctele x care sunt în A și nu sunt în B avem

$\varphi_A(x) = 1$, $\varphi_B(x) = 0$ şi $\varphi_{A\cap B}(x) = 0$.

3) dacă $x \notin A$ şi $x \in B$

4) dacă $x \in B$ şi $x \notin A$

egalităţile rezultă analog.

EXERCITII

I. Utilizând metodele (A) şi (B) arătaţi că :

1. $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$
2. $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
3. $C(B \cap C) = CB \cup CC$
4. $C(B \cup C) = CB \cap CC$
5. $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$
6. $A \cup (B - A) = A \cup B$
7. $A - (A - B) = A \cap B$
8. $C(CB) = B$
9. $A \cup CA = T$, $A \cap CA = \emptyset$

REZOLVARI:

(A) (dubla incluziune)

Să observăm că pentru rezolvarea unei probleme de matematică răspundem succesiv la grupe de două întrebări :

(q) **CE AVEM DE ARATAT ?**

(Q) **CUM ARATAM ?**

Răspunzând la întrebarea (Q) putem ajunge la o nouă întrebare (q). Astfel, pentru exerciţiul 1 răspunsul la întrebarea (q) este:

(r_1) : avem de arătat o egalitate de mulţimi

iar răspunsul la întrebarea (Q) este :

(R_1) : putem arăta această egalitate prin două metode : utilizând dubla incluziune, sau utilizând proprietăţile funcţiei caracteristice.

Alegem prima metodă şi ajungem din nou la (q).De data aceasta răspunsul este :

(r_2) : avem de arătat două incluziuni,

iar răspunsul la întrebarea (Q) corespunzătoare este

(R_2) : arătăm pe rând câte o incluziune .

Apoi,

(r_3) : avem de arătat o incluziune

(R_3) : arătăm că un element arbitrar din "mulţimea inclusă" este în "mulţimea care include".

Sigur că de obicei tot acest raţionament este mental, rezolvitorul începe prin:

a) fie $x \in A - (B - C)$, oarecare [*pentru a continua citim ultima operaţie (diferenţa)*] , $\Longleftrightarrow$ $x \in A$ şi $x \notin B \cap C$ [*citim operaţia devenită ultima (intersecţia)*] $\Longleftrightarrow$

$$x \in A \text{ şi } \begin{cases} x \notin B \\ \text{sau} \\ x \notin C \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x \in A \text{ şi } x \notin B \\ \text{sau} \\ x \in A \text{ şi } x \notin C \end{cases} \qquad (1.3)$$

Din acest moment nu mai avem operaţii de explicitat şi putem regrupa enunţul la care am ajuns în mai multe feluri (multe implicaţii rezultă din (1.3), dar numai una ne interesează - concluzia exerciţiului) de aceea trebuie să actualizăm concluzia:

$x \in (A - B) \cup (A - C) \quad \Longleftrightarrow \quad x \in A - B$ sau $x \in A - C$

Observăm că din (1.3) rezultă imediat această concluzie, deci incluziunea este demonstrată.

Pentru a doua incluziune: fie $x \in (A - B) \cup (A - C)$, [*citim ultima operaţie (reuniunea)*] $\Longleftrightarrow$

$$\begin{cases} x \in A - B \\ \text{sau} \\ x \in A - C \end{cases} \Longleftrightarrow \text{[citim operaţia devenită ultima]} \Longleftrightarrow$$

$$\begin{cases} x \in A \text{ şi } x \notin B \\ \text{sau} \\ x \in A \text{ şi } x \notin C \end{cases} \quad <===> \quad x \in A \text{ şi } \begin{cases} x \notin B \\ \text{sau} \\ x \notin C \end{cases} \qquad (1.4)$$

Nu mai avem operaţii de explicitat, deci detaliem concluzia la care vrem să ajungem: $x \in A - (B \cap C)$, adică $x \in A$ şi $x \notin B \cap C$, afirmaţie care rezultă imediat din (1.4).

5. (r_1) : avem de arătat o egalitate de mulţimi

(R_1) : arătăm două incluziuni

(r_2) : avem de arătat o incluziune

(R_2) : arătăm că fiecare element din mulţimea inclusă este în mulţimea care include.

Fie $x \in A - (A - B)$, oarecare [*citim ultima operaţie (diferenţa)*] <===> $x \in A$ şi $x \notin A - B$ [*citim operaţia care a devenit ultima*] <===>

$$x \in A \text{ şi } \begin{cases} x \notin A \\ \text{sau} \\ x \in B \end{cases} \qquad (1.5)$$

Nu mai avem operaţii de explicitat, deci reactualizăm concluzia:

$$x \in A \cap B \quad \text{adică} \quad x \in A \text{ şi } x \in B.$$

Observăm că (1.5) este echivalent cu :

$$\begin{cases} x \in A \text{ şi } x \notin A \\ \text{sau} \\ x \in A \text{ şi } x \in B \end{cases}$$

Prima afirmaţie este falsă, iar din a doua rezultă $x \in A \cap B$.

Vom rezolva aceleaşi exerciţii utilizând proprietăţile funcţiei caracteristice şi echivalenţa (1.2).

1. Avem de arătat că $\varphi_{A-(B\cap C)} = \varphi_{(A-B)\cup(A-C)}$

(r_1) : avem de arătat o egalitate de funcţii

(R_1) : deoarece domeniul şi codomeniul celor două funcţii

coincid, mai trebuie arătat că valorile lor coincid, adică

(r_2) : $\varphi_{A-(B\cap C)}(x) = \varphi_{(A-B)\cup(A-C)}(x)$ pentru orice $x \in T$

Răspunsul la întrebarea (Q) corespunzătoare este

(R_2) : explicităm ambii membri ai egalității precedente.

$\varphi_{A-(B\cap C)}(x) =$ [*citim ultima operație (diferența) și aplicăm proprietatea* φ_3] $= \varphi_A(x) - \varphi_{A\cap(B\cap C)}(x) =$ [*citim operația devenită ultima și aplicăm proprietatea* φ_1] =

$$= \varphi_A(x) - \varphi_A(x).\varphi_B(x).\varphi_C(x) \qquad (1.6)$$

Membrul doi al egalității devine succesiv:

$$\varphi_{(A-B)\cup(A-C)}(x) = \varphi_{A-B}(x) + \varphi_{A-C}(x) - \varphi_{(A-B)\cap(A-C)}(x) =$$

$$\left(\varphi_A(x) - \varphi_{A\cap B}(x)\right) + \left(\varphi_A(x) - \varphi_{A\cap C}(x)\right) - \varphi_{A-B}(x)\cdot\varphi_{A-C}(x) =$$

$$\left(\varphi_A(x) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x)\right) + \left(\varphi_A(x) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_C(x)\right) -$$

$$- \left(\varphi_A(x) - \varphi_{A\cap B}(x)\right).\left(\varphi_A(x) - \varphi_{A\cap C}(x)\right) = 2.\varphi_A(x) - \varphi_A(x).\varphi_B(x) -$$

$$\varphi_A(x).\varphi_C(x) - \varphi_A^2(x) + \varphi_A(x)\cdot\varphi_{A\cap C}(x) + \varphi_A(x)\cdot\varphi_{A\cap B}(x) -$$

$$\varphi_A^2(x).\varphi_B(x).\varphi_C(x) = \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x)\cdot\varphi_C(x).$$

5. Pentru a demonstra egalitatea $\varphi_{A-(A-B)}(x) = \varphi_{A\cap B}(x)$ observăm că :

$$\varphi_{A-(A-B)}(x) = \varphi_A(x) - \varphi_{A\cap(A-B)}(x) = \varphi_A(x) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_{A\cap B}(x) =$$

$$\varphi_A(x) - \varphi_A(x)\cdot\left(\varphi_A(x) - \varphi_{A\cap B}(x)\right) = \varphi_A(x) - \varphi_A(x)\cdot\left(\varphi_A(x) -$$

$$\varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x)\right) = \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x) = \varphi_{A\cap B}(x).$$

II. Arătați că :

1. $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times C)$
2. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
3. $(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$
4. $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$

5. $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$

6. $(A \Delta B) \times C = (A \times C) \Delta (B \times C)$

REZOLVARI.

Metoda (A) (dubla incluziune)

1. Fie $x \in (A \cap B) \times (C \cap D)$, oarecare - [*explicitam ultima operatie (produsul scalar)*] $\Longleftrightarrow$ $x = (\alpha,\beta)$, cu $\alpha \in A \cap B$ şi $\beta \in C \cap D$ $\Longleftrightarrow$ [*explicitam operatiile care au devenit ultimele*] $\Longleftrightarrow$ $x = (\alpha,\beta)$ cu $\alpha \in A$, $\alpha \in B$ şi $\beta \in C$, $\beta \in D$ [*nu mai avem operatii de explicitat, de aceea actualizam concluzia:* $x \in (A \times C) \cap (B \times D)$, *deci x apartine unei intersectii (ultima operatie)*] $\Longleftrightarrow$ $x = (\alpha,\beta)$ cu $\alpha \in A$, $\beta \in C$ şi $\alpha \in B$, $\beta \in D$ $\Longleftrightarrow$ $x \in A \times C$ şi $x \in B \times D$.

3. Fie $x \in (A - B) \times C$, oarecare $\Longleftrightarrow$ $x = (\alpha,\beta)$ cu $\alpha \in A - B$ şi $\beta \in C$ $\Longleftrightarrow$ $x = (\alpha,\beta)$ cu $\alpha \in A$ şi $\alpha \notin B$ şi $\beta \in C$ [*detaliind concluzia deducem urmatorul mod de a continua*] $\Longleftrightarrow$

$x = (\alpha,\beta)$, $\alpha \in A$, $\beta \in C$ şi $x = (\alpha,\beta)$, $\alpha \notin B$, $\beta \in C$ $\Longrightarrow$ $x \in A \times C$ şi $x \notin B \times C$.

Reciproc, fie $x \in (A \times C) - (B \times C)$, oarecare $\Longleftrightarrow$ $x = (\alpha,\beta)$ cu $(\alpha,\beta) \in A \times C$ şi $(\alpha,\beta) \notin B \times C$ $\Longleftrightarrow$ $x = (\alpha,\beta)$ $\alpha \in A$ şi $\beta \in C$ şi

$$\begin{cases} \alpha \notin B \\ \text{sau} \\ \beta \notin C \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \alpha \in A \text{ şi } \beta \in C \text{ şi } \alpha \notin B \\ \text{sau} \\ \alpha \in A \text{ şi } \beta \in C \text{ şi } \beta \notin C \quad \text{(fals)} \end{cases}$$

$\Longrightarrow$ $(\alpha,\beta) \in (A - B) \times C$.

Metoda (B) (utilizarea funcţiei caracteristice)

1. $\varphi_{(A\cap B)\times(C\cap D)}(x,y)=\varphi_{A\cap B}(x)\cdot\varphi_{C\cap D}(y)=\varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x)\cdot\varphi_C(y)\cdot\varphi_D(y)$

$$\varphi_{(A\times C)\cap(B\times D)}(x,y) = \varphi_{A\times C}(x,y)\cdot\varphi_{B\times D}(x,y) = \varphi_A(x)\cdot\varphi_C(y)\cdot\varphi_B(x)\cdot\varphi_D(y)$$

3. $\varphi_{(A-B)\times C}(x,y) = \varphi_{A-B}(x)\cdot\varphi_C(y) =$

$= \left(\varphi_A(x) - \varphi_{A\cap B}(x)\right)\varphi_C(y) = \varphi_A(x)\cdot\varphi_C(y) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x)\cdot\varphi_C(y).$

$\varphi_{(A\times C)-(B\times C)}(x,y) = \varphi_{A\times C}(x,y) - \varphi_{(A\times C)\cap(B\times C)}(x,y) = \varphi_{A\times C}(x,y) -$

$- \varphi_{A\times C}(x,y)\cdot\varphi_{B\times C}(x,y) = \varphi_A(x)\cdot\varphi_C(y) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x)\cdot\varphi_C^2(y)$.

4. $\varphi_{A\Delta(B\Delta C)}(x) = \varphi_A(x) + \varphi_{B\Delta C}(x) - 2\varphi_A(x)\cdot\varphi_{B\Delta C}(x) =$

$\varphi_A(x) + \varphi_B(x) + \varphi_C(x) - 2\varphi_B(x)\cdot\varphi_C(x) - 2\varphi_A(x)\left(\varphi_B(x) + \varphi_C(x) -\right.$

$\left. - 2\varphi_B(x)\cdot\varphi_C(x)\right) = \varphi_A(x) + \varphi_B(x) + \varphi_C(x) - 2\cdot\varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x) -$

$- 2\cdot\varphi_A(x)\cdot\varphi_C(x) - 2\cdot\varphi_B(x)\cdot\varphi_C(x) + 4\cdot\varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x)\cdot\varphi_C(x)$.

Explicitind analog pe $\varphi_{(A\Delta B)\Delta C}(x)$ obţinem egalitatea dorită. Dacă obervăm că explicitarea lui $\varphi_{A\Delta(B\Delta C)}(x)$ de mai sus este simetrică,utilizând comutativitatea adunării şi înmulţirii egalitatea cerută rezultă mai uşor.

5. $\varphi_{(A\Delta B)\times C}(x,y) = \varphi_{A\Delta B}(x)\cdot\varphi_C(y) = \left(\varphi_A(x) + \varphi_B(x) -\right.$

$\left. - 2\cdot\varphi_A(x)\beta_B(x)\right)\varphi_C(y)$;

$\varphi_{(A\times C)\Delta(B\times C)}(x,y) = \varphi_{A\times C}(x,y) + \varphi_{B\times C}(x,y) - 2\cdot\varphi_{A\times C}(x,y)$.

$\varphi_{B\times C}(x,y) = \varphi_A(x)\cdot\varphi_C(y) + \varphi_B(x)\cdot\varphi_C(y) - 2\cdot\varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x)\cdot\varphi_C^2(y).$

Egalităţile 4)-5) s-au demonstrat uşor utilizînd funcţia caracteristică; ele sunt mai greu de demonstrat utilizând prima metodă.In general funcţia caracteristică este de preferat, datorită comodităţii cu care se utilizează şi rapidităţii cu care se obţine rezultatul.

III. Demonstraţi echivalenţele:

1. $A \cup B \subset C \iff A \subset C$ şi $B \subset C$

2. $A \subset B \cap C \iff A \subset B$ şi $B \subset C$

3. $A \cap B \subset C \iff A \cap C_B \cup C$

4. $A \subset B \cup C \iff A \cap C_B \subset C$

5. $(A - B) \cup B \iff B \cup A$

REZOLVARI:

1. r_1: avem de arătat o echivalenţă

R_1: arătăm două implicaţii

r_2: $A \cup B \subset C \Rightarrow A \subset C$ şi $B \subset C$

R_2: arătăm că $A \subset C$ şi $B \subset C$ (două incluziuni)

Fie $x \in A$ oarecare [nu mai avem operaţii deexplicitat, de aceea actualizăm concluzia: $x \in C$; dar acest lucru nu rezultă imediat din $x \in A$, ci doar cu ajutorul ipotezei]

$x \in A \Rightarrow x \in A \cup B \Rightarrow$ [prin ipoteză $A \cup B \subset C$] $\Rightarrow x \in C$

Fie acum $x \in B$ oarecare $\Rightarrow x \in A \cup B \subset C \Rightarrow x \in C$

Reciproc (a doua implicaţie):

r_1: avem dearătat că $A \cup B \subset C$ (o incluziune)

R_1: fie $x \in A \cup B$ oarecare (explicităm ultima operaţie):

$$\Rightarrow \begin{cases} x \in A \Rightarrow x \in C & \text{(datorită ipotezei)} \\ \text{sau} \\ x \in B \Rightarrow x \in C & \text{(datorită ipotezei)} \end{cases}$$

5. r_1: avem de arătat o echivalenţă

R_1: arătăm două implicaţii

r_2: $(A - B) \cup B = A \Rightarrow B \subset A$

R_2: arătăm concluzia (o incluziune), utilizind ipoteza.

Fie $x \in B$ oarecare $\Rightarrow x \in (A - B) \cup B \Rightarrow x \in A$

r_3: avem de arătat implicaţia: $B \subset A \Rightarrow (A - B) \cup B = A$

R_3: arătăm o egalitate de mulţimi (două incluziuni)

Pentru prima incluziune fie $x \in (A - B) \cup B$ oarecare [explicităm ultima operaţie] $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \in A - B \\ \text{sau} \\ x \in B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in A \text{ şi } x \notin B & \text{(a)} \\ \text{sau} \\ x \in B & \text{(b)} \end{cases}$$

[nu mai avem operaţii de explicitat, de aceea actualizăm concluzia].Astfel, observăm că din (a) rezultă $x \in A$, iar din (b), cu ajutorul ipotezei, $B \subset A$, se obţine de asemenea $x \in A$.

Metoda 2:

1. $(A \cup B \subset C \Rightarrow A \subset C \text{ şi } B \subset C) \Leftrightarrow (\varphi_{A\cup B} < \varphi_C \Rightarrow$
$\Rightarrow \varphi_A < \varphi_C \text{ şi } \varphi_B < \varphi_C)$

Avem de arătat două inegalităţi între funcţii. Prin ipoteză, $\varphi_{A\cup B} < \varphi_C$ şi în plus $\varphi_A < \varphi_{A\cup B}$ (într-adevăr, $\varphi_A < \varphi_{A\cup B} \Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow \varphi_A < \varphi_A + \varphi_B - \varphi_A \varphi_B \Leftrightarrow \varphi_B(1 - \varphi_A) > 0$ - adevărat deoarece funcţiile caracteristice iau doar două valori: 0 şi 1).

Rezultă $\varphi_A < \varphi_{A\cup B} < \varphi_C$ şi analog $\varphi_B < \varphi_{A\cup B} < \varphi_C$.

Reciproc, pentru implicaţia inversă, trebuie arătat că: $\varphi_{A\cup B} < \varphi_C$, adică

$$\varphi_A(x) + \varphi_B(x) - \varphi_{A\cap B}(x) < \varphi_C(x) \qquad (1.7)$$

în ipoteza:

$$\varphi_A < \varphi_C \text{ şi } \varphi_B < \varphi_C \qquad (1.8)$$

Dar φ_A , φ_B , φ_C pot lua doar două valori: 0 şi 1. Din cele opt cazuri posibile în care trebuie verificată (1.7), datorită lui (1.8) mai rămîn următoarele patru:

a) $\varphi_A(x) = \varphi_B(x) = \varphi_C(x) = 1$

b) $\varphi_A(x) = \varphi_C(x) = 1$, $\varphi_B(x) = 0$

c) $\varphi_B(x) = \varphi_C(x) = 1$, $\varphi_A(x) = 0$

d) $\varphi_A(x) = \varphi_B(x) = \varphi_C(x) = 0$

În fiecare din aceste cazuri (1.7) este îndeplinită.

5. Avem de arătat că

$\varphi_{(A-B)\cup B}(x) = \varphi_A(x) \iff \varphi_B(x) \leq \varphi_A(x)$

Dar $\varphi_{(A-B)\cup B}(x) = \varphi_{A-B}(x) + \varphi_B(x) - \varphi_{(A-B)\cap B}(x) = \varphi_A(x) -$

$- \varphi_{A\cap B}(x) + \varphi_B(x) - \varphi_{A-B}(x)\cdot\varphi_B(x) = \varphi_A(x) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x) + \varphi_B(x) -$

$- \big(\varphi_A(x) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x)\big)\cdot\varphi_B(x) = \varphi_A(x) + \varphi_B(x) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x).$ (1.9)

Pentru implicaţia directă, prin ipoteză, avem:

$\varphi_A(x) + \varphi_B(x) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x) = \varphi_A(x)$, adică:

$\varphi_B(x)\big(1 - \varphi_A(x)\big) = 0$. Prin urmare:

$$\begin{cases} \varphi_B(x) = 0 \Rightarrow \varphi_B(x) \leq \varphi_A(x) & \text{(datorită valorilor 0 şi 1 pe care le ia funcţia } \varphi \text{)} \\ \quad \text{sau} \\ 1 - \varphi_A(x) = 0 \Rightarrow \varphi_A(x) = 1 & \text{deci } \varphi_B(x) \leq \varphi_A(x) \end{cases}$$

Reciproc, dacă $\varphi_B(x) \leq \varphi_A(x)$, nu putem avea $\varphi_B(x) = 1$ şi $\varphi_A(x) = 0$, iar din (1.9) deducem :

$\varphi_{(A-B)\cup B}(x) = \varphi_A(x) \iff \varphi_A(x) + \varphi_B(x) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x) = \varphi_A(x)$

$\iff \varphi_B(x)\big(1 - \varphi_A(x)\big) = 0$ - egalitate adevărată în cele trei cazuri posibile rămase: a) $\varphi_A(x) = 1$, $\varphi_B(x) = 0$

b) $\varphi_A(x) = \varphi_B(x) = 1$

c) $\varphi_A(x) = \varphi_B(x) = 0$

IV. Utilizînd proprietăţile funcţiei caracteristice, să se rezolve următoarele ecuaţii şi sisteme de ecuaţii cu mulţimi:

1. $A \cup (B - X) = B \cup X$

2. $\begin{cases} A - X = B \\ A \cup X = C \end{cases}$ dacă $B \subset A$ şi $A \cap C = \emptyset$

3. $\begin{cases} A \cap X = B \\ A \cup X = C \end{cases}$ dacă $B \subset A \subset C$

4. $\begin{cases} X \cup Y = A \\ X \cap Y = B \\ X - Y = C \end{cases}$ dacă $B \subset A$, $C \subset A$, $B \cap C = \emptyset$

Rezolvare:

1. $A \cup (B - X) = B \cup X \iff \varphi_{A\cup(B-X)}(x) = \varphi_{B\cup X}(x) \iff$

$\varphi_A(x) + \varphi_{B-X}(x) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_{B-X}(x) = \varphi_B(x) + \varphi_X(x) - \varphi_B(x)\cdot\varphi_X(x) \iff$

$\iff \varphi_A(x) + \varphi_B(x) - \varphi_B(x)\cdot\varphi_X(x) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x) +$

$\varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x)\cdot\varphi_X(x) = \varphi_B(x) + \varphi_X(x) - \varphi_B(x)\cdot\varphi_X(x) \iff$

$\iff \varphi_X(x)\left(1 - \varphi_A(x)\cdot\varphi_B(x) \right) = \varphi_A(x)\left(1 - \varphi_B(x) \right) \iff$

$\iff \varphi_X(x)\cdot\varphi_{C(A\cap B)}(x) = \varphi_{A\cap CB}(x)$ (1.10)

Avem de anlizat următoarele cazuri:

a) dacă $x \notin A$ şi $x \notin B$ avem:

$\varphi_{C(A\cap B)}(x) = 1$ şi $\varphi_{A\cap CB}(x) = 0$ deci pentru a fi indeplinit (1.10) trebuie să avem $\varphi_X(x) = 0$. Aşadar orice punct care nu aparţine lui A şi nici lui B, nu aparţine nici lui X.

b) dacă $x \in A$ şi $x \notin B$, avem:

$\varphi_{C(A\cap B)}(x) = 1$ şi $\varphi_{A\cap CB}(x) = 1$ deci pentru a fi indeplinit (1.10) trebuie să avem $\varphi_X(x) = 1$. Aşadar, orice punct din A - B este in X .

c) dacă $x \notin A$ şi $x \in B$ pentru a fi indeplinită (1.10) trebuie să avem $\varphi_X(x) = 0$, deci nici un punct din B - A nu este in X .

d) dacă $x \in A$ şi $x \in B$ putem avea $\varphi_X(x) = 0$ sau $\varphi_X(x) = 1$

Deci orice punct din $A \cap B$ poate să fie in X sau să nu fie. Aşadar X este de forma $X = (A \setminus B) \cup D$ unde

$D \subset A \cap B$ arbitrar.

2. $A - X = B \iff \varphi_{A-B}(x) = \varphi_B(x) \iff \varphi_A(x) - \varphi_A(x)\cdot\varphi_X(x) =$

$= \varphi_B(x) \iff \varphi_X(x)\cdot\varphi_A(x) = \varphi_A(x) - \varphi_B(x)$ (1.11)

$X - A = C \iff \varphi_X(x) - \varphi_X(x)\cdot\varphi_A(x) = \varphi_C(x) \iff$

$\iff \varphi_X(x)\left(1 - \varphi_A(x)\right) = \varphi_C(x) \iff$

$\iff \varphi_X(x)\cdot\varphi_{C_A}(x) = \varphi_C(x)$ (1.12)

Avem de analizat patru cazuri, după cum se vede din tabelul următor:

Cazuri	$\varphi_A(x)$	$\varphi_B(x)$	$\varphi_C(x)$	$\varphi_X(x)$	(1.11)	(1.12)
$x \notin A$ şi $x \notin C$	0	0	0	0	$0\cdot 0=0-0$ (A)	$0\cdot 1=0$ (A)
				1	$1\cdot 0=0-0$ (A)	$1\cdot 1=0$ (F)
$x \in A$ şi $x \notin B$	1	0	0	0	$0\cdot 1=1-0$ (F)	$0\cdot 0=0$ (A)
				1	$1\cdot 1=1-0$ (A)	$1\cdot 0=0$ (A)
$x \in B$	1	1	0	0	$0\cdot 1=1-1$ (A)	$0\cdot 0=0$ (A)
				1	$1\cdot 1=1-1$ (F)	$1\cdot 0=0$ (A)
$x \in C$	0	0	1	0	$0\cdot 0=0-0$ (A)	$0\cdot 1=1$ (F)
				1	$1\cdot 0=0-0$ (A)	$1\cdot 1=1$ (A)

Deci $X = (A - B) \cup C$.

V. Să se determine mulţimile:

1. $A = \{ x \in \mathbb{Z} \mid x = \frac{6n - 7}{2n + 1},\ n \in \mathbb{Z} \}$

2. $A = \{ x \in \mathbb{N} \mid x = \frac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 - 1},\ n \in \mathbb{N} \}$

3. $A = \{ x \in \mathbb{Z} \mid x = \frac{6n^2 + 7}{3n + 1}, \ n \in \mathbb{Z} \}$

4. $A = \{ x \in \mathbb{Z} \mid \frac{x^3 - 3x + 2}{2x + 1} \in \mathbb{Z} \}$

5. $A = \{ (x,y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid 9y^2 - (x + 1)^2 = 32 \}$

6. $A = \{ (x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x^2 - 2xy + 3y^2 = 8 \}$

7. Fie $P \in \mathbb{Z}(x)$ un polinom de grad n și $q \in \mathbb{Z}$. Știind că $P(q) = 15$, să se determine mulțimea:

$$A = \{ x \in \mathbb{Z} \mid \frac{P(x)}{x - q} \in \mathbb{Z} \}$$

8. $A = \{ x \in \mathbb{R} \mid \exists\, a \in \mathbb{R}, \ x = \frac{a^2 - a + 1}{a + 1} \}$.

Indicații:

1. Se pune în evidență o parte întreagă maximală. Acest lucru se obține făcând împărțirile:

$x = 3 - \frac{10}{2n + 1}$, deci $x \in \mathbb{Z} \iff \frac{10}{2n + 1} \in \mathbb{Z} \iff$ 10 este divizibil cu $2n + 1 \iff n \in \{ 0, 1, -2 \}$

4. $E = \frac{x^2 - 3x + 2}{2x + 1} = \frac{1}{5}\left(4x^2 - 2x - 11 + \frac{27}{2x + 1} \right)$,

deci $E \in \mathbb{Z} \iff 27$ este divizibil cu $2x + 1$ și $4x^2 - 2x - 11 + \frac{27}{2x + 1}$ este multiplu de 8 $\iff A \in \{ -14, -5, -2, -1, 0, 1, 4, 13 \}$.

5. $9y^2 - (x + 1)^2 = 32 \iff (3y - x - 1)(3y + x + 1) = 32$

deci x și y sînt soluții întregi ale unor sisteme de forma:

$$\begin{cases} 3y - x - 1 = u \\ 3y + x + 1 = v \end{cases}$$ cu u și v divizori ai lui 32.

6. $x^2 - 2x + 3y^2 = 8 \iff (x - y)^2 + 2y^2 = 8 \Rightarrow$

$x - y = 0$ şi $2y^2 = 8$.

7. $P(x) = C(x)(x - q) + R \iff a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0 =$

$= C(x)(x - q) + 15$. Deci $\frac{P(x)}{x - q} \in \mathbb{Z} \iff$ 15 este divizibil cu $x - q$.

8. *Metoda 1:* Pentru $a \neq -1$ avem $x = \frac{a^2 - a + 1}{a + 1} \iff$

$\iff ax + x = a^2 - a + 1 \iff a^2 - a(1 + x) + 1 - x = 0 \iff$

$\iff a = \frac{1 + x \pm \sqrt{x^2 + 6x - 3}}{2}$ deci trebuie să avem

$x^2 + 6x - 3 \geq 0$. Cum $x_{1,2} = -3 \pm 2\sqrt{3}$, deducem:

$x \in (-\infty , -3 - 2\sqrt{3}\,] \cup [\, -3 + 2\sqrt{3} , +\infty)$.

Metoda 2: Considerăm funcţia $f(a) = \frac{a^2 - a + 1}{a + 1}$ şi $A = f(D)$, cu $D = \mathbb{R} \setminus \{ -1 \}$ domeniul lui f. A se obţine din tabelul de variaţie al lui f.

VI. Să se determine mulţimile următoare, cînd $a,b \in \mathbb{N}$:

1. $A = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid \left[\frac{a + x}{b} \right] = \left[\frac{a}{b} \right] \right\}$

2. $A = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid \left[\frac{a + x}{b} \right] = \left[\frac{a}{b} \right] + 1 \right\}$

3. $A = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \left[2^x \right] = 2^{[x]} \right\}$

unde [t] este partea întreagă a lui t.

Rezolvari: Folosim inegalităţile: $[t] \leq t < [t] + 1$, deci:

1. $$\left[\frac{a + x}{b} \right] \leq \frac{a + x}{b} < \left[\frac{a + x}{b} \right] + 1$$

$x \in A \iff \left[\frac{a}{b} \right] \leq \frac{a + x}{b} < \left[\frac{a}{b} \right] + 1 \iff$

$\iff b\left[\frac{a}{b} \right] - a \leq x < b\left[\frac{a}{b} \right] + b - a$

2. $x \in A \iff \left[\frac{a}{b}\right] + 1 < \frac{a+x}{b} < \left[\frac{a}{b}\right] + 2 \iff$

$\iff b\left[\frac{a}{b}\right] + b - a < x < b\left[\frac{a}{b}\right] + 2b - a$.

VII. Aplicația $f:\mathcal{P}(T) \longrightarrow \mathcal{F}_T$ definită prin $f(A) = \varphi_A$ este o bijecție de la familia părților lui T la familia funcțiilor caracteristice definite pe T.

Rezolvare: Pentru demonstrarea injectivității, fie $A,B \in \mathcal{P}(T)$ cu $A \neq B$. Din $A \neq B$ deducem că există $x_o \in T$ astfel încât:

a) $x_o \in A$ și $x_o \notin B$ sau b) $x_o \in B$ și $x_o \notin A$

În primul caz $\varphi_A(x_o) = 1$, $\varphi_B(x_o) = 0$, deci $\varphi_A \neq \varphi_B$. În al doilea caz, de asemenea, $\varphi_A \neq \varphi_B$.

Surjectivitatea revine la:

$$\forall\, \varphi \in \mathcal{F}_T \quad \exists\, A \in \mathcal{P}(T) \quad \text{a.i.} \quad \varphi = \varphi_A$$

Fie deci $\varphi \in \mathcal{F}_T$ oarecare. Atunci pentru $A = \{ x \mid \varphi(x) = 1 \}$ avem $\varphi = \varphi_A$.

2. F U N C T I I

DEFINITIA FUNCTIEI

O funcţie este determinată de trei elemente D , E şi f , având următoarele semnificatii: D şi E sunt mulţimi, numite respectiv domeniul si codomeniul funcţiei, iar f este o lege de corespondenţă de la D la E care face ca:

fiecarui element $x \in D$ sa-i corespunda un element si numai unul $y \in E$. (F)

Deci se poate spune că o funcţie este un triplet (D,E,f), elementele acestui triplet având semnificatile de mai sus.

Acest triplet se notează în mod frecvent prin $f : D \longrightarrow E$. Două funcţii sunt deci egale dacă sunt egale ca triplete,adică atunci când au cele trei elemente constitutive respectiv egale(şi nu doar legile de corespondenţă).

Pentru a sublinia importanţa pe care o au domeniul si codome-

niul în definiţia funcţiei vom da în cele ce urmează exemple în care păstrând legea de corespondenţă f neschimbată şi modificând doar domeniul sau (şi) codomeniul, putem întâlni toate situaţiile posibile, de la aceea în care tripletul nu este funcţie până la o functie bijectivă.

Pentru aceasta este nevoie să detaliem mai întâi condiţia (F), ce caracterizează o funcţie.

Putem considera că această condiţie este formată din două subcondiţii, şi anume:

(f_1) *fiecarui element x din domeniu îi corespunde un element, în sensul de "cel puţin un element", în codomeniu.*

Cu ajutorul unor diagrame de felul celor de mai jos, aceasta condiţie se poate exprima prin propoziţia

"Din fiecare punct al domeniului pleacă (cel puţin) o sageată."



Fig. 2.1

iar mai riguros condiţia se exprimă prin

$$(f_1) \qquad \forall\, x \in D \;\; \exists\, y \in E \,,\; y = f(x)$$

A doua subcondiţie referitoare la f în definiţia funcţiei este:

(f_2) *elementul din codomeniu ce corespunde unui x este unic.*

Pentru o diagramă de felul celor din fig.2.1 înseamnă că <u>săgeata care pleacă dintr-un punct este unică.</u>

Această condiţie are formularea echivalentă:

" *Daca doua sageti au acelasi punct de plecare atunci ele au si acelasi punct de sosire.* "

adică

$$(f_2) \qquad \forall\, x_1 = x_2 \;\Longrightarrow\; f(x_1) = f(x_2)$$

Condiţiile (f_1) şi (f_2) sunt necesare şi suficiente pentru ca o lege de corespondenţă f să fie funcţie. Aceste condiţii sunt uşor de utilizat în practică.

În figura 2.1, legea de corespondenţă de la a) satisface (f_1) şi nu satisface (f_2); la b) legea de corespondenţă nu satisface (f_1), dar satisface (f_2). În diagrama c) nu este satisfăcută nici (f_1) nici (f_2), iar în d) legea de corespondenţă satisface şi (f_1) şi (f_2), deci este (singura) funcţie.

O functie este deci un triplet (D,E,f) in care legea de corespondenta f satisface (f_1) si (f_2).

Să observăm că aceste două condiţii se referă doar la domeniul funcţiei:

(f_1)- din fiecare punct al domeniului pleacă cel puţin o săgeată;

(f_2)- săgeata care pleacă dintr-un punct al domeniului este unică.

Se ştie că graficul unei funcţii este format din mulţimea perechilor de puncte $(x,f(x))$, cînd x parcurge domeniul funcţiei.

$$G_f = \{ (x,f(x)) \mid x \in D \}$$

CUM RECUNOAŞTEM PE UN GRAFIC DACA O LEGE DE CORESPONDENŢA ESTE FUNCŢIE ? (deci dacă satisface (f_1) şi (f_2))

Pentru a răspunde la această întrebare vom aminti mai întîi (pentru cazul D , E $\subset$ R) răspunsul la alte două întrebări:

1. Fiind dat x, cum obţinem - cu ajutorul graficului - pe f(x) ? (adică *imaginea* lui x (sau *imaginile*, dacă sunt mai multe, şi desigur în acest caz legea de corespondenţă f nu este funcţie)).

Raspuns : Ducem din x o paralelă la Oy până când aceasta întâlneşte graficul, iar din punctul (punctele) de intersecţie cu graficul ducem apoi paralelă (paralele) la Ox. Punctele de intersecţie ale acestor paralele cu Oy sunt imaginile f(x) ale lui x.

2. Reciproc, fiind dat y , pentru a obţine punctul (punctele) x avînd proprietatea f(x) = y , ducem prin y o paralelă la Ox, iar din punctul (punctele) de intersecţie cu graficul ducem apoi o paralelă (paralele) la Oy.

EXEMPLE:

1. Un cerc cu centrul în origine şi de rază r nu este graficul unei functii f: $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, deoarece nu satisface nici condiţia (f_1) (*exista puncte in domeniu care nu au nici o imagine*, şi anume toate punctele prin care paralela la Oy nu întâlneşte graficul) şi nu este satisfăcută nici condiţia (f_2), pentru că *exista*

puncte în domeniu care au mai mult de o imagine (toate punctele $x \in (-r,r)$ au două imagini)



Fig. 2.2

2. Un cerc cu centrul în origine și de rază r nu este graficul unei funcții $f : [-r , r] \longrightarrow \mathbb{R}$,deoarece nu satisface condiția (f_2) (de data aceasta nu mai există în domeniu puncte fără nici o imagine, dar continuă să existe *puncte care au două imagini*).

3. Un cerc cu centrul în origine și de rază r nu este graficul unei funcții $f : \mathbb{R} \longrightarrow [0 , \infty)$, deoarece nu satisface condiția (f_1). Codomeniul fiind $[0 , \infty)$ punctele au *cel mult o imagine*. Sunt însă și *puncte care nu au nici o imagine*.

4. Un cerc cu centrul în origine și de rază r este graficul unei funcții $f :[-r ,r] \longrightarrow [0 ,1]$, deoarece *toate punctele din domeniu au o imagine și numai una*.

5. Un cerc cu centrul în origine şi de rază r este graficul unei funcţii $f : [0 , r] \longrightarrow [-1 , 0]$.

În toate aceste exemple legea de corespondenţă a rămas neschimbată (un cerc cu centrul în origine şi de rază r, având deci ecuaţia $x^2 + y^2 = r^2$, de unde obţinem $y = \pm (r^2 - x^2)^{1/2}$).

Modificând doar domeniul şi (sau) codomeniul am pus în evidenţă toate situaţiile posibile, începând de la a nu fi îndeplinită nici una din condiţiile ce definesc o funcţie, până la a fi îndeplinite ambele condiţii.

CU AJUTORUL PARALELELOR LA AXELE DE COORDONATE RECUNOASTEM INDEPLINIREA CONDITIILOR (f_1) SI (f_2) ASTFEL:

a) *Un grafic satisface conditia (f_1) daca si numai daca orice paralela la Oy dusa prin punctele domeniului intilneste graficul in cel putin un punct.*

b) *Un grafic satisface conditia (f_2) daca si numai daca orice paralela la Oy dusa prin punctele domeniului intilneste graficul in cel mult un punct.*

I N V E R S A U N E I F U N C T I I

Inversând legea de corespondenţă (inversând sensul săgeţilor) pentru o funcţie oarecare $f : D \longrightarrow E$ nu se obţine totdeauna o funcţie. Astfel, în figura 2.3 f este funcţie, dar f^{-1}

(obținută prin inversarea legii de corespondență f) nu mai este funcție, deoarece nu satisface (f_2) (există puncte cu mai mult de o imagine).



Fig. 2.3

Cu ajutorul acestor diagrame observăm că inversa nu satisface (f_2) ori de câte ori există puncte în codomeniul lui f care sunt imaginea a cel puțin două puncte din domeniul lui f .

Altfel spus, *f^{-1} nu satisface (f_2) oridecate ori exista puncte diferite care au aceeasi imagine prin f.* Deci:

Pentru ca inversând legea de corespondență să fie satisfăcută condiția (f_2) este necesar și suficient ca prin funcția directă puncte diferite să aibă imagini diferite, adică

$$(f_3) \quad \forall x_1, x_2 \in D , \quad x_1 \neq x_2 \Longrightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2)$$

O a doua situație în care f^{-1} nu este funcție este atunci când ea nu satisface condiția (f_1) :

Fig 2.4

Observăm că aceasta se întîmplă ori de câte ori prin funcţia directă există puncte în codomeniu care nu sunt imaginile niciunui punct din domeniu.

Pentru ca inversând legea de corespondenţă a unei funcţii să fie satisfăcută condiţia (f_1) este necesar şi suficient ca *prin functia directa sa se consume toate punctele din codomeniu*, adică

$$(f_4) \quad \forall\, y \in B \quad \exists\, x \in D \quad , f(x) = y$$

În concluzie,

f^{-1} satisface (f_2) dacă şi numai dacă f satisface (f_3)

f^{-1} satisface (f_1) dacă şi numai dacă f satisface (f_4)

f^{-1} este funcţie dacă şi numai dacă f satisface (f_3) + (f_4)

După cum se ştie, o funcţie care satisface (f_3) se numeşte funcţie injectivă, o funcţie care satisface (f_4) se numeşte funcţie surjectivă, iar o funcţie care satisface (f_3) + (f_4) se numeşte funcţie bijectivă.

Vedem deci că afirmaţia:

"O funcţie are inversă dacă şi numai dacă este bijectivă."

are înţelesul că inversa f^{-1} (care există totdeauna, ca lege de corespondenţă, chiar dacă f nu este bijectivă) este funcţie dacă şi numai dacă f este bijectivă.

Cu ajutorul paralelelor la axele de coordonate recunoaştem dacă un grafic este graficul unei funcţii injective sau surjective; astfel:

(c) un grafic este graficul unei functii injective daca si numai daca orice paralela la Ox dusa prin punctele co-

domeniului intilneşte graficul in cel mult un punct (adica f^{-1} satisface (f_2)).

(d) Un grafic este graficul unei functii surjective daca si numai daca orice paralela la Ox dusa prin punctele codomeniului intilneste graficul in cel putin un punct (adica f^{-1} satisface (f_1)).

EXEMPLE:

1. Un cerc cu centrul în origine şi de rază r este graficul unei funcţii $f : [0 , r] \longrightarrow [0 , \infty)$ care este injectivă dar nu surjectivă.

2. Un cerc cu centrul în origine şi de rază r este graficul unei funcţii $f : [-r , r] \longrightarrow [0 , r]$, care este surjectivă dar nu injectivă.

3. Un cerc cu centrul în origine şi de rază r este graficul unei funcţii bijective $f : [0 , r] \longrightarrow [0 , r]$.

Deci modificând doar domeniul şi codomeniul, cu ajutorul unui cerc cu centrul în origine şi de rază r se pot obţine toate situaţiile, începând de la a nu fi satisfăcută niciuna din cele două condiţii ce definesc o funcţie, până la o funcţie bijectivă.

OBSERVATIE:

f^{-1} se obţine prin inversarea legii de corespondenţă f, adică

$$x \xrightarrow{\ f\ } y \quad <==> \quad x \xleftarrow{\ f^{-1}\ } y$$

cu alte cuvinte

$$y = f(x) \quad <==> \quad x = f^{-1}(y) \qquad (2.1)$$

În cazul funcţiei exponenţiale de exemplu, echivalenţa (2.1)

devine:

$$y = a^x \quad <===> \quad x = \log_a y \qquad (2.2)$$

deoarece inversa funcţiei exponenţiale se notează prin $f^{-1}(y) = \log_a y$. Relaţia (2.2) defineşte logaritmul:

Logaritmul unui număr y într-o bază dată, a , este exponentul x la care trebuie ridicată baza pentru a obţine pe y.

G R A F I C U L F U N C T I E I I N V E R S E

Dacă D şi E sunt submulţimi ale lui R şi se figurează pe axa Ox domeniul D al lui f (deci codomeniul lui f^{-1}) , iar pe axa Oy codomeniul E (deci domeniul lui f^{-1}) atunci graficul lui f şi f^{-1} coincid, deoarece f^{-1} nu face decît să inverseze legea de corespondenţă (inversează sensul săgeţilor).

Dar dacă figurăm şi pentru f^{-1} domeniul pe orizontală, iar codomeniul pe verticală, deci figurăm E pe Ox iar D pe Oy, atunci un punct oarecare de pe graficul iniţial G_f (care, fără convenţia amintită este grafic atât pentru f cât şi pentru f^{-1}) un astfel de punct (x,f(x)) devine (f(x),x).

Punctele (x,f(x)) şi (f(x),x) sunt simetrice faţă de prima bisectoare, deci pe lângă G_f mai obţinem un grafic G_f^e , <u>dacă şi domeniul lui f^{-1} este pe Ox.</u>

Convenind să figurăm <u>domeniile tuturor funcţiilor</u> pe Ox rezultă că G_f^e este grafic al lui f^{-1}.

<u>Cu această convenţie</u> graficele lui f şi f^{-1} sunt simetrice faţă de prima bisectoare.

METODE PENTRU A ARATA CA O FUNCTIE ESTE BIJECTIVA

1. Utilizarea definitiei.

- pentru studiul injectivității verificăm dacă funcția satisface condiția (f_3).
- pentru studiul surjectivității verificăm dacă este indeplinită condiția (f_4).

2. Metoda grafica.

- pentru studiul injectivității utilizăm propoziția *c)*
- pentru studiul surjectivității utilizăm propoziția *d)*

Observație importantă: Dacă utilizăm metoda grafică este esențial, pentru funcții definite pe ramuri, să trasăm cât mai exact graficul in jurul punctului (punctelor) de legătură dintre ramuri.

Exemple:

1. Funcția $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{dacă } x \leq 1 \\ x + 3 & \text{dacă } x > 1 \end{cases}$

este injectivă, dar nu este surjectivă. Graficul este in figura 2.5 a).

2. Funcția $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & \text{dacă } x \leq 2 \\ 2x - 1 & \text{dacă } x > 2 \end{cases}$

este surjectivă, dar nu este injectivă. Graficul este în figura 2.5 b).

3. Funcţia $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{dacă } x \leq 1 \\ x + 2 & \text{dacă } x > 1 \end{cases}$

este bijectivă. Graficul este în fig. 2.5 c).



Fig. 2.5

3. *Utilizarea teoremei* : O funcţie strict monotonă este injectivă.

Pentru studiul surjectivităţii verificăm dacă funcţia este continuă şi în caz afirmativ calculăm limitele la extremităţile domeniului.

Exemplu: Să arătăm că $f(x) = \operatorname{tg} x$, $f: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \longrightarrow \mathbb{R}$ este bijectivă.

(i) injectivitatea: deoarece $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ este strict pozitivă, deducem că funcţia este strict crescătoare, deci este injectivă.

(ii) surjectivitatea: funcţia este continuă pe tot domeniul de definiţie, deci are proprietatea lui Darboux şi

$$\lim_{\substack{x \to -\pi/2 \\ x > -\pi/2}} f(x) = -\infty \quad , \quad \lim_{\substack{x \to \pi/2 \\ x < \pi/2}} f(x) = \infty$$

de unde rezultă că este surjectivă.

4. *Utilizarea propoziţiei* : Funcţia $f : D \longrightarrow E$ este bijectivă dacă şi numai dacă

$$\forall\, y \in E \quad \text{ecuaţia } f(x) = y \quad \underline{\text{are o soluţie unică}}$$

(vezi manualul de algebră cls. XII)

Exemplu. Fie $D = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ şi matricea $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ .Atunci funcţia $f_A^* : D \longrightarrow D$, $f_A^*(x_1, x_2) = (3x_1 - x_2 , 4x_1 + 2x_2)$ este bijectivă (algebră cls. XII).

Să observăm că în propoziţia utilizată la acest punct, afirmaţia "ecuaţia f(x) = y are soluţie " asigură surjectivitatea funcţiei iar afirmaţia "soluţia este unică" asigură injectivitatea.

5. *Utilizarea propoziţiei* : Dacă $f,g : D \longrightarrow D$ şi $g \circ f = 1_D$ atunci f este injectivă şi g este surjectivă. (algebră clasa XII).

EXEMPLU. Fie $D = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ şi $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$. Atunci funcţia $f_A : D \longrightarrow D$ definită prin

$f_A(x_1,x_2) = (2x_1 + 3x_2 , -x_1 - 2x_2)$ satisface $f_A \circ f_A = 1_D$, deci este bijectivă. (algebră,cls. XII)

Să observăm că propoziţia utilizată la acest punct poate fi generalizată astfel :

"Fie $f : D \longrightarrow E$, $g : E \longrightarrow F$ astfel încât $g \circ f$ este bijectivă. Atunci f este injectivă şi g este surjectivă."

EXERCITII.

I. Să se traseze graficele următoarelor funcţii şi să se specifice în fiecare caz în parte dacă funcţia respectivă este injectivă, surjectivă sau bijectivă.

1. $f(x) = \min (x + 1 , x^2 + 2 , 3x)$
2. $f(x) = \max (3x - 1 , 2x + 3 , x^2 - 2x)$
3. $f(x) = \min (2x - 3, 4x^2 - 5 , [x])$
4. $f(x) = \min (|x - 3| , 4x)$
5. $f(x) = \min\limits_{-1 \le t \le x} t^2$
6. $f(x) = \inf\limits_{t < x} (t^2 + 2t + 3)$
7. $f(x) = \inf\limits_{t < x} \dfrac{(t + 1)^2}{t^2 + 1}$
8. $f(x) = \min\limits_{-2 \le t \le x} (t^2 - |t - 2|)$
9. $f(x) = \min\limits_{-2 < t < x} \dfrac{t^4}{(t + 7)^3}$

10. $f(x) = \sup_{0<t<x} t^2 \ln t$

11. $f(x) = \max_{-3\le t\le x} (t - 2\,\mathrm{arctg}\, t)$

12. $f(x) = \max_{-\pi/4\le t\le x} \sin t$

REZOLVARI.

Se ştie că:

$$\min(u(x),v(x),w(x)) = \begin{cases} u(x) \text{ dacă } u(x) \le v(x) \text{ şi } u(x) \le w(x) \\ v(x) \text{ dacă } v(x) \le u(x) \text{ şi } v(x) \le w(x) \\ w(x) \text{ dacă } w(x) \le u(x) \text{ şi } w(x) \le v(x) \end{cases}$$

Pentru a explicita mai uşor condiţiile din inegalităţile asupra lui u , v şi w procedăm astfel :

1. facem tabloul cu semnele funcţiilor u - v , u - w şi v - w
2. utilizând tabloul explicităm uşor inegalităţile, deoarece de exemplu $u(x) \le v(x) \iff u(x) - v(x) \le 0$.

1. Pentru $u(x) = x + 1$, $v(x) = x^2 + 2$ şi $w(x) = 3x$ avem tabloul următor :

x		$\frac{1}{2}$		1		2	
u(x)-v(x)	-	-	-	-	-	-	-
u(x)-w(x)	+	0	-	-	-	-	-
v(x)-w(x)	+	+	0	-	-	0	+

deci:

a) $x \in \left(-\infty , \frac{1}{2}\right] \longrightarrow u(x) \le v(x)$ şi $u(x) \ge w(x)$, deci $f(x) = w(x)$

b) $x \in \left(\frac{1}{2} , 1\right] \longrightarrow u(x) \le v(x)$ şi $u(x) \le w(x)$, deci $f(x) = u(x)$

c) $x \in (1 , 2] \longrightarrow u(x) \leq v(x)$ şi $u(x) \leq w(x)$, deci $f(x) = u(x)$

d) $x \in (2 , \infty) \longrightarrow u(x) \leq v(x)$ şi $u(x) \leq w(x)$, deci $f(x) = u(x)$

Aşadar,

$$f(x) = \begin{cases} 3x & \text{dacă } x \leq 1/2 \\ x + 1 & \text{dacă } x > 1/2 \end{cases}$$

5. Pentru explicitarea lui f procedăm astfel:

(1) facem tabloul de variaţie al funcţiei $y(t) = t^2$

(2) considerând pe x în primul interval de monotonie (dedus din tabel) la dreapta lui -1 (deoarece ne interesează doar valorile $t \geq -1$) calculăm minimul lui y(t) pentru $t \in [-1 , x]$.

(3) considerând pe x în următorul interval de monotonie calculăm din nou maximul lui y(t) pe intervalul $t \in [-1 , x]$ etc.

t	$-\infty$	-1		x		0			x			$+\infty$
y'			-		-	0	+	+		+	+	+
y		1	↘		↘	0		↗		↗	↗	

a) pentru primul interval de monotonie , $x \in (-1 , 0)$, funcţia $y(t) = t^2$ are pe intervalul $[-1 , x]$ un singur punct de minim, în $t = x$; valoarea sa este $y(x) = x^2$. Fiind un singur punct de minim el este şi minimul global (absolut) al lui y(t) pe intervalul $[-1 , x]$, deci valoarea lui f este $f(x) = x^2$, pentru $x \in (-1 , 0]$.

b) pentru al doilea interval de monotonie , $x \in (0 , \infty)$, funcţia $y(t) = t^2$ are pe intervalul $[-1 , x]$ un singur punct de minim, în $t = 0$; valoarea sa este $y(0) = 0$. Fiind un singur punct de minim, avem $f(x) = 0$ pentru $x \in (0 , \infty)$, deci

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{dacă } x \in (-1\ ,0] \\ 0 & \text{dacă } x \in (0\ ,\infty) \end{cases}$$

Să observăm că din același tablou de variație putem explicita funcția $g(x) = \max_{-1 \le t \le x} t^2$. Astfel :

a) pentru $x \in (-1\ ,\ 0]$ funcția $y(t) = t^2$ are un singur maxim, pe $[-1\ ,\ x]$ în $t = -1$; valoarea sa este $M = y(1) = 1$. Deci $g(x) = 1$, pentru $x \in (1\ ,\ 0]$.

b) pentru $x \in (0\ ,\ +\infty)$, $y(t) = t^2$ are două puncte de maxim, în $t_1 = -1$ și $t_2 = x$; valorile lor sînt $M_1 = y(1) = 1$ și $M_2 = y(x) = x^2$. Valoarea lui f este maximul global, deci:

$$g(x) = \max(1\ ,\ x\ ) \text{ pentru } x \in (0\ ,+\infty).$$

$$\text{Rezultă } g(x) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } x \in [-1\ ,\ 0] \\ \max(1\ ,\ x^2) & \text{dacă } x > 0 \end{cases}$$

$$\text{Deci } g(x) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } x \in (-1\ ,\ 0] \\ 1 & \text{dacă } x \in (0\ ,\ 1] \\ x^2 & \text{dacă } x > 1 \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{dacă } x \in (-1\ ,\ 1) \\ x^2 & \text{dacă } x > 1 \end{cases}$$

9. Din tabelul de variație al lui $y(t) = \dfrac{t^4}{(t+7)^3}$

t	-2		x		0		x		$+\infty$
$y'(t)$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$
$y(t)$	$\frac{16}{125}$	↘	↘	↘	0	↗	↗	↗	↗

1. pentru $x \in (-2\ ,\ 0]$, $y(t)$ are un singur minim pe intervalul $[-2\ ,\ x]$, în $t = x$; valoarea sa este $m = y(x) = \dfrac{x^4}{(x+7)^3}$

2. pentru $x > 0$, $y(t)$ are un singur minim, pe $[-2\ ,\ x]$,

în $t = 0$; valoarea sa este $m = y(0) = 0$. Deci

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^4}{(x+7)^3} & \text{dacă } x \in (-2, 0] \\ 0 & \text{dacă } x > 0 \end{cases}$$

Analog, pentru $g(x) = \max\limits_{-2 \le t \le x} \dfrac{t^4}{(t+7)^3}$ avem

$$g(t) = \begin{cases} \dfrac{16}{125} & \text{dacă } x \in (-2, 0] \\ \max\left(\dfrac{16}{125}, \dfrac{t^4}{(x+7)^3}\right) & \text{dacă } x > 0 \end{cases}$$

10. Din tabloul de variație al lui $y(t) = t^2 \ln t$

t	0		x		$1/\sqrt{e}$		x		$+\infty$
$y'(t)$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$
$y(t)$	0	↘	↘	↘	$-1/2e$	↗	↗	↗	↗

deducem :

(a) dacă $x \in \left(0, \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right]$ funcția $y(t) = t^2 \ln t$ are, pentru $t \in (0, x]$ un singur supremum $S = \lim\limits_{\substack{t \to 0 \\ t > 0}} y(t) = 0$.

(b) $x \in \left(\dfrac{-1}{\sqrt{e}}, \infty\right)$, funcția $y(t)$ are două valori supreme: $S_1 = 0$ și $M_1 = y(x) = x^2 \ln x$.

Deci $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \left(0, \dfrac{-1}{\sqrt{e}}\right] \\ \max(0, x^2 \ln x) & x \in \left(\dfrac{-1}{\sqrt{e}}, \infty\right) \end{cases}$

II. Să se studieze bijectivitatea pentru:

1. $f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ \frac{1}{x} & x \in \mathbb{Q},\ x \neq 0 \\ x & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$

2. $f(x) = P(x)$, P fiind un polinom de grad impar.

3. $f(x) = \log_a(x + \sqrt{x^2 + 1})$ $a > 0$, $a \neq 1$.

4. $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & x \in \mathbb{Q} \\ \frac{2}{x} & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

5. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ $f(x) = A \cdot x$ unde $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

6. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ $f(x) = A \cdot x$ unde $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{pmatrix}$

7. $f : \mathbb{R}_+^2 \longrightarrow \mathbb{R}_+^2$ $f(x,y) = (\lg x + 2 \cdot \lg y,\ 3 \cdot \lg x - 2 \cdot \lg y)$

III. Să se studieze inversabilitatea funcţiilor hiperbolice:

1. $sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (sinus hiperbolic)

2. $ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (cosinus hiperbolic)

3. $th(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ (tangenta hiperbolică)

4. $cth(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ (cotangeta hiperbolică)

şi să se scrie inversele lor.

IV. 1. Arătaţi că funcţiile $f(x) = x^2 - x + 1$,

$f : \left[\frac{1}{2}, \infty\right) \longrightarrow \mathbb{R}$ şi $g(x) = \frac{1}{2} + \sqrt{x - \frac{3}{4}}$,

$g : \left[\frac{1}{2}, \infty\right) \longrightarrow R$ sunt inverse una alteia.

2. Arătaţi că $f(x) = \frac{1 - x}{1 + x}$ coincide cu inversa ei.

3. Determinaţi parametri a,b,c,d astfel încât

$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ să coincidă cu inversa ei.

4. Arătaţi că funcţia $f : (0, 1] \longrightarrow R$ definită prin

$f(x) = \frac{4}{3^n} - x$, dacă $x \in \left[\frac{1}{3^n}, \frac{1}{3^{n-1}}\right]$ este bijectivă.

5. Pe ce subinterval funcţia $f : \left[-\frac{1}{2}, \infty\right) \longrightarrow R$

$f(x) = \sqrt{x - \sqrt{2x - 1}}$ este bijectivă ?

INDICATII.

4. Pentru a uşura raţionamentul, se schiţează graficul lui f.

5. Se utilizează formula de descompunere a radicalilor supra-

puşi: $\sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{\frac{A + C}{2}} \pm \sqrt{\frac{A - C}{2}}$,

unde $C = \sqrt{A^2 - B}$.

MONOTONIE SI MARGINIRE PENTRU SIRURI SI FUNCTII

Un şir este o funcţie definită pe mulţimea numerelor naturale. Domeniul unei astfel de funcţii este deci mulţimea numerelor naturale $\mathbb{N}$. Codomeniul şi legea de corespondenţă pot fi oarecare.

In cele ce urmează vom considera doar şiruri de numere reale, adică şiruri avind drept codomeniu mulţimea $\mathbb{R}$ a numerelor reale.

$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$ ŞIR DE NUMERE REALE

Pentru astfel de funcţii, domeniul şi codomeniul fiind totdeauna aceleaşi, mai trebuie precizată doar legea de corespondenţă f , ceea ce revine la a preciza mulţimea valorilor sale :

$$f(0) , f(1) , f(2) , \ldots , f(n) , \ldots$$



Pentru comoditatea scrierii se notează de exemplu:

$$f(0) = a_1 , f(1) = a_2 , \ldots , f(n) = a_n , \ldots$$

Deci pentru a cunoaşte un şir este necesar şi suficient să cu-

noaştem mulţimea valorilor sale: a_0 , a_1 , ... , a_n , ...
Această mulţime se notează prescurtat cu $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Prin urmare un şir este un caz particular de funcţie. Trecerea de la o funcţie la un şir se face astfel:

(s_1) înlocuind domeniul D cu $\mathbb{N}$

(s_2) înlocuind codomeniul E cu $\mathbb{R}$

(s_3) înlocuind variabila x cu n
(sau cu m , sau i , etc)

(s_4) înlocuind f(x) cu a_n

	DOMENIUL	CODOMENIUL	VARIABILA	LEGEA DE CORESP.
Functie	D	E	x	f(x)
Sir	$\mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	n	a_n

În cele ce urmează vom utiliza acest mod de trecere de la o funcţie oarecare la un şir, pentru a obţine noţiunile de monotonie , mărginire şi limită ale unui şir drept cazuri particulare ale aceloraşi noţiuni pentru funcţii.

In mod frecvent putem atasa unui sir $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ o functie, obtinuta prin inlocuirea lui n cu x in expresia lui a_n (a_n devine f(x)).

EXEMPLU: Şirului $a_n = \frac{n+3}{2n+1}$ îi putem ataşa funcţia: $f(x) = \frac{x+3}{2x+1}$.

Totuşi există şiruri cărora nu le putem ataşa o funcţie prin acest procedeu. De exemplu $a_n = \frac{n!}{n+1}$.

Cu ajutorul funcţiei ataşate unui şir putem rezolva mai uşor problemele de monotonie, mărginire şi convergenţă a şirurilor, aşa cum vom vedea în cele ce urmează.

Utilizarea unei funcţii pentru studiul monotoniei, mărginirii şi a limitei unui şir oferă avantajul utilizării derivatei şi a tabelului de variaţie.

Pe de altă parte, este util să observăm că atit monotonia cit şi mărginirea şi limita unui şir sunt cazuri particulare ale aceloraşi noţiuni definite pentru funcţii. Această particularizare se obţine cu ajutorul celor patru etape (s_1) - (s_4) menţionate.

Iată cum se obţine această particularizare, mai intăi pentru monotonie şi mărginire, apoi şi pentru limită.

FUNCTII MONOTONE	SIRURI MONOTONE
a) funcţia $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ este monoton crescătoare dacă: $\forall x_1, x_2 \in D, x_1 \leq x_2 \longrightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$	a')şirul $f:\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$ este monoton crescător dacă: $\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}, n_1 \leq n_2 \longrightarrow a_{n_1} \leq a_{n_2}$ (1) Dacă este indeplinită condiţia (1) luind in particular $n_1=n$ şi $n_2=n+1$ deducem $a_n \leq a_{n+1}$ pentru orice n (2) In concluzie (1) $\longrightarrow$ (2) Este adevărată şi implicaţia reciprocă. Demonstraţia ei se poate deduce din următorul exemplu: dacă este indeplinită (2) şi luăm $n_1=7, n_2=11$, avem $n_1 \leq n_2$ şi din aproape in aproape $a_7 \leq a_8, a_8 \leq a_9, a_9 \leq a_{10}$ şi $a_{10} \leq a_{11}$, deci $a_7 \leq a_{11}$. Prin urmare (1) $\longleftrightarrow$ (2) . Deoarece condiţiile (1) şi (2) sunt echivalente, iar (2) este mai

	comodă, pentru definiţia şirului monoton crescător se utilizează această condiţie. Dar nu trebuie să pierdem din vedere că ea este echivalentă cu acea condiţie care se obţine din definiţia monotoniei funcţiilor, prin particularizările (s_1) - (s_4), ce caracterizează trecerea de la funcţie la şir.
b) funcţia $f:D \longrightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ este monoton descrescătoare dacă: $\forall x_1, x_2 \in D, x_1 \leq x_2 \Longrightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$	b') şirul $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$ este monoton descrescător dacă: $\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}, n_1 \leq n_2 \Longrightarrow a_{n_1} \geq a_{n_2}$ (3) Se poate arăta că această condiţie este echivalentă cu: $a_n \geq a_{n+1}$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$ (4)
FUNCTII MARGINITE	SIRURI MARGINITE
a) $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ este mărginită inferior dacă nu are valori spre $-\infty$, adică $\exists a \in \mathbb{R}, \forall x \in D, f(x) \geq a$	a') şirul $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$ este mărginit inferior dacă nu are valori spre $-\infty$, adică $\exists a \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$ $a_n \geq a$
b) $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, este mărginită superior dacă nu are valori spre $+\infty$, adică $\exists b \in \mathbb{R}, \forall x \in D$ $f(x) \leq b$.	b) şirul $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$ este mărginit superior dacă nu are valori spre $+\infty$, adică $\exists b \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{N}$ $a_n \leq b$
c) $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ este mărginită dacă este mărginită	c') şirul $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$ este mărginit dacă este mărginit in-

inferior şi superior, adică $\exists a,b\in\mathbb{R},\forall x\in D \quad a \le f(x) \le b$, cu alte cuvinte există un interval [a,b] în care sunt toate valorile funcţiei. Acest interval nu este,în general,simetric faţă de origine, dar îl putem considera astfel lărgind una din extremităţi suficient de mult.În acest caz [a,b] devine [-M , M] iar condiţia de mărginire are forma: $\exists M>0,\forall x\in D \quad -M \le f(x) \le M$ adică: $\exists M>0,\forall x\in D \quad \lvert f(x)\rvert \le M$	ferior şi superior, adică $\exists a,b\in\mathbb{R},\forall n\in\mathbb{N} \quad a \le a_n \le b$ SAU $\exists M>0,\forall n\in\mathbb{N} \quad \lvert a_n\rvert \le M$

METODE PENTRU STUDIUL MONOTONIEI SI MARGINIRII

METODE PENTRU FUNCŢII	METODE PENTRU ŞIRURI
Studiul monotoniei	
1. Utilizarea definiţiei : se consideră $x_1 \le x_2$ şi se compară diferenţa $f(x_1) - f(x_2)$ cu zero.Aceasta se poate face prin minorări şi majorări succesive,sau aplicând teorema lui Lagrange funcţiei f pe interva-	1'. Utilizarea definiţiei : se compară diferenţa $a_{n+1} - a_n$ cu zero,iar pentru şiruri cu termeni pozitivi putem compara câtul a_{n+1} / a_n cu unu.Putem face minorări şi majorări succesive,sau să aplicăm teorema lui Lagrange func-

lul $[x_1, x_2]$.	ţiei ataşate şirului considerat.
2. Utilizarea tabloului de variaţie.(în cazul funcţiilor derivabile)	2. Utilizarea tabloului de variaţie pentru funcţia ataşată.
După cum se ştie,din tabloul de variaţie al unei funcţii derivabile avem informaţii exacte atât despre monotonie cât şi despre mărginirea unei funcţii.	studiem monotonia funcţiei ataşate şirului dat şi utilizând criteriul cu şiruri se deduce că monotonia şirului este dată de monotonia acestei funcţii, pe intervalul $[0, \infty)$,(vezi Metoda 10 punctul c)
3. Utilizarea teoremei lui Lagrange:	3. Utilizarea teoremei lui Lagrange pentru funcţia ataşată.
permite înlocuirea diferenţei $f(x_2) - f(x_1)$ cu $f'(c)$, care se compară apoi cu zero.	
Studiul mărginirii	
1. Utilizarea definiţiei.	1'.Utilizarea definiţiei.
2. Utilizarea tabloului de variaţie.	2'.Utilizarea tabloului de variaţie pentru funcţia ataşată.
	3'.Dacă şirul se descompune într-un număr finit de subşiruri mărginite,el este mărginit.
	4'.Utilizarea monotoniei.
	Dacă un şir este monoton cel puţin jumătate din problema mărginirii este rezolvată şi anume:
	a)dacă şirul este monoton crescător,el este mărginit inferior de

	primul termen şi mai trebuie găsită doar marginea superioară. b)dacă şirul este monoton descrescător,el este mărginit superior de primul termen şi mai trebuie găsită doar marginea inferioară. C)DACA ŞIRUL ESTE MONOTON DESCRESCATOR ŞI CU TERMENI POZITIVI,EL ESTE MARGINIT.

EXERCITII:

I. Studiaţi monotonia şi mărginirea funcţiilor:

1. $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{dacă } x \leq 1 \\ x^2 + x + 1 & \text{dacă } x > 1 \end{cases}$

2. $f(x) = x^4 + |\, 3x^2 - 4 \,|$

3. $f(x) = (\ln x)^{\ln x}$, $f : [1,\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$

4. $f(x) = \dfrac{mx + n}{\sqrt{x^2 + x + 1}}$, $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

5. $f(x) = \sqrt{x - 2 - \sqrt{2x - 5}}$, $f : [3,\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$

6. $f(x) = \operatorname{arctg} x$, $f : \mathbb{R} \longrightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

Raspunsuri:

3. Putem scrie $f(x) = e^{\ln x \ln(\ln x)}$ şi avem tabloul de variaţie:

x	1				$e^{1/e}$					
f'(x)	-	-	-	.-	0	+	+	+	+	+
f(x)	1	↘			$e^{-1/e}$	↗				

deci funcţia este descrescătoare pe intervalul $(1 , e^{1/e})$ şi crescătoare pe $(e^{1/e} , \infty)$. Este mărginită inferior, minimul fiind $m = e^{-1/e}$ şi nu este mărginită superior.

5. Utilizăm formula de descompunere a radicalilor suprapuşi :

$$f(x) = \sqrt{A + \sqrt{B}} = \sqrt{\frac{A + C}{2}} - \sqrt{\frac{A - C}{2}} \quad , \quad \text{cu } C = A^2 - B$$

6. Fie $x_1 < x_2$. Pentru a obţine semnul diferenţei $f(x_1) - f(x_2)$ putem aplica teorema lui Lagrange funcţiei date, pe intervalul $[x_1 , x_2]$ (sunt indeplinite condiţiile teoremei): există deci $c \in \mathbb{R}$ astfel încât:

$$f(x_1) - f(x_2) = f'(c)(x_1 - x_2) = \frac{1}{1 - c^2}(x_1 - x_2) < 0$$

deci funcţia este crescătoare.

II. Studiaţi monotonia şi mărginirea şirurilor :

1. $a_n = \frac{\ln n}{n}$

2. $a_n = \sqrt[n]{n}$ determinaţi şi cel mai mic termen al şirului.

3. $a_n = n\, a^n$ determinaţi şi cel mai mic termen al şirului.

4. $a_n = \frac{n - 1}{\ln n} - \sqrt{n}$, pentru $n \geq 2$.

5. $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, $c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha}$, cu $\alpha \in (0 , 1)$, $d_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\gamma_n}$, γ_n fiind valoarea intermediară ce se obţine aplicând teorema lui Lagrange funcţiei $f(x) = \ln x$ pe intervalele $[n,n + 1]$.

Raspunsuri:

2. Funcţia ataşată şirului este $f(x) = x^{1/x}$. Din tabloul de variaţie:

x	2			e			3	
f'(x)	+	+	0	−	−	−	−	
f(x)	↗	↗	f(e)	↘		↘		

deducem, conform criteriului cu şiruri (criteriul lui Heine,vezi Metoda 10,punctul c)), tipul de monotonie al şirului studiat. Şirul are aceeaşi monotonie ca şi funcţia ataşată, deci este descrescător pentru $n \geq 3$. Deoarece şirul este descrescător dacă $n \geq 3$, pentru a afla cel mai mare termen trebuie comparaţi doar a_2 şi a_3. Deducem că cel mai mare termen al şirului este:

$a_3 = \sqrt[3]{3}$.

3. Funcţia ataşată şirului este $f(x) = x\, a^x$. Din tabelul de variaţie pentru $a \in (0,1)$:

x	0		$(-\ln a)^{-1}$				
f'(x)	+	+	0	−	−	−	−
f(x)	↗	↗		↘		↘	

utilizând punctul c) de la Metoda 10 deducem că şirul dat este crescător pentru n mai mic sau egal cu partea întreagă a lui

$(-\ln a)^{-1}$ şi este descrescător pentru $n \geq [(-\ln a)^{-1}] + 1$.

Deoarece $\lim\limits_{\substack{a\to 0\\ a>0}} (-\ln a)^{-1} = 0$ şi $\lim\limits_{\substack{a\to 1\\ a<1}} (-\ln a)^{-1} = +\infty$,

deducem că intervalul $\left[1 , [(-\ln a)^{-1}] \right]$ în care şirul este crescător poate fi oricât de mare şi oricât de mic.

6. Şirul de termen general a_n este crescător, şirul de termen general b_n este descrescător, iar şirul c_n este crescător dacă $\alpha \in [0 , n - \gamma_n]$ şi este descrescător pentru $\alpha \in [n-\gamma_n, 1]$.

III Utilizând teorema lui Lagrange:

1. să se demonstreze inegalitatea $|\sin x| \leq |x|$ pentru orice x real, apoi să se arate că şirul $a_1 = \sin x$, $a_2 = \sin \sin x$, ... , $a_n = \sin \sin \ldots \sin x$, este monoton şi mărginit oricare ar fi x , iar limita sa este zero.

2. să se studieze monotonia şi mărginirea şirurilor :

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \quad , \quad b_n = \arcsin\left(\frac{2\sqrt{n}}{1+n} \right) \quad , \quad c_n = \frac{\ln n}{n^2 + n}$$

$$d_n = \frac{n+1}{2n+1} + 2\ln n \quad , \quad e_n = n \cdot \sqrt{\frac{n+2}{n+3}}$$

Raspunsuri:

1. $|\sin x| \leq |x| \iff \left|\frac{\sin x}{x}\right| \leq 1$. Din teorema lui Lagrange aplicată funcţiei $f(t) = \sin t$ pe intervalul $[x,0]$ sau $[0,x]$, după cum x este negativ sau pozitiv, se obţine $\left|\frac{\sin x}{x}\right| = |\cos c| \leq 1$. Şirul satisface relaţia de recurenţă: $a_{n+1} = \sin a_n$, deci dacă $\sin x > 0$ se deduce că şirul este descrescător, iar dacă $\sin x < 0$ şirul este crescător. Evident că

este mărginit între -1 şi 1 . Notând cu L limita sa şi trecând la limită în relaţia de recurenţă obţinem $L = \sin L$, deci $L = 0$.

2. a) $a_{n+1} - a_n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n =$

$= \frac{f(n+1) - f(n)}{n+1-n}$, unde $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ defineşte funcţia ataşată şirului.

b) Aplicând teorema lui Lagrange funcţiei ataşată şirului, pe intervalul $[n,n+1]$, deducem $a_{n+1} - a_n = f'(c_n)$. Trebuie deci stabilit semnul derivatei:

$$f'(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \cdot \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}\right]$$

adică semnul lui $g(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$. Din tabloul de mai jos deducem $g(x) > 0$ pentru $x > 0$,

deci $a_{n+1} - a_n > 0$.

x	0				$+\infty$
$g'(x)$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$g(x)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$		

IV. 1. Fie I un interval oarecare şi $f : I \longrightarrow I$ o funcţie. Să se arate că şirul definit prin relaţia de recurenţă $a_{n+1} = f(a_n)$, cu a_0 dat, este:

(a) crescător dacă $f(x) - x > 0$ pe I

(b) descrescător dacă $f(x) - x < 0$ pe I.

2. Dacă şirul $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este crescător, iar şirul $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este descrescător şi $a_n \leq b_n$ pentru orice n , atunci:

(a) cele două şiruri sunt mărginite, deci convergente.

(b) dacă $\lim_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$ atunci ele au aceeaşi limită.

(c) să se aplice aceste rezultate şirurilor date prin formulele de recurenţă: $a_{n+1} = \sqrt{a_n \cdot b_n}$, $b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$ cu a_0 şi b_0 daţi.

REZOLVARI:

1. $a_{n+1} - a_n = f(a_n) - a_n > 0$ în primul caz.

2. cele două şiruri sunt mărginite între a_1 şi b_1 , deci şirurile sunt convergente, deoarece sunt şi monotone. Fie l_1 şi respectiv l_2 limitele lor. Din ipoteza de la (b) rezultă $l_1 = l_2$.

(c) şirurile au termeni pozitivi şi:

$$b_n^2 - a_n^2 = \left[\frac{b_{n-1} - a_{n-1}}{2}\right]^2 > 0 .$$

V. Să se studieze mărginirea şirurilor:

1. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{5}, \ldots, \frac{1}{2^n}, \frac{1}{n+2}, \ldots$

2. $\sin 1 , \frac{1}{2} , \sin\left(\frac{1}{2}\right) , \frac{1}{2} , \ldots , \sin\left[\frac{1}{n^2}\right] , \frac{1}{2^n} , \ldots$

3. $1 , 2 , \frac{1}{3} , 4 , \frac{1}{5} , 6 , \ldots$

4. $2 , 4 , \frac{9}{4} , \frac{27}{8} , \ldots , \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$

5. $\cos(\pi/4) , \cos(\cos(\pi/4)) , \ldots$

6. $1 , 2 , \sqrt{2} , \frac{3}{2} , \sqrt{3}, \ldots , a_n , b_n , \ldots$ cu $a_0 = 1$,

$b_0 = 2$, $a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n}$, $b_{n+1} = \frac{1 + b_n}{2}$

RASPUNS: Fiecare şir se descompune în două subşiruri mărginite (chiar convergente, având aceeaşi limită) deci sunt mărginite (convergente).

3. LIMITE DE SIRURI SI DE FUNCTII

Definiţia monotoniei şi mărginirii şirurilor a fost dedusă din definiţiile corespunzătoare pentru funcţii, prin procedeul arătat, de înlocuire a lui x cu n şi a lui $f(x)$ cu a_n. Cu acelaşi procedeu vom obţine şi definiţia limitei unui şir din definiţia limitei unei funcţii. Această metodă de particularizare a unei definiţii pentru funcţii în scopul obţinerii definiţiei analoage pentru şiruri pune în evidenţă legătura dintre şiruri şi funcţii. Şirurile fiind cazuri particulare de funcţii, este normal ca definiţiile monotoniei, mărginirii şi limitei unui şir să fie cazuri particulare ale definiţiilor corespunzătoare pentru funcţii.

LIMITE DE FUNCŢII

Definiţia limitei unei funcţii se bazează pe noţiunea de vecinătate a unui punct.

Intuitiv, mulțimea $V \subset \mathbb{R}$ este vacinătate pentru punctul $x_o \in \mathbb{R}$, dacă (1) $x \in V$ și în plus, (2) V conține și puncte vecine cu x_o (la stînga și la dreapta).

Evident că dacă există un interval deschis (a,b) astfel încât $x_o \in (a,b) \subset V$, atunci cele două condiții sunt îndeplinite.

<u>În particular, orice interval deschis (a,b) ce conține pe x_o satisface ambele condiții, deci este vecinătate pentru x_o.</u>

Pentru puncte finite vom considera în continuare ca vecinătăți intervale deschise cu centrul în acele puncte, deci de forma:

$$V_l = (l - \varepsilon \ , \ l + \varepsilon) \qquad V_{x_o} = (x_o - \delta \ , \ x_o + \delta)$$

și mulțimi care conțin astfel de intervale.

Pentru $+\infty$ nu are sens $V_\infty = (\infty - \varepsilon \ , \ \infty + \varepsilon)$, deci trebuie găsită o altă formă pentru vecinătățile lui $+\infty$. Pentru aceasta observăm că la dreapta lui $+\infty$ nu putem considera puncte, deci $\infty + \varepsilon$ trebuie înlocuit cu $+\infty$. De asemenea, deoarece $\infty - \varepsilon = \infty$, înlocuim pe $\infty - \varepsilon$ cu ε. Așadar, vom considera vecinătățile lui $+\infty$ de forma:

$$V_\infty = (\varepsilon \ , \ \infty)$$

și mulțimi care conțin astfel de intervale.

Analog, vecinătățile lui $-\infty$ sunt de forma:

$$V_{-\infty} = (-\infty \ , \ \varepsilon)$$

Definiția limitei unei funcții într-un punct exprimă condiția ca atunci cînd x se apropie de x_o , $f(x)$ să se apropie de valoarea l a limitei.

Cu ajutorul vecinătăților, această condiție se descrie prin:

$$\lim_{x \to x_o} f(x) = l \quad <=>$$

$\Leftrightarrow \quad [\ \forall V_l \quad \exists V_{x_o} \quad \forall x \in V_{x_o},\ x \neq x_o \Rightarrow f(x) \in V_l\ ] \qquad (***)$

După cum am arătat, pentru vecinătățile V_l și V_{x_o} din definiția (***), există trei forme esențiale, corespunzător punctelor finite și respectiv lui $+\infty$ și $-\infty$.

Convenție: Pentru scrierea vecinătăților lui l se folosește litera ε, iar pentru scrierea vacinătăților lui x_o se folosește litera δ.

Avem deci următoarele cazuri:

a) x_o - finit $\Rightarrow$ $V_{x_o} = (x_o - \delta\ ,\ x_o + \delta)$

iar $x \in V_{x_o} \Leftrightarrow x \in (x_o - \delta\ ,\ x_o + \delta) \Leftrightarrow x_o - \delta < x < x_o + \delta \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow -\delta < x - x_o < \delta \Leftrightarrow |\ x - x_o\ | < \delta$

b) $x_o = +\infty \Rightarrow V_{x_o} = V_\infty = (\delta\ ,\ +\infty)$

iar condiția $x \in V_{x_o}$ devine $x > \delta$

c) $x_o = -\infty \Rightarrow V_{x_o} = V_{-\infty} = (-\infty\ ,\ \delta)$

iar condiția $x_o \in V_{x_o}$ devine $x < \delta$

a') l - finit $\Rightarrow$ $V_l = (l - \varepsilon\ ,\ l + \varepsilon)$

deci condiția $f(x) \in V_l$ devine $f(x) \in (l - \varepsilon\ ,\ l + \varepsilon) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < f(x) - l < \varepsilon \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow |\ f(x) - l\ | < \varepsilon$

b') $l = +\infty \Rightarrow V_l = V_{+\infty} = (\varepsilon\ ,\ +\infty)$

iar condiția $f(x) \in V_l$ devine $f(x) > \varepsilon$

c') $l = -\infty \Rightarrow V_l = V_{-\infty} = (-\infty\ ,\ \varepsilon)$

iar condiția $f(x) \in V$ devine $f(x) < \varepsilon$

Toate aceste cazuri apar în tabelul 3.1.

Tabelul 3.1

x_0 \ l	l - finit	$l = +\infty$	$l = -\infty$
x_0 finit	$V_{x_0}=(x_0-\delta, x_0+\delta)$ $V_l=(l-\varepsilon, l+\varepsilon)$	$V_{x_0}=(x_0-\delta, x_0+\delta)$ $V_l=(\varepsilon, \infty)$	$V_{x_0}=(x_0-\delta, x_0+\delta)$ $V_l=(-\infty, \varepsilon)$
	$x \in V_{x_0} \iff$ $\iff \lvert x-x_0\rvert < \delta$	$x \in V_{x_0} \iff$ $\iff \lvert x-x_0\rvert < \delta$	$x \in V_{x_0} \iff$ $\iff \lvert x-x_0\rvert < \delta$
	$f(x) \in V_l \iff$ $\iff \lvert f(x)-l\rvert < \varepsilon$	$f(x) \in V_l \iff$ $\iff f(x) > \varepsilon$	$f(x) \in V_l \iff$ $\iff f(x) < \varepsilon$
$x_0 = +\infty$	$V_{x_0}=(\delta, \infty)$ $V_l=(l-\varepsilon, l+\varepsilon)$	$V_{x_0}=(\delta, \infty)$ $V_l=(\varepsilon, \infty)$	$V_{x_0}=(\delta, \infty)$ $V_l=(-\infty, \varepsilon)$
	$x \in V_{x_0} \iff$ $\iff x > \delta$	$x \in V_{x_0} \iff$ $\iff x > \delta$	$x \in V_{x_0} \iff$ $\iff x > \delta$
	$f(x) \in V_l \iff$ $\iff \lvert f(x)-l\rvert < \varepsilon$	$f(x) \in V_l \iff$ $\iff f(x) > \varepsilon$	$f(x) \in V_l \iff$ $\iff f(x) < \varepsilon$
$x_0 = -\infty$	$V_{x_0}=(-\infty, \delta)$ $V_l=(l-\varepsilon, l+\varepsilon)$	$V_{x_0}=(-\infty, \delta)$ $V_l=(\varepsilon, \infty)$	$V_{x_0}=(-\infty, \delta)$ $V_l=(-\infty, \varepsilon)$
	$x \in V_{x_0} \iff$ $\iff x < \delta$	$x \in V_{x_0} \iff$ $\iff x < \delta$	$x \in V_{x_0} \iff$ $\iff x < \delta$
	$f(x) \in V_l \iff$ $\iff \lvert f(x)-l\rvert < \varepsilon$	$f(x) \in V_l \iff$ $\iff f(x) > \varepsilon$	$f(x) \in V_l \iff$ $\iff f(x) < \varepsilon$

Considerând în definiția (***) fiecare situație corespunzătoare lui x_0 și l, avem în total 9 forme pentru definiția limitei unei

funcţii. Utilizând tabloul 3.1 avem următoarele nouă situaţii:

(l_1) x_0 - finit , l - finit

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l \iff$$

$$\iff [\ \forall\, \varepsilon>0 \ \ \exists\, \delta_\varepsilon>0 \ \ \forall\, x\neq x_0, \ \ |x-x_0|<\delta \ \Rightarrow \ |f(x)-l|<\varepsilon\ ]$$

(l_2) $x_0 = +\infty$, l - finit

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = l \iff$$

$$\iff [\ \forall\, \varepsilon>0 \ \ \exists\, \delta_\varepsilon>0 \ \ \forall\, x>\delta_\varepsilon \ \Rightarrow \ |f(x)-l|<\varepsilon\ ]$$

(l_3) $x_0 = -\infty$, l - finit

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = l \iff$$

$$\iff [\ \forall\, \varepsilon>0 \ \ \exists\, \delta_\varepsilon \ \ \forall\, x<\delta_\varepsilon \ \Rightarrow \ |f(x)-l|<\varepsilon\ ]$$

(l_4) x_0 - finit , $l = +\infty$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \iff$$

$$\iff [\ \forall\, \varepsilon \ \ \exists\, \delta_\varepsilon>0 \ \ \forall\, x\neq x_0, \ \ |x-x_0|<\delta_\varepsilon \ \Rightarrow \ f(x)>\varepsilon\ ]$$

(l_5) $x_0 = +\infty$, $l = +\infty$

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = +\infty \iff$$

$$\iff [\ \forall\, \varepsilon \ \ \exists\, \delta_\varepsilon \ \ \forall\, x>\delta_\varepsilon \ \Rightarrow \ f(x)>\varepsilon\ ]$$

(l_6) $x_0 = -\infty$, $l = +\infty$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty \iff$$

$$\iff [\ \forall\, \varepsilon \ \ \exists\, \delta_\varepsilon \ \ \forall\, x<\delta_\varepsilon \ \Rightarrow \ f(x)>\varepsilon\ ]$$

(l_7) x_0 - finit , $l = -\infty$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty \iff$$

$$\iff [\ \forall\, \varepsilon \ \ \exists\, \delta_\varepsilon>0 \ \ \forall\, x\neq x_0, \ \ |x-x_0|<\delta_\varepsilon \ \Rightarrow \ f(x) < \varepsilon\ ]$$

(l_8) $x_0 = +\infty$, $l = -\infty$

$\lim_{x \to -\alpha} f(x) = -\infty \iff$

$\iff [\ \forall \varepsilon \ \exists \ \delta_\varepsilon \ \forall x > \delta_\varepsilon \implies f(x) < \varepsilon\ ]$

(l_o) $x_o = -\infty$, $l = -\infty$

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty \iff$

$\iff [\ \forall \varepsilon \ \exists \ \delta_\varepsilon \ \forall \ x < \delta_\varepsilon \implies f(x) < \varepsilon\ ]$

EXERCIŢII:

I. Utilizând definitia, să se arate că:

1. $\lim_{x \to 5} (3x - 1) = 14$

2. $\lim_{x \to 1} \frac{2x + 3}{3x + 2} = 1$

3. $\lim_{x \to 2} \sqrt{x + 2} = 2$

4. $\lim_{x \to 1} \frac{1}{(x - 1)^2} = +\infty$

5. $\lim_{x \to 0} \frac{-1}{5x^2} = -\infty$

6. $\lim_{x \to a} \sin x = \sin a$

7. $\lim_{x \to a} \ln x = \ln a$

Răspunsuri:

In toate cazurile avem x_o-finit.

2. Parcurgem următoarele etape:

a) particularizăm definiţia limitei

$\lim_{x \to 1} \frac{2x + 3}{3x + 2} = 1 \iff$

$\iff [\ \forall\ \varepsilon > 0 \ \ \exists\ \delta_\varepsilon > 0 \ \ \forall\ x \neq 1, \ \ |x - 1| < \delta_\varepsilon \implies$

$\implies \left| \frac{2x + 3}{3x + 2} - 1 \right| < \varepsilon\ ]$

(ţinând cont de forma vecinătăţii).

b) considerăm $\varepsilon > 0$ oarecare; căutăm pe δ_ε astfel:.

c) facem calcule in expresia $| f(x) - l |$ punând in evidenţă modulul $| x - x_o |$.

$$| f(x)-l | = \left| \frac{2x+3}{3x+2} - 1 \right| = \frac{| x-1 |}{| 3x+2 |} .$$

d) majorăm (minorăm) expresia obținută, ținînd cont că ne interesează numai acele valori ale lui x pentru care $| x-x_o | < \delta_\varepsilon$.

Deci: $\frac{| x-1 |}{| 3x+2 |} < \frac{\delta_\varepsilon}{| 3x+2 |}$.

e) dacă expresia care mai depinde de x este mărginită (continuă) într-o vecinătate a lui x_o , putem majora în continuare, pentru a elimina pe x . Avem:

$$\frac{\delta_\varepsilon}{| 3x+2 |} = \delta_\varepsilon \frac{1}{| 3x+2 |} < \delta_\varepsilon \frac{1}{2}$$

deoarece în intervalul [0,2] de exemplu, care este o vecinătate a lui $x_o = 1$, funcția $g(x) = \frac{1}{| 3x+2 |}$ este continuă, deci mărginită: $g(x) \in [\frac{1}{5}, \frac{1}{2}]$, dacă $x \in [0,2]$.

f) determinăm pe δ_ε , punând condiția ca expresia la care am ajuns (și care nu mai depinde de x , ci doar de δ_ε) să fie mai mică decît ε :

$$\delta_\varepsilon \frac{1}{2} < \varepsilon \Rightarrow \delta_\varepsilon < 2\varepsilon$$

Orice δ_ε care îndeplinește această condiție este convenabil. Putem de exemplu alege $\delta_\varepsilon = \frac{3}{2}\varepsilon$ sau $\delta_\varepsilon = \varepsilon$ etc.

Pentru a putea folosi și majorarea făcută funcției g , trebuie să avem și $\delta_\varepsilon \le 1$, deci de fapt $\delta_\varepsilon = \min(1, \frac{3}{2}\varepsilon)$ (de exemplu).

Rezultă:

$$| f(x)-l | = \frac{| x-1 |}{| 3x+2 |} < \frac{\delta_\varepsilon}{| 3x+2 |} < \frac{\delta_\varepsilon}{2} = \min(1, \frac{3}{2}\varepsilon) < \varepsilon$$

3. a) $\lim_{x \to 2} \sqrt{x+2} = 2 \iff$

$\iff [\forall \varepsilon>0 \ \exists \delta_\varepsilon>0 \ \forall x \neq 2, \ |x-2| < \delta_\varepsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow | \sqrt{x+2} - 2 | < \varepsilon]$

b) fie $\varepsilon > 0$; căutăm pe δ_ε

c) $$\left| \sqrt{x+2} - 2 \right| = \frac{|x-2|}{\left| \sqrt{x+2} + 2 \right|}$$

d) $$\frac{|x-2|}{\sqrt{x+2}+2} < \frac{\delta_\varepsilon}{\sqrt{x+2}+2}$$

e) $$\frac{\delta_\varepsilon}{\sqrt{x+2}+2} = \delta_\varepsilon \frac{1}{\sqrt{x+2}+2} < \delta_\varepsilon \frac{1}{3}$$, deoarece în intervalul [1,3] de exemplu, funcția $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}+2}$ este mărginită între $\frac{1}{\sqrt{5}+2}$ și $\frac{1}{\sqrt{3}+2}$

f) determinăm pe δ_ε din condiția: $\frac{\delta_\varepsilon}{3} < \varepsilon$.

Obținem $\delta_\varepsilon < 3\varepsilon$, deci putem lua de exemplu $\delta_\varepsilon = \varepsilon$. Dar pentru a fi valabilă și majorarea care am făcut-o funcției g trebuie să avem și $\delta_\varepsilon \leq 1$, deci de fapt $\delta_\varepsilon = \min(1,\varepsilon)$.

Rezultă:

$$\frac{|x+2|}{\sqrt{x+2}+2} < \frac{\delta_\varepsilon}{\sqrt{x+2}+2} < \frac{\delta_\varepsilon}{3} = \frac{\min(1,\varepsilon)}{3} < \varepsilon$$

deci condiția din definiția limitei este și în acest caz îndeplinită.

4) a) $\lim\limits_{x \to 1} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty$ <=>

<=> $\left[\forall\, \varepsilon>0 \quad \exists\, \delta_\varepsilon>0 \quad \forall\, x \neq 1, \quad |x-1| < \delta_\varepsilon \Rightarrow \frac{1}{(x-1)^2} > \varepsilon \right]$

b) fie ε oarecare (nu neapărat pozitiv deoarece $l = +\infty$, deci $V_l = (\varepsilon , +\infty)$ are sens pentru orice ε , nu numai pentru ε pozitiv).

c) $$\frac{1}{(x-1)^2} = \frac{1}{|x-1|^2}$$

d) $\frac{1}{|x-1|^2} < \frac{1}{\delta_\varepsilon^2}$ (deoarece se au în vedere doar acei x, pentru care $|x-1| < \delta_\varepsilon$).

f) $\frac{1}{\delta_\varepsilon^2} > \varepsilon \Rightarrow \delta_\varepsilon^2 < \frac{1}{\varepsilon}$, deci putem lua $\delta_\varepsilon = \frac{1}{2\sqrt{\varepsilon}}$

Atunci:

$$\frac{1}{(x-1)^2} = \frac{1}{|x-1|^2} > \frac{1}{\delta_\varepsilon^2} = \frac{1}{\frac{1}{4\varepsilon}} = 4\varepsilon > \varepsilon$$

II. Utilizând definiția, să se arate că:

1. $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{3x+1}{2x-1} = \frac{3}{2}$ 2. $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{x^2+1}{x-100} = \infty$

Răspunsuri:

1. a) $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{3x+1}{2x-1} = \frac{3}{2} \iff$

$\iff \left[\forall \varepsilon>0 \ \exists \delta_\varepsilon \ \forall x>\delta_\varepsilon \Rightarrow \left| \frac{3x+1}{2x-1} - \frac{3}{2} \right| < \varepsilon \right]$

b) fie $\varepsilon > 0$ oarecare; căutăm pe δ_ε.

c) deoarece x_o nu mai este finit, nu mai putem pune în evidență $|x - x_o|$. Vom proceda altfel: considerăm inegalitatea $|f(x) - l| < \varepsilon$ ca inecuație în necunoscuta x (utilizând și faptul că $x \to \infty$, deci putem considera $|2x+1| = 2x+1$).

Avem:

$$|f(x) - l| < \varepsilon \iff \left| \frac{3x+1}{2x-1} - \frac{3}{2} \right| < \varepsilon \iff$$

$$\iff \frac{1}{2|2x+1|} < \varepsilon \iff \frac{1}{2(2x+1)} < \varepsilon \quad \left[\text{pentru } x > -\frac{1}{2} \right]$$

$$\iff 2x+1 > \frac{1}{2\varepsilon} \iff x > \frac{1-2\varepsilon}{4\varepsilon}$$

Deci pentru $\delta_\varepsilon = \max(-\frac{1}{2}, \frac{1-2\varepsilon}{4\varepsilon})$ și $x > \delta_\varepsilon$, avem:

$$\left| \frac{3x + 1}{2x - 1} - \frac{3}{2} \right| < \varepsilon .$$

2. a) $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{x^2 + 1}{x - 100} = \infty$ <=>

<=> $[\forall \varepsilon \ \exists \delta_\varepsilon \ \forall x > \delta_\varepsilon \ \frac{x^2 + 1}{x - 100} > 100]$

b) fie ε oarecare; determinăm pe δ_ε .

c) exprimăm pe x din inegalitatea $f(x) > \varepsilon$:

$\frac{x^2 + 1}{x - 100} > \varepsilon$ <=> (putem presupune $x > 100$ pentru că $x \longrightarrow \infty$) <=> $x^2 + 1 - \varepsilon x + 100\varepsilon > 0$. Dacă x_1 şi x_2 sunt rădăcinile ecuaţiei de gradul doi ataşate şi presupunem $x_1 < x_2$, avem $f(x) > \varepsilon$ <=> $x > \max(100 , x_2)$.

Deci putem lua $\delta_\varepsilon = \max(100 , x_2)$.

LIMITE DE ŞIRURI

Definiţia limitei unui şir se deduce din definiţia limitei unei funcţii făcând particularizările menţionate:

(1) x se înlocuieşte cu n

(2) f(x) se înlocuieşte cu a_n

(3) x_o se înlocuieşte cu n_o

În plus trebuie observat că nu are sens $n_o = -\infty$ şi nici n_o finit (de exemplu, nu are sens $n \longrightarrow 3$, căci n fiind număr natural, nu se poate apropia oricît de mult de 3).

Aşadar, din cele nouă forme ale limitei unei funcţii se particularizează doar trei: cele corespunzătoare lui $x_o = + \infty$.

Avem deci:

(l_{10}) l - finit (se transpune definiţia (l_2))

$$\lim_{n\to\infty} a_n = l \iff [\forall \varepsilon>0 \ \exists \delta_\varepsilon \ \forall n>\delta_\varepsilon \ |a_n - l| < \varepsilon]$$

Deoarece în inegalitatea $n > \delta_\varepsilon$ n este număr natural, putem considera şi pe δ_ε număr natural. Pentru a sublinia acest lucru vom scrie n_ε în loc de δ_ε. Avem deci:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = l \iff [\forall \varepsilon>0 \ \exists n_\varepsilon\in \mathbb{N} \ \forall n>n_\varepsilon \Rightarrow |a_n - l| < \varepsilon]$$

(l_{11}) $l = +\infty$ (se transpune definiţia (l_5))

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty \iff [\forall \varepsilon>0 \ \exists n_\varepsilon\in \mathbb{N} \ \forall n>n_\varepsilon \Rightarrow a_n > \varepsilon]$$

(l_{12}) $l = -\infty$ (se transpune definiţia (l_8))

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty \iff [\forall \varepsilon \ \exists n_\varepsilon\in \mathbb{N} \ \forall n>n_\varepsilon \Rightarrow a_n < \varepsilon]$$

EXEMPLE:

I. Utilizând definiţia, arătaţi că:

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n-1}{3n+1} = 1$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^2+n+1} = 0$

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3}{2^n+3} = 0$

4. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n^2+n+1} = \infty$

RASPUNSURI:

1. Adaptăm etapele corespunzătoare pentru limite de funcţii, în cazul $x_0 = +\infty$.

a) $$\lim_{n\to\infty} \frac{3n-1}{3n+1} = 1 \iff [\forall \varepsilon>0 \ \exists n_\varepsilon\in \mathbb{N} \ \forall n>n_\varepsilon \ \left|\frac{3n-1}{3n+1} - 1\right| < \varepsilon]$$

b) fie $\varepsilon > 0$ oarecare; determinăm pe $n_\varepsilon\in \mathbb{N}$.

c) considerăm inegalitatea: $|a_n - l| < \varepsilon$ ca inecuaţie cu necunoscuta n :

$$\left|\frac{3n-1}{3n+1} - 1\right| < \varepsilon \iff \frac{2}{3n+1} < \varepsilon \iff n > \frac{\frac{2}{\varepsilon} - 1}{3}$$

deci $n_\varepsilon = \left[\frac{2-\varepsilon}{3\varepsilon} \right] + 1$

2. a) $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2+n+1} = 0 \iff$

$\iff \left[\forall\, \varepsilon>0 \;\; \exists\, n_\varepsilon \in \mathbb{N} \;\; \forall\, n>n_\varepsilon \;\; \left| \frac{1}{n^2+n+1} \right| < \varepsilon \right]$

b) fie $\varepsilon > 0$ oarecare; determinăm pe $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel:

c) $\frac{1}{n^2+n+1} < \varepsilon \iff \varepsilon n^2 + \varepsilon n + \varepsilon - 1 > 0$; Fie n_1 şi n_2 soluţiile acestei ecuaţii de gradul doi ($n_1 < n_2$). Atunci pentru $n > n_2$ avem satisfăcută inegalitatea considerată .

Deci $n_\varepsilon = [\, n_2 \,] + 1$.

METODE PENTRU CALCULUL LIMITELOR DE FUNCŢII ŞI DE ŞIRURI

Iată acum cele mai frecvente metode de calcul a limitelor de şiruri şi de funcţii, la nivelul manualelor de liceu.

METODE COMUNE PENTRU ŞIRURI ŞI PENTRU FUNCŢII

1. DEFINITIA. In capitolul unu am arătat cum se foloseşte definiţia pentru demonstrarea limitelor, atit pentru şiruri, cât şi pentru funcţii. Completăm cele spuse cu următorul set de exerciţii:

I. Cu ajutorul definiţiei, studiaţi dacă există limita următoarelor şiruri şi funcţii:

1. $a_n = \dfrac{\sqrt{n^2 - 100}}{n}$

2. $a_n = \sqrt{n^2 - 100}$

3. $a_n = \dfrac{\sqrt{n^2 - 100}}{700 - n}$

4. $f(x) = \sqrt{x}$ - în $x_o = 2$ şi $x_o = a$

5. $f(x) = \cos x$ - în $x_o = \dfrac{\pi}{2}$ şi $x_o = a$

6. $f(x) = 5^{x^2+1}$ - în $x_o = 1$ şi $x_o = a$

2. DAREA FACTORULUI COMUN FORTAT. Metoda se utilizează adesea pentru înlăturarea nedeterminărilor de forma $\dfrac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $\dfrac{0}{0}$. Prin scoaterea factorului comun foţat se urmăreşte obţinerea a cât mai multe expresii ce tind la zero. Pentru aceasta se utilizează frecvent următoarele trei limite:

$$(1)\quad \lim_{\substack{x \to 0 \\ x > 0}} x^{\alpha} = \begin{cases} 0 & \text{dacă } \alpha > 0 \\ 1 & \text{dacă } \alpha = 0 \\ \infty & \text{dacă } \alpha < 0 \end{cases}$$

$$(2)\quad \lim_{x \to \infty} x^{\alpha} = \begin{cases} \infty & \text{dacă } \alpha > 0 \\ 1 & \text{dacă } \alpha = 0 \\ 0 & \text{dacă } \alpha < 0 \end{cases}$$

$$(3)\quad \lim_{n \to \infty} x^{n} = \begin{cases} 0 & \text{dacă } x \in (-1, 1) \\ 1 & \text{dacă } x = 1 \\ \infty & \text{dacă } x > 1 \end{cases}$$

Pentru a avea expresii ce tind la zero se urmăreşte aşadar:

- obţinerea a cât mai mulţi termeni de forma x^{α}, cu $\alpha < 0$, dacă $x \longrightarrow \infty$.
- obţinerea a cât mai mulţi termeni de forma x^{α}, cu $\alpha > 0$, dacă $x \longrightarrow 0$.

EXEMPLE:

I. Să se calculeze:

1. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{3x^2 - x + 2}{x^2 + x + 5}$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{7^{n+3} + 9^n}{7^{n+2} - 9^{n+1}}$

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n + 2\cdot 3^n + 3\cdot 5^n}{3^n + 3\cdot 4^n + 4\cdot 5^n}$

4. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n + 3^n + x^n}{3^n + 4^n}$, $x>0$

5. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2\cdot a^n + b^n}{3\cdot a^n + 4\cdot b^n}$

6. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n+2)! - (n+1)!}{(n+2)! + (n+1)!}$

7. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n^3 - 2\cdot n^2 - 2} + \sqrt[3]{n^4 + 1}}{\sqrt[4]{n^6 + 6\cdot n^5 + 2} + \sqrt[5]{n^7 + 3\cdot n^3 + 1}}$

8. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{\sqrt{x + 2\cdot\sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{2x - \sqrt{x}}}$

9. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln(x^2 + x + 1)}{\ln(x^{10} + x + 2)}$

10. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{\sqrt[m]{x + 3\cdot\sqrt[n]{x}}}{\sqrt[n]{3x + \sqrt[m]{x}}}$

11. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{(x+1)\cdot\ldots\cdot(x^n + 1)}{\left[(nx)^n + 1\right]^{\frac{n+1}{2}}}$

12. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln|x|}{1 + \ln|x|}$

13. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln(x + e^x)}{\ln(x^2 + e^{2x})}$

RASPUNSURI:

2. Dând factor comun pe 9^n obţinem termeni de forma x^n, cu x subunitar.

9. $$\frac{\ln(x^2 + x + 1)}{\ln(x^{10} + x + 2)} = \frac{\ln x^2\left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{\ln x^{10}\left(1 + \frac{1}{x^9} + \frac{1}{x^{10}}\right)} =$$

$$= \frac{2\ln x + \ln\left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{10\ln x + \ln\left(1 + \frac{1}{x^9} + \frac{1}{x^{10}}\right)},$$ expresie care tinde la $\frac{1}{5}$ când x tinde la infinit.

II. Să se traseze graficele funcţiilor:

1. $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n}{2^n + x^n}$, $x > 0$

2. $f(x) = \lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{x^{2n+2}}{2^{2n} + x^{2n}}$

3. $f(x) = \lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{1 + x + \ldots + x^n}{1 + x^n}$

4. $f(x) = \lim\limits_{n \to \infty} \sqrt{1 + x^n}$, $x > -1$

5. $f(x) = \lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{\ln(2^n + x^n)}{n}$

6. $f(x) = \lim\limits_{n \to \infty} (x - 1) \cdot \operatorname{arctg} x^n$

7. $f(x) = \lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{x^{n+1} - 2 \cdot \ln^{n+1} x}{x^n + 3 \cdot \ln^n x}$

8. Pentru orice funcţie raţională, nenulă, R, cu coeficienţi reali, avem:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{R(x)}{R(x+1)} = 1$$ (Manual cls XII)

3. *AMPLIFICAREA CU CONJUGATA.* Se utilizează pentru înlăturarea nedeterminărilor ce conţin radicali. Dacă nedeterminarea provine de la o expresie de forma:

$$\sqrt[p]{u(x)} - \sqrt[p]{v(x)}$$

atunci amplificăm cu:

$$\sqrt[p]{u^{p-1}(x)} + \sqrt{u^{p-2}(x) \cdot v(x)} + \ldots + \sqrt{v^{p-1}(x)} \qquad (3.1)$$

în scopul eliminării radicalilor din expresia iniţială. Suma din (3.1) se numeşte conjugata de ordin p.

Dacă nedeterminarea este dată de o expresie de forma:

$$\sqrt[p]{u(x)} + \sqrt[p]{v(x)}$$

cu p - număr impar, conjugata este:

$$\sqrt[p]{u^{p-1}(x)} - \sqrt[p]{u^{p-2}(x) \cdot v(x)} + \ldots + \sqrt[p]{v^{p-1}(x)} \ .$$

Un exemplu de aplicare a acestei formule este exerciţiul 5 de mai jos.

EXERCITII:

1. $\lim_{x \to \infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - \sqrt[3]{x^3 - x^2 + 1} \right)$

2. $\lim_{x \to \infty} \dfrac{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 2x + 3}}{x - 3}$

3. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt[n]{1 + x} - \sqrt[n]{1 - x}}{x}$

4. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt[m]{1 + x} + \sqrt{1 - x}}{x}$

5. $\lim_{x \to -1} \dfrac{1 + \sqrt[3]{x}}{1 + \sqrt[5]{x}}$

6. $\lim_{n \to \infty} n^{\frac{m-p}{mp}} \dfrac{\sqrt[m]{n + 1} - \sqrt[m]{n - 1}}{\sqrt[p]{n + 1} - \sqrt[p]{n - 1}}$

7. $\lim_{n \to \infty} \left(a_0 \sqrt[3]{n} + a_1 \sqrt[3]{n + 1} + \ldots + a_k \sqrt[3]{n + k} \right)$, cu $a_0 + a_1 + \ldots + a_k = 0$

RASPUNSURI:

7. Se înlocuieşte de exemplu $a_0 = -a_1 - a_2 - \ldots - a_k$, în şirul dat şi se calculează k limite de forma:

$$\lim_{n \to \infty} a_i \left(\sqrt[3]{n} - \sqrt[3]{n + i} \right)$$

4. UTILIZAREA LIMITELOR FUNDAMENTALE. În cele ce urmează vom numi limite fundamentale următoarele limite:

$$(a) \qquad \lim_{\alpha \to 0} \frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1$$

(b) $\lim_{\alpha \to 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e$

(c) $\lim_{\alpha \to 0} \frac{a^{\alpha} - 1}{\alpha} = \ln a$

Observatie:

Din (a) se deduce:

$$\lim_{\alpha \to 0} \frac{\arcsin \alpha}{\alpha} = 1 \; ; \quad \lim_{\alpha \to 0} \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\alpha} = 1 \; ; \quad \lim_{\alpha \to 0} \frac{\operatorname{arctg} \alpha}{\alpha} = 1$$

Din (b) se deduce:

$$\lim_{\alpha \to \infty} \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right)^{\alpha} = e$$

Din (c) se deduce:

$$\lim_{\alpha \to 0} \frac{\ln(1 + \alpha)}{\alpha} = 1 \; ; \quad \lim_{\alpha \to \alpha_0} \frac{a^{\alpha} - a^{\alpha_0}}{\alpha - \alpha_0} = a^{\alpha} \cdot \ln a$$

EXERCITII:

I. Să se calculeze:

1. $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{\sin 7x}$

2. $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

3. $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos kx}{x^2}$

4. $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos^3 x}{x^2}$

5. $\lim_{x \to \pi} \frac{\sin 3x}{\sin 8x}$

6. $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - \operatorname{tg} x}{x^2 \operatorname{tg} x}$

7. $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x}{x^2}$

8. $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x \cdot \ldots \cdot \cos nx}{x^2}$

9. $\lim_{x \to 1} \frac{\cos \pi x + 1}{(x - 1)^2}$

10. $\lim_{x \to \pi} \frac{\sin mx}{\sin nx}$

11. $\lim_{x \to 0} \frac{x^m - \sin^n x}{x^{n+2}}$ pentru diferite valori ale lui $n \in \mathbb{N}$

12. $\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin x - \operatorname{arctg} x}{x^3}$

13. $\lim_{x \to n\pi} \frac{\arcsin (\operatorname{tg} x)}{\operatorname{arctg} (\sin x)}$

13. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \ln(1-x)}{\operatorname{arctg}(1+x) - \operatorname{arctg}(1-x)}$

RASPUNSURI:

12. Notând $\alpha = \arcsin x - \operatorname{arctg} x$, observăm că α tinde la zero când x tinde la zero, deci urmărim să obţinem $\dfrac{\alpha}{\sin \alpha}$. În acest scop amplificăm cu

$\sin \alpha = \sin(\arcsin x - \operatorname{arctg} x) = \sin(\arcsin x)\cos(\operatorname{arctg} x) -$

$- \sin(\operatorname{arctg} x)\cos(\arcsin x).$

Notând cu: $u = \arcsin x$, $v = \operatorname{arctg} x$,

rezultă $x = \sin u$, deci $\cos u = \sqrt{1 - x^2}$

$x = \operatorname{tg} v$, deci $\cos v = \dfrac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$, $\sin v = \dfrac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$

II. Să se calculeze:

1. $\lim\limits_{x \to \infty} \left(\dfrac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right)^{x^2}$

2. $\lim\limits_{x \to 0} \left(\dfrac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

3. $\lim\limits_{n \to \infty} \operatorname{tg}^n \dfrac{\pi}{4}$

4. $\lim\limits_{\to 0} \left(1 + x^2 \right)^{\operatorname{ctg}^2 x}$

5. $\lim\limits_{x \to 0} \left(\dfrac{a^{x^2} + b^{x^2}}{a^x + b^x} \right)^{\frac{1}{x}}$

6. $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{\ln(1 + 3^x)}{\ln(1 + 2^x)}$

7. $\lim\limits_{x \to e} \left(\ln x \right)^{\frac{1}{x^2 - 3ex + 2e^2}}$

8. $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{3^{3n}}{\left(3 + \frac{1}{n} \right)^{3n}}$

RASPUNSURI:

6. În limitele în care apar nedeterminări cu logaritmi, se urmăreşte permutarea limitei cu logaritmul:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\ln(1+2^x)}\cdot\ln(1+3^x)=\lim_{x\to-\infty}\ln\left(1+3^x\right)^{\frac{1}{\ln(1+2^x)}}=$$

$$=\ln\lim_{x\to-\infty}\left(1+3^x\right)^{\frac{1}{\ln(1+2^x)}}=$$

$$=\ln\lim_{x\to-\infty}\left[\left(1+3^x\right)^{\frac{1}{3^x}}\right]^{\frac{1}{\ln(1+2^x)}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{3^x}{\ln(1+2^x)}=$$

$$=\text{(permutăm din nou limita cu logaritmul)}=\frac{1}{\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{3^x}\cdot\ln(1+2^x)}=$$

$$=\frac{1}{\lim\limits_{x\to-\infty}\ln\left(1+2^x\right)^{\frac{1}{3^x}}}=\frac{1}{\ln\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+2^x\right)^{\frac{1}{3^x}}}=$$

$$=\frac{1}{\ln\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\left(1+2^x\right)^{\frac{1}{2^x}}\right]^{\frac{2^x}{3^x}}}=\frac{1}{\infty}=0$$

III. Să se calculeze:

1. $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{a^x-a^a}{x-a}$

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^{\operatorname{tg}x}-1}{x}$

3. $\lim\limits_{x\to\pi/4}\dfrac{9^{\sin x}-3^{\sqrt{2}}}{x-\frac{\pi}{4}}$

4. $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt[n]{2}-1\right)$

5. $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\cos\dfrac{1}{n}-1\right)$

6. $\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\arcsin\dfrac{1}{n}$

7. $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt[3]{\cos\dfrac{1}{n}}-1\right)$

8. $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt[n]{a}-1\right)$

9. $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt[n]{a_1}+\sqrt[n]{a_2}+\ldots+\sqrt[n]{a_p}-p\right)$

RASPUNSURI:

1. $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{a^x - a^a}{x - a} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{a^a\left(a^{x-a} - 1\right)}{x - a}$ şi notând $x - a = \alpha$,

obţinem: $l = a^a \lim\limits_{\alpha \to 0} \dfrac{a^\alpha - 1}{\alpha} = a^a \ln a$.

4. Considerăm funcţia: $f(x) = x\left(2^{\frac{1}{x}} - 1\right)$ obţinută din a_n

prin înlocuirea lui n cu x. Calculăm: $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} =$

$= \ln 2$.

Conform criteriului cu şiruri (vezi metoda 10 punctul c), avem de asemenea: $\lim\limits_{n \to \infty} a_n = \ln 2$.

5. CEVA MARGINIT INMULTIT CU CEVA CARE TINDE LA ZERO, TINDE LA ZERO. (A) Dacă $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este mărginit şi $\lim\limits_{n \to \infty} b_n = 0$, atunci:

$$\lim_{n \to \infty} a_n \cdot b_n = 0$$

(B) Dacă f este mărginită într-o vecinătate a lui x_0 şi $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = 0$, atunci $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$.

EXEMPLE:

1. $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{(-1)^n}{n} = 0$ pentru că $(-1)^n$ este mărginit între -1 şi 1. iar $\dfrac{1}{n}$ tinde la zero;

2. $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = 0$ pentru că $1 - \cos x$ este mărginită între 0 şi 2, iar $\dfrac{1}{x^2}$ tinde la zero;

3. $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{\sin x}{x} = 0$;

4. $\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha_n}{n}$, unde α_n este a n-a zecimală a numărului π;

5. $\lim_{n\to\infty} \frac{\beta_n}{2n^2+1}$, unde β_n este aproximaţia cu n zecimale exacte a numărului e;

6. $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n + (-2)^n}{n - 2^n}$;

7. $\lim_{n\to\infty} \frac{\operatorname{sgn}(n^2 - 3n + 2)}{e^{n+1}}$;

8. $\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(n^2 + 3n + 5)}{n^2 + 3n + 5}$;

9. $\lim_{n\to\infty} \frac{a\cdot \operatorname{ctg}(n\cdot x)}{nx^2 + 2}$;

10. $\lim_{x\to 0} x\cdot \operatorname{arctg}\frac{1}{x}$;

11. $\lim_{n\to\infty} \frac{n\cdot\sin(n!)}{n^2 + 1}$;

12. $\lim_{x\to\infty} \frac{x - [x]}{x}$;

13. $\lim_{x\to 0} \frac{(-1)^{[x]}\cdot\sin(x^2)}{x}$;

Indicatii:

4. $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este mărginit între 0 şi 9, fiind format din cifre;

5. $(\beta_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este mărginit între 2 şi 3;

6. *METODA MAJORARII SI MINORARII.* (A) Dacă există funcţiile g şi h astfel încît într-o vecinătate a lui x_0 să avem:

$$g(x) \le f(x) \le h(x) \qquad \text{şi}$$

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0} h(x) = l$$

atunci $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$.

Schematic:



(B) Dacă există şirurile $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ şi $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ astfel încât:

$b_n \leq a_n \leq c_n$ începând de la un rang n_o şi $\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} c_n = l$

atunci: $\lim_{n \to \infty} a_n = l$.

Schematic:



Observatie:

Dacă $l = +\infty$, se poate renunţa la h [respectiv la $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$], iar dacă $l = -\infty$, se poate renunţa la g [respectiv la $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$].

Această metodă este mai greu de aplicat, datorita majorărilor şi minorărilor pe care le presupune. Acestea trebuie să ducă la expresii cît mai puţin diferite de forma iniţială pentru a nu modifica limita.

Amintim cîteva procedee, dintre cele mai frecvent întâlnite, pentru obţinerea şirurilor $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ şi $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

1. Punem în loc de toţi termenii şirului $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ pe cel mai mic dintre ei (pe cel mai mare).

Exemple:

a) $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \ldots + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

b) $a_n = \frac{1}{\sqrt[p]{n^p+1}} + \frac{1}{\sqrt[p]{n^p+2}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt[p]{n^p+n}}$

Raspunsuri:

a) In suma care exprimă şirul $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ există un cel mai mic termen, $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$, şi un cel mai mare termen, $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$. Aplicind procedeul 1., avem:

$$a_n \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} \longrightarrow 1$$

$$a_n \geq \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \longrightarrow 1$$

deci $a_n \longrightarrow 1$.

2. Minorăm (majorăm) termenii ce formează şirul a_n cu aceeaşi cantitate.

Exemple:

a) $a_n = \frac{\sin 1}{n^2+1} + \frac{\sin 2}{n^2+2} + \ldots + \frac{\sin n}{n^2+n}$

b) $a_n = \frac{\sin x}{n^2+1} + \frac{\sin 2x}{n^2+2} + \ldots + \frac{\sin nx}{n^2+n}$

Raspunsuri:

a) De data aceasta nu există un cel mai mic (cel mai mare) termen în suma ce formează şirul a_n. Aceasta datorită faptului că funcţia $f(x) = \sin x$ nu este monotonă. Ţinând cont că avem: $-1 \leq \sin x \leq 1$, putem majora înlocuind peste tot $\sin x$ cu 1.Obţinem:

$$a_n \leq \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+1} + \ldots + \frac{1}{n^2+1} = \frac{1}{n^2+1} \longrightarrow 0$$

Analog,putem minora înlocuind peste tot $\sin x$ cu -1,apoi aplicând primul procedeu rezultă:

$$a_n \geq \frac{-1}{n^2+n} + \frac{-1}{n^2+n} + \ldots + \frac{-1}{n^2+n} = \frac{-n}{n^2+n} \longrightarrow 0$$

deci $a_n \longrightarrow 0$.

3. **Minorăm (majorăm)** renunțând la unii termeni ce formează șirul a_n .

Exemple:

a) $a_n = \sqrt[n]{1^p + 2^p + \ldots + n^p}$

b) $a_n = \sqrt[n]{1^n + 2^n + \ldots + n^n}$

Raspunsuri:

b) $a_n \geq \sqrt[n]{n^n} = n \longrightarrow \infty$, deci $a_n \longrightarrow \infty$

EXERCITII:

I. Să se calculeze limitele șirurilor:

1. $a_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right)$

2. $a_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\sqrt{1 + \frac{k^2}{n^3}} - 1 \right)$

3. $a_n = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{tg} \frac{2k}{n^2}$

4. $a_n = \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + \ldots + b_k^2}$, cu $1 < b_1 < b_2 < \ldots < b_k$

5. $a_n = \sqrt{b_1^n + b_2^n + \ldots + b_k^n}$, cu $b_i > 0$, $i \in \overline{1,k}$

Raspunsuri:

1. $\sum_{k=1}^{n} \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} \right) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\frac{k}{n^2}}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}}} =$

$= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}}}$. Majorăm utilizînd cel mai mic şi cel mai mare numitor. Obţinem astfel numitori comuni pentru sumă.

3. $\operatorname{tg} \frac{2k}{n^2} = \frac{\sin \frac{2k}{n^2}}{\cos \frac{2k}{n^2}}$ şi se fac minorări şi majorări utilizând cel mai mare şi cel mai mic numitor.

7. *EXERCITII IN CARE APARE PARTEA INTREAGA.* Cele mai întâlnite metode pentru rezolvarea lor sunt:

(A) Metoda majorării şi minorării utilizând dubla inegalitate: $a - 1 < [\, a \,] \leq a$ (3.2)

cu ajutorul căreia se încadrează funcţia (şirul) a cărei limită trebuie calculată între două funcţii (şiruri) care nu mai conţin partea întreagă.

Utilizând acest procedeu când este vorba de funcţii, de cele mai multe ori limita nu se obţine direct, ci cu ajutorul limitelor laterale.

Exemplu. pentru calculul limitei: $\lim_{x \to -2} \frac{x^2 + 2x}{7} \left[\frac{5}{x^2 - x - 6} \right]$ procedăm astfel:

(a) Utilizăm inegalităţile (3.2) pentru a obţine expresii ce nu conţin partea întregă:

$$\frac{5}{x^2 - x - 6} - 1 < \left[\frac{5}{x^2 - x - 6} \right] \leq \frac{5}{x^2 - x - 6}$$

(b) Pentru a obţine funcţia a cărei limită se cere, amplificăm inegalităţile precedente cu $\frac{x^2 + 2x}{7}$, ţinând cont că:

- la stânga lui -2 avem: $\frac{x^2 + 2x}{7} > 0$, deci:

$$\frac{x^2+2x}{7}\left[\frac{5}{x^2-x-6}-1\right] < \frac{x^2+2x}{7}\left[\frac{5}{x^2-x-6}\right] \le$$

$$< \frac{x^2+2x}{7}\cdot\frac{5}{x^2-x-6}$$

- la dreapta lui -2 avem: $\frac{x^2+2x}{7} < 0$, deci:

$$\frac{x^2+2x}{7}\left[\frac{5}{x^2-x-6}-1\right] > \frac{x^2+2x}{7}\left[\frac{5}{x^2-x-6}\right] >$$

$$> \frac{x^2+2x}{7}\cdot\frac{5}{x^2-x-6}$$

- (c) Trecând la limită în aceste inegalități (metoda majorării și minorării), obținem limita la stânga: $l_s(-2) = \frac{2}{7}$ și limita la dreapta: $l_d(-2) = \frac{2}{7}$, deci $l = \frac{2}{7}$.

(B) Dacă nu se poate utiliza dubla inegalitate (3.2), pentru $\lim_{x\to n} f(x)$, cu $n \in Z$, se calculează direct limitele laterale, ținând cont de faptul că:

- dacă $x \longrightarrow n$ cu $x < n$, atunci $[x] = n - 1$.

- dacă $x \longrightarrow n$ cu $x > n$, atunci $[x] = n$.

Exemplu. Pentru $\lim_{n\to\infty} (-1^{[x]})/(x-1)$ nu putem folosi (3.2) deoarece expresiile ce se obțin pentru calculul limitelor laterale nu au aceeași limită.De aceea utilizăm faptul că la stânga lui 1 avem $[x] = 0$, iar la dreapta lui 1 avem $[x] = 1$,deci:

$$l_s(1) = \lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \frac{(-1)^{[x]}}{x-1} = \lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \frac{1}{x-1} = -\infty$$

$$l_d(1) = \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{(-1)^{[x]}}{x-1} = \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{-1}{x-1} = -\infty$$

Rezultă $l = -\infty$

(C) Dacă $x \longrightarrow \infty$ putem înlocui $[x]$ ținând cont că pentru $x \in [m,m+1)$, avem: $[x] = m$ (evident, $x \longrightarrow \infty$ implică $m \longrightarrow \infty$).

Exemplu: $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{[x]+(-1)^{[x]}}\right)^{[x]+(-1)^{[x]}}$

Variabila x care tinde la infinit este sigur intre două numere intregi consecutive: $m \le x \le m + 1$, deci:

$$\left(1 + \frac{1}{m+1}\right)^{m-1} \le \left(1 + \frac{1}{[x]+(-1)^{[x]}}\right)^{[x]+(-1)^{[x]}} <$$

$$\le \left(1 + \frac{1}{m+1}\right)^{m+1} \quad \text{şi}$$

$$\lim_{m\to\infty}\left(1 + \frac{1}{m+1}\right)^{m} = \lim_{m\to\infty}\left(1 + \frac{1}{m}\right)^{m+1} = e$$

EXERCITII:

I. 1. $\lim\limits_{x\to 3} \frac{x^2 - 5x - 6}{4}\left[\frac{8}{x^2 - 8x + 15}\right]$

2. $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^2 - 9x + 8}{x^2 + x + 1}\left[\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 12x + 32}\right]$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{5}{\sin x}\right]\cdot \operatorname{tg} x$

4. $\lim\limits_{x\to 0} x\cdot\left[\frac{3\sin x + \cos x}{\sin x}\right]$

5. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{5x + 3}{\sin 2x}\right]\cdot \operatorname{tg}\frac{3x}{2}$

6. $\lim\limits_{x\to 0} x^2\left[\frac{1}{x^2}\right]$

II. 1. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{[x] + [2^2x] + \ldots + [n^2x]}{n^3}$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{[x] + [3^2x] + [5^2x] + \ldots + [(2n-1)^2x]}{n^3}$

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{[x] + [2^kx] + \ldots + [n^kx]}{n^{k+1}}$

4. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{[x]\cdot 1! + [2x]\cdot 2! + \ldots + [nx]\cdot n!}{(n+1)!}$

8. UTILIZAREA DEFINITIEI DERIVATEI. După cum se ştie, derivata unei funcţii este:

$$g'(x_o) = \lim_{x \to x_o} \frac{g(x) - g(x_o)}{x - x_o} \qquad (3.3)$$

dacă această limită există şi este finită. Ea poate fi utilizată la

(A) înlăturarea nedeterminărilor $\frac{0}{0}$ pentru limite de funcţii ce pot fi scrise sub forma:

$$\lim_{x \to x_o} \frac{g(x) - g(x_o)}{x - x_o},$$

x_o fiind un punct în care g este derivabilă.

Exemplu. $\lim_{x \to a} \frac{a^x - a^a}{x - a}$. Observăm că notând $g(x) = a^x$, avem $g(a) = a^a$ şi limita devine:

$\lim_{x \to a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$. Această limită are valoarea g'(a) deoarece g este o funcţie derivabilă în a.

Am redus astfel calculul limitei date la calculul valorii g'(a), calcul ce se poate face derivând pe g :

$g'(x) = a^x \ln a$, deci $g'(a) = a^a \ln a = l$.

Observaţie: această metodă poate fi utlizată astfel: "fie $g(x) = a^x$. Avem $g'(x) = a^x \ln a$, $g'(a) = a^a \ln a = l$. Nu recomandăm însă la examen acest mod sintetic de redactare a rezolvării deoarece el poate induce în eroare pe examinatori. De aceea detalirea: "Observăm că notid g(x) = ..., avem g(a) = ... şi limta devine .... = g'(a) deoarece g este derivabilă în a .... " este mult mai indicată.

(B) Calculul limitelor de şiruri, prin intermediul unor funcţii ataşate. Funcţia ataşată şirului, de data aceasta, nu se obţine prin înlocuirea lui n cu x, în expresia lui a_n deoarece pentru $x \longrightarrow \infty$ nu putem calcula derivata,ci prin înlocuirea lui n cu $\frac{1}{x}$ (ceea ce duce la calculul derivatei în zero).

Exemplu. Pentru $\lim_{n\to\infty} n(\sqrt[n]{2} - 1)$, considerăm funcţia $f(x) = \frac{2^x - 1}{x}$ obţinută prin înlocuirea lui n cu $\frac{1}{x}$ în expresia lui a_n. Calculăm $\lim_{x\to 0} f(x)$. Pentru aceasta observăm că notînd $g(x) = 2^x$ avem $g(0) = 1$ şi limita devine: $\lim_{x\to 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} =$ $= g'(0)$ deoarece g este o funcţie derivabilă în zero. Avem: $g'(x) = 2^x \ln 2$, deci $g'(0) = \ln 2$. Atunci conform criteriului cu şiruri obţinem $\lim_{n\to\infty} a_n = \ln 2$.

EXERCITII:

I. 1. $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

2. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$

3. $\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x - 1}$

4. $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \frac{\sqrt{2}}{2}}{x - \frac{\pi}{4}}$

5. $\lim_{x\to 1} \frac{\operatorname{arctg} x - \frac{\pi}{4}}{x - 1}$

6. $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}} \frac{9^{\sin^2 x} - 3}{x - \frac{\pi}{4}}$

7. $\lim_{x\to \pi} \frac{\cos x + 1}{x - \pi}$

8. $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x \cdot \cos x - \frac{1}{2}}{x - \frac{\pi}{4}}$

II. Pentru $a > 0$ să se calculeze:

1. $\lim_{x\to a} \frac{a^{x^x} - a^{a^a}}{x - a}$

2. $\lim_{x\to a} \frac{a^{x^x} - a^{x^a}}{x - a}$

3. $\lim_{x\to a} \frac{x^{\operatorname{tg} x} - x^{\operatorname{tg} a}}{x - a}$

4. $\lim_{x\to a} \frac{x^{\operatorname{tg} x} - x^{\operatorname{tg} a}}{\sin bx - \sin ba}$, $a \neq \frac{k\pi}{2}$

5. $\lim_{x\to 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$

6. $\lim_{x\to 0} \frac{a^{x^2} - b^{x^2}}{(a^x - b^x)^2}$

7. $\lim_{x\to 0} \frac{\log_b x - \log_a x}{x - a}$

Raspuns:

4. Împărţim şi numărătorul şi numitorul cu x - a.

III. Să se arate că nu putem utiliza definiţia derivatei pentru calculul limitelor:

1. $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} \dfrac{\sqrt{x} - \cos x - 1}{x}$ 2. $\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ x>1}} \dfrac{1}{x^2 - 1} \cdot \ln \dfrac{2 \cdot \arcsin x}{\pi}$

IV. 1. $\lim\limits_{n \to \infty} n\left(\sqrt[n]{e} - 1\right)$ 2. $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{\sqrt[n]{2} - 1}{\sqrt[n]{3} - 1}$

3. $\lim\limits_{n \to \infty} n\left(\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} - 2\right)$

4. $\lim\limits_{n \to \infty} n\left(\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \ldots + \sqrt[n]{a_k} - k\right)$

5. $\lim\limits_{n \to \infty} \left(\dfrac{\sqrt[n]{a_1} - \sqrt[n]{a_2}}{2}\right)^n$, cu $a_1, a_2 > 0$

6. $\lim\limits_{n \to \infty} \left(\dfrac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \ldots + \sqrt[n]{a_k}}{k}\right)^n$, cu $a_1, a_2, \ldots, a_k > 0$

7. $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{n\left(\sqrt[n]{n} - 1\right)}{\ln n}$

Raspunsuri:

2. Considerăm funcţia: $f(x) = \dfrac{2^x - 1}{3^x - 1}$, obţinută înlocuind în expresia şirului a_n pe n cu $\dfrac{1}{x}$. Calculă $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$. Pentru a utiliza definiţia derivatei, împărţim şi numărătorul şi numitorul cu x, deci:

$$f(x) = \frac{\frac{2^x - 1}{x}}{\frac{3^x - 1}{x}}$$

Observăm că notînd $g(x) = 2^x$, avem $g(0) = 1$ şi limita de la numărător devine: $\lim\limits_{x \to 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = g'(x)$ deoarece g este derivabilă în zero.

$g'(x) = 2^x \ln 2$, deci conform criteriului cu şiruri $l_1 = g'(0) = \ln 2$

Analog, notând $h(x) = 3^x$, limita de la numitor devine:

$\lim\limits_{x \to 0} \frac{h(x) - h(0)}{x} = h'(0)$ deoarece h este derivabilă în zero.

$h'(x) = 3^x \ln 3$ deci, conform criteriului cu şiruri, $l_2 = h'(0) = \ln 3$, iar $l = \frac{\ln 2}{\ln 3}$.

5. Limita conţine o nedeterminare de forma 1^∞, deci aplicăm mai întîi metoda 4:

$$\lim_{n \to \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2}}{2} \right)^n = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2}}{2} - 1 \right)^n =$$

$$= \lim_{n \to \infty} \left[\left(1 + \frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} - 2}{2} \right)^{\frac{2}{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} - 2}} \right]^{n \cdot \frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} - 2}{2}} =$$

$$= e^{\lim\limits_{n \to \infty} n \frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} - 2}{2}}$$

Considerăm acum funcţia $f(x) = \frac{1}{x}\left(a_1^x + a_2^x - 2 \right)$ obţinută înlocuind pe n cu $\frac{1}{x}$ în expresia de mai sus Calculăm $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$. Pentru aceasta, observăm că notînd $g(x) = a_1^x + a_2^x$ avem $g(0) = 2$ şi limita se poate scrie: $\lim\limits_{x \to 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = g'(0)$ deoarece g este derivabilă în zero.

Acum $g'(x) = a_1^x \ln a_1 + a_2^x \ln a_2$, deci $g'(0) = \ln a_1 + \ln a_2$.

Conform riteriului cu şiruri:

$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} - 2\right) = \ln(a_1 a_2)$, iar limita inițială este $\sqrt{a_1 \cdot a_2}$.

9. *UTILIZAREA TEOREMEI LUI L'HOSPITAL.*

Teorema. (l'Hospital (1661 - 1704)) Dacă funcțiile f și g indeplinesc condițiile:

1. sînt continue pe [a,b] și derivabile pe $(a,b)\setminus\{ x_o \}$
2. $f(x_o) = g(x_o) = 0$
3. g' nu se anulează într-o vecinătate a lui x_o
4. există $\lim_{x\to x_o} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha$ finit sau infinit

Atunci există $\lim_{x\to x_o} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$.

Această teoremă se poate utiliza la :

(A) Calculul limitelor de forma: $\lim_{x\to x_o} \frac{f(x)}{g(x)}$ când acestea conțin o nedeterminare de forma $\frac{0}{0}$ sau $\frac{\infty}{\infty}$.

(B) Calculul limitelor de forma $\lim_{x\to x_o} f(x)\cdot g(x)$ când acestea conțin o nedeterminare $\infty\cdot 0$.

Această nedeterminare poate fi adusă la forma (A) astfel:

$\lim_{x\to x_o} f(x)\cdot g(x) = \lim_{x\to x_o} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$ (nedeterminare de forma $\frac{\infty}{\infty}$)

$\lim_{x\to x_o} f(x)\cdot g(x) = \lim_{x\to x_o} \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$ (nedeterminare de forma $\frac{0}{0}$)

Observație: uneori este esențial dacă scriem nedeterminarea $\frac{0}{0}$ sau $\frac{\infty}{\infty}$.

Exemplu: $\lim\limits_{x \to 0} \frac{1}{x^2} \cdot e^{\frac{-1}{x^2}}$

Dacă scriem $\lim\limits_{x \to 0} \frac{1}{x^2} \cdot e^{\frac{-1}{x^2}} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{e^{\frac{-1}{x^2}}}{x^2}$ (nedeterminare $\frac{0}{0}$)

și derivăm, obținem: $l = \lim\limits_{x \to 0} \frac{\frac{2}{x^3} \cdot e^{\frac{-1}{x^2}}}{2x} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{e^{\frac{-1}{x^2}}}{x^4}$ (nedeterminare de forma $\frac{0}{0}$ cu gradul numitorului mai mare)

Dacă punem în evidență nedeterminarea $\frac{\infty}{\infty}$:

$\lim\limits_{x \to 0} \frac{1}{x^2} \cdot e^{\frac{-1}{x^2}} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{\frac{1}{x^2}}{e^{\frac{1}{x^2}}}$ și derivăm, obținem $l = 0$.

(C) Calculul limitelor de forma $\lim\limits_{x \to x_0} \left(f(x) - g(x) \right)$, cu nedeterminare $\infty - \infty$.

Această nedeterminare poate fi adusă la forma (B) dând factor comun forțat pe $f(x)$ sau $g(x)$.

Avem, de exemplu:

$\lim\limits_{x \to x_0} \left(f(x) - g(x) \right) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \cdot \left(1 - \frac{g(x)}{f(x)} \right)$ și cum

$f(x) \xrightarrow{x \to x_0} \infty$ distingem două cazuri:

- dacă $\lim\limits_{x \to x_0} \left(1 - \frac{g(x)}{f(x)} \right) = a \neq 0$ (adică $\frac{g(x)}{f(x)}$ nu tinde la 1), avem: $\lim\limits_{x \to x_0} \left(f(x) - g(x) \right) = \infty \cdot a = \infty \cdot \operatorname{sgn} a = \pm \infty$.

- dacă $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, nedeterminarea este de forma (B).

(D) Calculul limitelor de forma $\lim_{x \to x_0} f(x)^{g(x)}$, cu nedeterminări 1^{∞} , 0^{0} , ∞^{0} .

Aceste nedeterminări pot fi aduse la forma (C) utilizând formula: $A = a^{\log_a A}$ care pentru $a = e$, de exemplu, devine: $A = e^{\ln A}$, deci:

$$\lim_{x \to x_0} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \to x_0} e^{\ln f(x)^{g(x)}} = e^{\lim_{x \to x_0} g(x) \cdot \ln f(x)}$$

Ultima limită conține o nedeterminare de forma (C).

Pentru șiruri această metodă se aplică numai prin intermediul uneia din cele două funcții atașate șirului (obținute prin înlocuirea lui n cu x sau prin înlocuirea lui n cu $\frac{1}{x}$ în expresia lui a_n). Conform criteriului cu șiruri rezultă că limita șirului este egală cu limita funcției atașate.

Atenție: înlocuind pe n cu x calculăm limita la ∞ , iar înlocuind pe n cu $\frac{1}{x}$ calculăm limita în 0.

EXERCITII:

I. Calculați:

1. $\lim_{x \to 0} \frac{e^{ax} - e^{-2ax}}{\ln(1 + x)}$

2. $\lim_{x \to \infty} \frac{\log_a x}{x^k}$, dacă $a > 1$
(un polinom crește mai repede la infinit decât un logaritm)

3. $\lim_{x \to \infty} \frac{a^x}{x^k} = \infty$, dacă $a > 1$
(un polinom crește mai încet la infinit decât o exponențială)

4. $\lim_{x \to 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x - 1} \right)$

5. $\lim_{x \to 0} \ln(1 + \sin^2 x) \cdot \operatorname{ctg} \ln^2(1 + x)$

6. $\lim_{x \to 0} \frac{x - \operatorname{tg} x}{x - \sin x}$

7. $\lim_{x \to 1} \frac{a^{\ln x} - x}{\ln x}$

8. $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x}$

9. $\lim_{n \to \infty} n \cdot (\sqrt[n]{e} - 1)$

10. $\lim_{n \to \infty} n \cdot \sin \frac{1}{n}$

11. $\lim_{n \to \infty} \frac{n}{e^n}$

12. $\lim_{n \to \infty} \left[n + e^n \right]^{\frac{1}{n}}$

II. Arătaţi că nu se poate aplica regula lui l'Hospital pentru:

1. $\lim_{x \to 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$

2. $\lim_{x \to \infty} \frac{x - \sin x}{x + \cos x}$

Raspuns:

1. Pentru $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ şi $g(x) = \sin x$ avem:

$\lim_{x \to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \to 0} \frac{2x \cdot \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}$ - nu există, deci nu este indeplinită condiţia 4. din teoremă. Totuşi limita poate fi calculată observăsd că: $\lim_{x \to 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \to 0} \frac{x}{\sin x} \cdot x \cdot \sin \frac{1}{x} =$

$= 1 \cdot 0 = 0.$

10. UTILIZAREA CRITERIULUI CU SIRURI (CRITERIUL HEINE)

Enuntul criteriului:

$\lim_{x \to x_0} f(x) = l \iff \left[\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ cu proprietăţile:

a) $x_n \longrightarrow x_0$

b) $x_n \in D$ rezultă $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = l$ $\Big]$

c) $x_n \neq x_0$

Observatie: dacă $x_0 = \infty$ condiţia c) nu mai are sens.

Acest criteriu nu poate fi folosit pentru înlăturarea nedeterminărilor deoarece şirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ din enunţ este oarecare,deci modificând şirurile,(un număr infinit de şiruri) nu putem înlătura nedeterminarea.Totuşi, criteriul poate fi folosit la :

(A) Calculul limitelor ce nu conţin nedeterminări.

Exemplu: Să se arate, utilizând criteriul cu şiruri, că:

$$\lim_{x\to 2} \frac{3x+5}{2x+3} = \frac{11}{7}$$

Rezolvare: (a) trebuie arătat că:

$\forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, cu proprietăţile: a) $x_n \longrightarrow 2$

b) $x_n \in \mathbb{R}\setminus\{\frac{3}{2}\}$

c) $x_n \neq 2$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \frac{11}{7}$$

(b) fie $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un şir oarecare cu proprietăţile a),b),c)

(c) în $\lim_{n\to\infty} f(x_n)$ utilizăm proprietăţile operaţiilor cu limite de şiruri pentru a pune în evidenţă $\lim_{n\to\infty} x_n$ (este posibil deoarece nu există nedeterminări), apoi utilizăm faptul că $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3\cdot x_n + 5}{2\cdot x_n + 3} = \frac{\lim_{n\to\infty}(3x_n + 5)}{\lim_{n\to\infty}(2x_n + 3)} = \frac{3\cdot\lim_{n\to\infty} x_n + 5}{2\cdot\lim_{n\to\infty} x_n + 3} =$$

$$= \frac{3\cdot 2 + 5}{2\cdot 2 + 3} = \frac{11}{7}.$$

(B) Pentru a arăta că o funcţie nu are limită într-un punct. În acest scop putem proceda astfel:

1_B. găsim două şiruri: $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ şi $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ cu proprietăţile a),b),c) şi astfel încît:

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq \lim_{n\to\infty} f(y_n)$$

sau:

2_B. găsim un singur şir cu proprietăţile a),b),c) şi astfel încât $\lim_{n\to\infty} f(x_n)$ nu există.

Exemplu: nu există $\lim_{x\to\infty} \sin x$

1_B. fie $x_n = 2n\pi$ şi $y_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$. Avem:

a) $x_n \longrightarrow \infty$, $y_n \longrightarrow \infty$

b) $x_n, y_n \in \mathbb{R}$

şi $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} \sin 2n\pi = 0$,

$\lim_{n\to\infty} f(y_n) = \lim_{n\to\infty} \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = 1$.

Deci limita nu există.

2_B. fie $x_n = \frac{n\pi}{2}$. Avem:

a) $x_n \longrightarrow \infty$

b) $x_n \in \mathbb{R}$

şi $\lim_{n\to\infty} \sin\frac{n\pi}{2}$ nu există.

(C) Criteriul cu şiruri se poate utiliza în calculul limitelor de şiruri astfel:

(a) fie $f(x)$ funcţia ataşată şirului, prin înlocuirea, de exemplu, a lui n cu x în expresia lui a_n (sau a lui n cu $\frac{1}{x}$,dar atunci calculăm $\lim_{x\to 0} f(x)$)

(b) calculăm $\lim_{x\to\infty} f(x) = l$ (rspectiv $\lim_{n\to 0} f(x)$).

(c) conform criteriului cu şiruri $\lim f(x) = l$ înseamnă:

pentru orice şir $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ cu proprietăţile: a) $x_n \longrightarrow \infty$

b) $x_n \in \mathbb{D}$

avem $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = l$.

Observăm că şirul $x_n = n$ îndeplineşte condiţiile a) şi b) şi

in plus, pentru acest şir avem: $f(x_n) = a_n$, deci $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} f(n) = l$.

EXERCITII:

I. Utilizând criteriul cu şiruri să se calculeze:

1. $\lim_{x\to 1} \frac{4x+5}{2x^2-3}$.
2. $\lim_{x\to 1} \left(\sqrt{2x+2} - \operatorname{arctg} x \right)$
3. $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \left(\operatorname{ctg} x + x \right)$
4. $\lim_{x\to 0} \sqrt[3]{\cos x}$
5. $\lim_{x\to 3} \sqrt{3^x + 9}$

II. Arătaţi că nu există:

1. $\lim_{x\to\infty} \cos x$
2. $\lim_{x\to\infty} \operatorname{tg} x$
3. $\lim_{x\to\infty} e^{\sin x}$
4. $\lim_{x\to\infty} \sqrt{1+\sin^2 x}$
5. $\lim_{x\to\infty} \frac{2\cdot\sin x + \cos x}{3 + \cos 2x}$
6. $\lim_{x\to\infty} \left(x - [x] \right)$

7. Dacă f are limită la stânga (dreapta) în x_o, atunci: $l_s(x_o) = \lim_{n\to\infty} f(x_o - \frac{1}{n})$ (respectiv $l_d(x_o) = \lim_{n\to\infty} f(x_o + \frac{1}{n})$.

(Manual cls XI)

8. Dacă $\lim_{n\to\infty} f(x) = l$, atunci $\lim_{n\to\infty} f(n) = l$, dar nu şi reciproc.

9. Nu există $\lim_{x\to\infty} f(x)$ dacă $f : \mathbb{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ este o funcţie periodică neconstantă. Consecinţe: nu există $\lim_{x\to\infty} \sin x$, $\lim_{n\to\infty} \cos x$, $\lim_{n\to\infty} \operatorname{tg} x$, $\lim_{x\to\infty} \operatorname{ctg} x$.

Raspuns: 9. Acest exerciţiu este generalizarea exerciţiilor 1.- 6. . Pentru rezolvare, explicităm ipoteza:

- f - periodică $\Leftrightarrow \exists\, T > 0 \quad \forall\, x \in \mathbb{D}, \quad f(x + T) = f(x)$

- f - neconstantă $\Leftrightarrow \exists\, a,b \in \mathbb{D} \quad f(a) \neq f(b)$

Utilizăm acum metoda i_3. Şirurile $x_n = a + nT$, $y_n = b + nT$ indeplinesc condiţiile a) şi b), iar:

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} f(a + nT) = \lim_{n\to\infty} f(a) = f(a)$$

$$\lim_{n\to\infty} f(y_n) = \lim_{n\to\infty} f(b + nT) = \lim_{n\to\infty} f(b) = f(b)$$

III. Să se determine punctele in care au limită funcţiile:

f , g , f∘g , g∘f pentru:

1. $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \in \mathbb{Q} \\ 2 & x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} \end{cases}$ $\qquad g(x) = \begin{cases} 2x + 3 & x \in \mathbb{Q} \\ 3x + 1 & x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} \end{cases}$

2. $f(x) = \begin{cases} \sin x & x \in \mathbb{Q} \\ \cos x & x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} \end{cases}$ $\qquad g(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & x \in \mathbb{Q} \\ -\frac{\pi}{2} & x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} \end{cases}$

3. $f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x} & x \in \mathbb{Q} \\ 8 & x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} \end{cases}$ $\qquad g(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ -1 & x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} \end{cases}$

Raspuns: 1. fie $x_0 \in \mathbb{D} = \mathbb{R}$ oarecare. Studiem dacă f are limită in x_0. Pentru aceasta observăm că esta esenţial dacă $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este raţional sau iraţional. Considerăm mai intăi situaţia cănd şirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este format doar din puncte raţionale (sau doar doar din puncte iraţionale).

Fie $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ <u>un şir de puncte raţionale</u> cu proprietăţile a), b),c).Avem: $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} x_n^2 = x_0^2$.

Fie $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ <u>un şir de puncte iraţionale</u> cu proprietăţile a), b),c).Avem: $\lim_{n\to\infty} f(y_n) = \lim_{n\to\infty} 2 = 2$.Deci funcţia nu are limită in orice punct x_0 pentru care $x_0^2 \neq 2$,adică $x_0 \neq \pm 2$.Pentru $x_0 = \sqrt{2}$ considerăm un şir oarecare $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ cu proprietăţile a),b),c).El

se descompune în două subşiruri: $(x'_n)_{n\in\mathbb{N}}$ format doar cu termeni raţionali şi $(x''_n)_{n\in\mathbb{N}}$ doar cu termeni iraţionali.Deoarece

$\lim\limits_{n\to\infty} f(x'_n) = \lim\limits_{n\to\infty} (x'_n)^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$ şi $\lim\limits_{n\to\infty} f(x''_n) = \lim\limits_{n\to\infty} 2 = 2$,

deducem că $\lim\limits_{x\to\sqrt{2}} f(x) = 2$.Analog pentru $x = -\sqrt{2}$.

METODE SPECIFICE PENTRU ŞIRURI

11. ORICE SIR MONOTON SI MARGINIT ESTE CONVERGENT. Aplicarea acestei metode revine la studiul monotoniei şi mărginirii, iar pentru determinarea limitei se trece la limită în relaţia de recurenţă a şirului respectiv. Dacă iniţial nu este dată o astfel de relaţie, ea se poate obţine la studiul monotoniei.

Exemplu: $a_n = \dfrac{n!}{n^n}$

(a) Pentru studiul monotoniei şi mărginirii nu putem aplica metoda funcţiei ataşate ($f(x) = \dfrac{x!}{x^x}$ nu are sens). Utilizăm metoda raportului (începem cu studiul monotoniei deoarece (1) dacă şirul este monoton, cel puţin jumătate din problema mărgirii este rezolvată, după cum s-a mai arătat; (2) dacă şirul nu este monoton nu putem aplica metoda deci nu mai studiem mărginirea.

Avem deci:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\dfrac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\dfrac{n!}{n^n}} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{e} < 1$$

Deci şirul este descrescător.

(b) Mărginirea . Fiind descrescător şi cu termeni pozitivi

şirul este mărginit între 0 şi a_1. Există deci $l = \lim_{n \to \infty} a_n$.

(c) Pentru calculul lui l observăm că la studiul monotoniei am obţinut relaţia de recurenţă:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \iff a_{n+1} = a_n\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

Trecând la limită în această egalitate obţinem:

$$l = l \cdot \frac{1}{e}, \iff l = 0.$$

EXERCITII:

1. $a_n = \dfrac{2^n}{(n!)^2}$

2. $a_n = \dfrac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2n-1)}{3^n \cdot n!}$

3. $a_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \ldots + \sqrt{2}}}$ - n radicali

4. $a_n = \left(\dfrac{2}{2!} + \dfrac{7}{3!} + \ldots + \dfrac{n^2 - 2}{n!} \right) + \dfrac{n+2}{n!}$, $n \geq 2$

5. $a_n = \left(\dfrac{7}{1 \cdot 8} + \dfrac{7}{8 \cdot 15} + \ldots + \dfrac{7}{(7n-6) \cdot (7n+1)} \right) + \dfrac{1}{7n+1}$

6. $a_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{2k+3}{5^k}$

7. $a_n = \dfrac{1}{b_1} + \dfrac{1}{b_2} + \ldots + \dfrac{1}{b_n}$, unde $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ îndeplineşte condiţiile: a) $\lim_{n \to \infty} b_n = \infty$, b) $b_n(b_{n+1} - b_n) \leq 1$.

8. $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{1}} + \dfrac{1}{\sqrt{2}} + \ldots + \dfrac{1}{\sqrt{n}}$

9. $a_n = \dfrac{1}{\sqrt[k]{1}} + \dfrac{1}{\sqrt[k]{2}} + \ldots + \dfrac{1}{\sqrt[k]{n}}$

Raspunsuri:

3. Se observă relaţia de recurenţă: $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$.

a) Monotonia: $a_{n+1} - a_n = \sqrt{2 + a_n} - a_n$. Pentru a compara această diferență cu zero, facem o alegere, de exemplu $a_{n+1} \geq a_n$, pe care o transformăm prin echivalențe:

$$a_{n+1} \geq a_n \iff \sqrt{2 + a_n} \geq a_n \iff 2 + a_n \geq a_n^2 \iff$$

$$a_n^2 - a_n - 2 \leq 0 \; ; \quad x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = -1, \quad x_2 = 2$$

Deci $a_{n+1} \geq a_n \iff a_n \in (-1 , 2)$.

Am ajuns astfel la concluzia că <u>șirul este crescător dacă și numai dacă este mărginit între -1 și 2.</u> Avem, evident $a_n > 0 > -1$ deci mai trebuie arătat că $a_n < 2$. Această inegalitate o demonstrăm prin inducție:

$$P(n): \; a_n \leq 2$$

Verificare: $P(1): \; a_1 \leq 2 \iff \sqrt{2} \leq 2$ (adevărat).

$P(n) \Rightarrow P(n + 1)$:

$P(n + 1): \; a_{n+1} \leq 2 \iff \sqrt{2 + a_n} \leq 2 \iff 2 + a_n \leq 4 \iff$

$\iff a_n \leq 2$.

Deci am demonstrat monotonia și mărginirea. Există deci $l = \lim\limits_{n \to \infty} a_n$. Pentru determinarea lui l trecem la limită în relația de recurență <u>(de data aceasta o astfel de relație este dată inițial)</u>:

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} \Rightarrow \lim_{n \to \infty} a_{n+1} = \lim_{n \to \infty} \sqrt{2 + a_n} \Rightarrow l = \sqrt{2 + l}$$

$\Rightarrow l^2 = 2 + l \Rightarrow l = -1$ sau $l = 2$. Cum $l = -1$ este imposibil, deoarece $a_n > 0$, deducem $l = 2$.

6. Descompunem fracția $\frac{2k + 3}{5^k}$ într-o diferență de termeni consecutivi:

$$\frac{2k + 3}{5^k} = \frac{A \cdot k + B}{5^k} + \frac{C \cdot k + D}{5^k} \qquad (3.4)$$

Pentru determinarea celor patru parametri:

a) utilizăm metoda identificării şi

b) punem condiţia ca termenii din membrul drept in (3.4) să fie consecutivi.

a) $2k + 3 \equiv 5Ak + 5B - Ck - D \iff$

$\iff 2k + 3 = k(5A - C) + 5B - D$

b) numitorii sint consecutivi, deci punem condiţia ca şi numărătorii să fie in aceeaşi relaţie de consecutivitate: numitorul primei fracţii se obţine din numitorul celei de-a doua prin inlocuirea lui k cu k-1, deci şi itre numărători trebuie să avem aceeaşi relaţie:

$$A \cdot k + B = C(k-1) + D$$

$$\iff A \cdot k + B = C \cdot k + (D - C)$$

Am obţinut astfel sistemul:

$$\begin{cases} 5A - C = 2 \\ 5B - D = 3 \\ A = C \\ B = D - C \end{cases}$$

cu soluţia: $A = C = \frac{1}{2}$, $B = \frac{-3}{8}$, $D = \frac{1}{8}$

Rezultă:

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{2k+3}{5^k} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\frac{1}{2}k - \frac{3}{8}}{5^{k-1}} - \frac{\frac{1}{2}k + \frac{1}{8}}{5^k} \right) =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{\frac{1}{2}k - \frac{3}{8}}{5^{k-1}} - \sum_{k=1}^{n} \frac{\frac{1}{2}k + \frac{1}{8}}{5^k} = \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \frac{1}{5^2 \cdot 8} + \ldots \right.$$

$$\left. \ldots + \frac{\frac{1}{2}n - \frac{3}{8}}{5^{n-1}} \right) - \left(\frac{5}{5 \cdot 8} + \frac{9}{5^2 \cdot 8} + \ldots + \frac{\frac{1}{2}n + \frac{1}{8}}{5^n} \right) =$$

$$= \frac{1}{8} - \frac{\frac{1}{2}n + \frac{1}{8}}{5^n} \text{ , prin urmare } \lim_{n \to \infty} a_n = \frac{1}{8}.$$

7. Avem $\frac{1}{b_n} \geq \frac{1}{b_{n+1}} - \frac{1}{b_n}$,

deci $a_n \geq (b_2 - b_1) + (b_3 - b_2) + \ldots + (b_{n+1} - b_n) = b_{n+1} - b_1 \longrightarrow \infty$.

8. Se aplică concluzia de la 7.

II. Studiaţi convergenţa şirurilor definite prin:

1. $a_{n+1} = \frac{5 \cdot a_n + 3}{a_{n+1}}$, cu a_0 dat.

2. $x_{n+1} = x_n^2 - 2 \cdot x_n + 2$, cu x_1 dat.

3. $x_{n+1} = \frac{x_n}{1 + n \cdot x_n^2}$, cu $x_1 > 0$ dat.

4. $a_n = \frac{1}{2} \cdot \left[a_{n-1} + \frac{\alpha}{a_{n-1}} \right]$, cu $a_0 > 0$ dat.

5. $a_n = \frac{x}{2} - \frac{a_{n-1}}{2}$, cu $x \in [0 , 1]$

6. $x_n = \frac{2 \cdot a \cdot x_{n-1}}{a + x_{n-1}}$, cu $a, x_0 > 0$ daţi.

7. $a_n = \int_n^{n+1} e^{-x^2} dx$.

Indicatii:

4. şir cu termeni pozitivi (inducţie) şi descrescător.

5. $a_{2k+2} - a_{2k} > 0$, $a_{2k+3} - a_{2k+1} < 0$ şi $|a_k| < \frac{1}{2}$. Fie l_1 şi l_2 limitele subşirurilor de indice par şi impar. Se arată că $l_1 = l_2$.

12. *UTILIZAREA LEMELOR CESÀRO - STOLZ SI RIZZOLI*

Lemă: | (*Cesaro - Stolz*) Fie $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un şir oarecare şi $(\beta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un şir strict crescător, având limita infinit.

Dacă există $\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha_{n+1} - \alpha_n}{\beta_{n+1} - \beta_n} = l$ - finită sau infinită,

atunci $\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha_n}{\beta_n} = l$.

Această lemă se poate utiliza la calculul limitelor de şiruri ce pot fi puse sub formă de fracţie:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha_n}{\beta_n} \qquad (3.5)$$

şi a limitelor de forma:

$\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha_{n+1} - \alpha_n}{\beta_{n+1} - \beta_n}$ - <u>în ipoteză că această limită există</u>

şi $(\beta_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este strict monoton.

CONSECINŢE:

(A) Dacă $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$, atunci $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$.

Într-adevăr, $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} e^{\ln \sqrt[n]{a_n}} = e^{\lim_{n\to\infty} \frac{\ln a_n}{n}} =$

$= e^{\lim_{n\to\infty} \frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{n+1-n}} = e^{\lim_{n\to\infty} \ln \frac{a_{n+1}}{a_n}} = e^{\ln \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}} =$

$= e^{\ln l} = l$.

Exemplu: $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$, deoarece pentru $a_n = n$, avem:

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.

(B) Limitele mediilor aritmetică, geometrică şi armonică a primilor n termeni ai unui şir având limita l, au valoarea tot l:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_n}} = \lim_{n\to\infty} a_n$$

Observatie: o variantă a lemei Cesaro - Stolz pentru cazul cind α_n , $\beta_n \longrightarrow 0$ a fost demonstrată de I. Rizzoli [Gazeta Mat. Nr. 10-11-12, 1992, p. 281-284]:

Lemă. *(I. Rizzoli)* Dacă $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(\beta_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sunt două şiruri de numere reale care îndeplinesc condiţiile:

(i) $\lim_{n\to\infty} \alpha_n = 0$; $\lim_{n\to\infty} \beta_n = 0$

(ii) şirul $(\beta_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este strict monoton (crescător sau descrescător)

(iii) există $l = \lim_{n\to\infty} \frac{\alpha_{n+1} - \alpha_n}{\beta_{n+1} - \beta_n}$

Atunci $\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha_n}{\beta_n} = l$.

EXERCITII:

I 1. $a_n = \frac{\ln n!}{n^2}$

2. $a_n = \frac{1^2 + 2^2 + \ldots + n^2}{n^3}$

3. $a_n = \frac{1^p + 2^p + \ldots + n^p}{n^{p+1}}$

4. $a_n = \frac{1^p + 3^p + \ldots + (2n-1)^p}{n^{p+1}}$

5. $a_n = \frac{1^p + 2^p + \ldots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p}$

6. $a_n = \frac{\sum_{k=1}^{n} (4k-1)^p}{n^{p+1}}$

7. $a_n = \frac{1\cdot 3 + 3\cdot 5 + \ldots + (2n-1)(2n+1)}{n^2}$

8. $a_n = \dfrac{1\cdot 2\cdot \ldots \cdot k + 2\cdot 3\cdot \ldots \cdot (k+1) + \ldots + (n-k+1)\cdot (n-k+2)\cdot \ldots \cdot n}{n^k}$

9. $a_n = \dfrac{1 + \sqrt[4]{2!} + \sqrt[9]{3!} + \ldots + \sqrt[n^2]{n!}}{n}$

II. 1. $a_n = \dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$

2. $a_n = \sqrt[n]{\dfrac{3^{8n}(n!)^3}{(3n)!}}$

3. $a_n = \sqrt[n]{\dfrac{(n+1)(n+2)\ \ldots\ (2n)}{n!}}$

4. $a_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\sqrt{1 + \dfrac{k^m}{n^{m+1}}} - 1 \right)$

(*Ind.*: amplificare cu conjugata, metoda majorării și minorării, lema Cesaro-Stolz).

5. Fie $x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$, $x_0 > 0$. Utilizând lema Cesaro-Stolz să se arate că $\lim\limits_{n\to\infty} n\cdot x_n = 2$.

(*Ind.*: $nx_n = \dfrac{n}{\frac{1}{x_n}}$)

III. Calculați limitele următoarelor șiruri în ipoteza că ele există:

1. $L_n = \sqrt[n+1]{(n+1)!} + \sqrt[n]{n!}$ (șirul Lalescu)

2. $a_n = \sqrt[n+1]{\dfrac{(n+2)(n+3)\ \ldots\ (2n+2)}{(n+1)!}} - \sqrt[n]{\dfrac{(n+1)(n+2)\ \ldots\ (2n)}{n!}}$

3. $a_n = n^p\left(\dfrac{\pi^2}{6} - \left[1 + \dfrac{1}{2^2} + \ldots + \dfrac{1}{n^2} \right] \right)$ știind că:

$$\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{n^2}\right]=\frac{\pi^2}{6}$$

4. $a_n=n^p\left[\frac{\sin 1}{n^2+1}+\frac{\sin 2}{n^2+2}+\ldots+\frac{\sin n}{n^2+n}\right]$

5. $a_n=1^p+2^p+\ldots n^p-\frac{n^{p+1}}{p}-\frac{n^p}{2}$

6. $a_n=n^p\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}-\ln n-c\right)$ unde $p>0$ unde $p>0$ şi c este constanta lui Euler.

Raspunsuri:

1. Aplicăm lema Cesaro - Stolz pentru $\alpha_n=\sqrt{(n+1)!}$ şi $\beta_n=n$.

Avem $\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n/\beta_n=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n!/n^n}=1/e$ şi prin ipoteză rezultă $\lim(\alpha_{n+1}-\alpha_n)/(\beta_{n+1}-\beta_n)=l$, deci $l=1/e$.

6. Considerăm $\alpha_n=1+\frac{1}{2}+\ldots\frac{1}{n}-\ln n-c$ şi $\beta_n=\frac{1}{n^p}$.

Avem $$\frac{\alpha_{n+1}-\alpha_n}{\beta_{n+1}-\beta_n}=\frac{\frac{1}{n+1}-\ln\frac{n}{n+1}}{\frac{1}{(n+1)^p}-\frac{1}{n^p}}=$$

$$=\frac{n^p(n+1)^p\left[\frac{1}{n+1}+\ln\frac{n}{n+1}\right]}{n^p-(n+1)^p}=$$

$$=\frac{n^{2p}\left[1+\frac{1}{n}\right]^p\left[\frac{1}{n+1}+\ln\frac{n}{n+1}\right]}{-n^{p-1}\left[C_p^1+\frac{1}{n}C_p^2+\ldots\right]}$$ şi ţinem cont că

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+1}+\ln\frac{n}{n+1}}{\frac{1}{n^2}}=-\frac{1}{2}$$ (se poate utiliza funcţia ataşată) obţinem: $$l=\begin{cases}0 & \text{dacă } p\in(0,1)\\ \frac{1}{2} & \text{dacă } p=1\\ \infty & \text{dacă } p>1\end{cases}$$

13. *UTILIZAREA TEOREMEI LUI LAGRANGE.*

Teoremă: (Lagrange, (1736-1813)). Dacă $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ este continuă pe $[a,b]$ şi derivabilă pe (a,b), atunci: $\exists\, c \in (a,b)$ a.i. $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$.

Această teoremă se poate utiliza pentru:

(A) Calculul limitelor de şiruri în care poate fi pusă în evidenţă o expresie de forma:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \qquad (3.6)$$

pentru funcţia ataşată.

Exemplu: $a_n = \sqrt{n}\left(\left(1 + \dfrac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{n} \right)$

Rezolvare: a) punem în evidenţă o expresie de forma (3.6) considerând $f(x) = \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^{x}$, $f : [n,n+1] \longrightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

b) aplicăm teorema lui Lagrange funcţiei f pe intervalul $[n,n+1]$: $\exists\, c \in (n,n+1)$ $\dfrac{f(n+1) - f(n)}{n + 1 - n} = f'(c_n)$.

c) înlocuim în a_n expresia $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ cu $f'(c_n)$. Obţinem: $a_n = \sqrt{n}\left(1 + \dfrac{1}{c_n}\right)^{c_n} \cdot \left[\ln\left(1 + \dfrac{1}{c_n}\right) - \dfrac{1}{1 + c_n} \right]$

d) utilizăm inegalităţile: $n < c_n < n + 1$ pentru a obţine majorări (minorări) convenabile. În cazul nostru, avem:

$\dfrac{1}{n+1} < \dfrac{1}{c_n} < \dfrac{1}{n}$, deci $\dfrac{1}{n+2} < \dfrac{1}{1 + c_n} < \dfrac{1}{n+1}$

Rezultă:

$$a_n < \sqrt{n}\left(1 + \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+2} \right] =$$

$$= \frac{\sqrt{n}}{n+2}\left(1+\frac{1}{c_n}\right)^{c_n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2}-1\right] \longrightarrow 0\cdot e\cdot 0 = 0.$$

(B) Calculul limitelor de şiruri ce pot fi puse sub una din formele:

$$1_B.\quad a_n = f'(1) + f'(2) + \ldots + f'(n)$$

$$2_B.\quad a_n = f'(1) + f'(2) + \ldots + f'(n) - f(n),$$

f fiind o funcţie căreia i se poate aplica teorema lui Lagrange pe intervalele: $[n,n+1]$, $n \in \mathbb{N}$.

Observaţie: şirurile de forma 2_B sunt întotdeauna monotone şi mărginite (deci convergente) dacă f este o funcţie derivabilă pe $\mathbb{R}$ şi astfel încît f şi f' au monotonii diferite.

Demonstraţie: pentru a face o alegere, să presupunem că f este crescătoare şi f' descrescătoare;

1. monotonia: $a_{n+1} - a_n = \left[f'(1) + f'(2) + \ldots + f'(n) - f(n+1)\right] -$

$- \left[f'(1) + f'(2) + \ldots + f'(n) - f(n) \right] =$

$= f'(n+1) - \left(f(n+1) - f(n) \right)$

2. aplicăm teorema lui Lagrange funcţiei f pe intervalul $[n,n+1]$:

$$\exists\, c_n \in (n\ ,\ n+1) \quad \text{a.i.} \quad f(n+1) - f(n) = f'(c_n) \qquad (3.7)$$

$$n < c_n < n+1 \quad \Rightarrow \quad f'(n) > f'(c_n) > f'(n+1) \qquad (3.8)$$

deci $a_{n+1} - a_n = f'(n+1) - f'(c_n) < 0$ (f' - descrescătoare) de unde deducem că şirul este descrescător.

3. mărginirea: şirul fiind descrescător, este mărginit superior de a_1 . Mai trebuie găsită o margine inferioară. Pentru aceasta, scriem (3.8) începând de la $n = 1$ şi obţinem astfel posibilita-

tea de a minora (majora) şirul a_n:

$n = 1 \quad 1 < c_1 < 2 \quad \Rightarrow \quad f'(1) > f'(c_1) > f'(2)$

$n = 2 \quad 2 < c_2 < 3 \quad \Rightarrow \quad f'(2) > f'(c_2) > f'(3)$

$n = 3 \quad 3 < c_3 < 4 \quad \Rightarrow \quad f'(3) > f'(c_3) > f'(4)$

.....

$n = n \quad n < c_n < n + 1 \quad \Rightarrow \quad f'(n) > f'(c_n) > f'(n+1)$

deci $a_n = f'(1) + f'(2) + \ldots + f'(n) - f(n) >$

$> f'(c_1) + f'(c_2) + \ldots + f'(c_n) - f(n)$

Obţinem un inlocuitor convenabil pentru suma:

$$f'(c_1) + f'(c_2) + \ldots + f'(c_n)$$

Scriem relaţia (3.7) începând de la $n = 1$ şi adunăm egalităţile obţinute:

$n = 1 \quad \exists\, c_1 \in (1 , 2) \quad f(2) - f(1) = f'(c_1)$

$n = 2 \quad \exists\, c_2 \in (2 , 3) \quad f(3) - f(2) = f'(c_2)$

$n = 3 \quad \exists\, c_3 \in (3 , 4) \quad f(4) - f(3) = f'(c_3)$

.....

$n = n \quad \exists\, c_n \in (n , n + 1) \quad f(n + 1) - f(n) = f'(c_n)$

$$f(n + 1) - f(1) = f'(c_1) + f'(c_2) + \ldots + f'(c_n)$$

rezultă: $a_n \leq f(n + 1) - f(1) - f(n) < - f(1)$, prin urmare, şirul este mărginit inferior. Este deci convergent. Limita sa este un număr între $- f(1)$ şi a_1 .

EXERCITII:

I. Utilizând teorema lui Lagrange, să se calculeze limitele şirurilor:

1. $a_n = n^p \left(a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}} \right)$, $a > 0$

2. $a_n = n^p \cdot \ln \frac{n+1}{n}$

3. $a_n = n^p \left(\operatorname{arctg}(n+1) - \operatorname{arctg} n \right)$

4. $a_n = n^p \left(\frac{1}{n^q} - \frac{1}{(n+1)^q} \right)$

5. $a_n = \frac{a^{n+1} - a^n}{n^p}$

6. $a_n = \frac{\sin \frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n+1}}{\ln \frac{n+1}{n}}$

7. $a_n = n^2 \left(\frac{\operatorname{arctg} n}{n} - \frac{\operatorname{arctg}(n+1)}{n+1} \right)$

II. Să se studieze convergența șirurilor:

1. $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n} - \ln n$ (limita acestui șir se numește constanta lui Euler $c \in (0,1)$)

2. $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n}$ (sumele partiale ale seriei armonice $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i}$)

3. $a_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \ldots + \frac{1}{n^\alpha}$ (sumele partiale ale seriei armonice generalizate)

4. $a_n = \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k \cdot \ln k}$

5. $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{n+k}$

6. $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n}$

7. $a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \ldots + \frac{1}{n^2+1} - \operatorname{arctg} n$

Indicatie: **4.** pentru a avea una din formele 1_B sau 2_B determinăm pe f ținând cont că: $f'(k) = \frac{1}{k \cdot \ln k}$, deci $f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln x}$ și $f(x) = \int \frac{1}{x \cdot \ln x} dx = \ln \ln x$. Aplicăm pentru această funcție etapele din demonstrațiile de la începutul acestui paragraf.

III. Să se arate că:

1. $1998 < 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{10^6}} < 1999$

2. $2 \cdot 10^k - 2 < 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{10^{2k}}} < 2 \cdot 10^k - 1$

3. $\frac{p}{p-1}\left(a^{k(p-1)} - 1\right) < 1 + \frac{1}{\sqrt[p]{2}} + \frac{1}{\sqrt[p]{3}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{a^{pk}}} < \frac{1}{p-1}\left(a^{k(p-1)} - \frac{1}{p}\right)$

4. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{2^p} > \frac{n+1}{2}$

Indicatie: **1.** trebuie arătat că:

$$1998 < f'(1) + f'(2) + \ldots f'(10^6) < 1999$$

pentru $f(x) = \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x}$.

Seria armonică Seria $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n} + \ldots$ se numește serie armonică deoarece are proprietatea: oricare trei termeni consecutivi sunt în progresie armonică. Într-adevăr, dacă notăm $b_n = \frac{1}{n}$ avem $b_n = \frac{2}{\frac{1}{b_{n-1}} + \frac{1}{b_{n+1}}}$. Mult timp s-a crezut că acaestă serie are o sumă s finită. În antichitate se căuta

obținerea valorii aproximative a lui s, calculând suma a cât mai mulți termeni ai seriei. Astăzi se știe că $s = \infty$ (seria armonică este divergentă) . Menționăm câteva din metodele cu care se poate arăta acest lucru,metode care utilizează exerciții din manualele de liceu,sau exerciții de nivelul celor de liceu:

1. Teorema lui Lagrange (exercițiul I.2)

2. Inegalitatea: $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n} > \frac{13}{24}$

care se demonstrează prin inducție în clasa X-a. Într-adevăr, dacă s ar avea o valoare finită:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n} + \ldots = s < \infty$$

atunci notând $R_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots$ am avea: $a_n + R_n = s$

și deoarece $s = \lim_{n \to \infty} a_n$, deducem $\lim_{n \to \infty} R_n = 0$.

Dar $R_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \ldots >$

$$> \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n} > \frac{13}{24}$$

deci R_n nu tinde la zero. Așadar nici s nu este finit .

3. Utilizarea limitei $\lim_{n \to \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n} \right) = \ln 2$

care se studiază în clasa XII - a.

4. Utilizarea inegalității:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \quad \frac{1}{5} + \ldots + \frac{1}{2^n} > \frac{n+1}{2} .$$

5. Utilizarea definiției integralei (sume Riemann) (vezi metoda 16,exercițiul II.) .

14. *SIRURI DATE PRIN RELATII DE RECURENTA.*

(A) RECURENŢA LINIARA

1. Recurenţa liniară de ordinul intîi

Este de forma:

$$a_{n+1} = \alpha \cdot a_n \ , \quad \text{cu } a_0 \text{ dat}$$

Expresia termenului general rezultă observînd că:

$$a_{n+1} = q \cdot a_n = q^2 \cdot a_{n-1} = \ldots = q^{n-1} \cdot a_0$$

deci $a_{n+1} = q^{n+1} \cdot a_0$.

Exemplu: $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{10} a_n$, cu a_0 dat.

Avem: $a_{n+1} = \frac{11}{10} a_n = \left(\frac{11}{10}\right)^{n+1} \cdot a_0$.

2. Recurenţa liniară de ordin doi

Este de forma:

$$a_{n+1} = \alpha_1 a_n + \alpha_2 a_{n-1} \ , \quad \text{cu } a_0 \text{ şi } a_1 \text{ daţi.}$$

Pentru a găsi expresia termenului general în acest caz, ne folosim de expresia termenului general de la recurenţa de ordinul întâi. Am văzut că pentru această recurenţă avem: $a_n = a_0 q^n$. Căutăm şi pentru recurenţa de ordinul doi termenul general de aceeaşi formă:

$$a_n = c \cdot q^n \ , \quad c \text{ fiind o constantă încă nedeterminată.}$$

Înlocuind în relaţia de recurenţă, obţinem:

$$q^{n+1} = \alpha_1 \cdot q^n + \alpha_2 \cdot q^{n-1}$$

de unde, împărţind cu q^{n-1}, obţinem ecuaţia caracteristică:

$$q^2 - a_1 \cdot q - a_2 = 0$$

Considerăm următoarele cazuri:

a) $\Delta > 0$ (ecuația caracteristică are rădăcini reale și distincte q_1 și q_2)

În acest caz, neexistând motiv pentru a neglija una dintre rădăcini, modificăm expresia lui a_n considerând-o de forma:

$$a_n = c_2 \cdot q_1^n + c_2 \cdot q_2^n$$

și determinăm constantele c_1 și c_2 astfel încât primii doi termeni ai șirului să aibă valorile date inițial.

Exemplu: $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$, cu $a_0 = a_1 = 1$ (șirul lui Fibonacci)

Ecuația caracteristică este: $q^2 - q - 1 = 0$ cu rădăcinile:

$q_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ și $q_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. Considerând a_n de forma:

$$a_n = c_1\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n + c_2\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n ,$$

din sistemul: $\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 1 \end{cases}$ obținem:

$$c_1 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2\sqrt{5}} \quad \text{și} \quad c_2 = \frac{\sqrt{5} + 1}{2\sqrt{5}}$$

deci $a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n \right]$, $n \geq 0$.

Observație: $q_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ este cunoscut încă din antichitate sub numele de *numărul de aur*. El este limita șirului:

$a_n = \sqrt{1 + \sqrt{1 + \ldots + \sqrt{1}}}$ (n radicali) (se aplică metoda 11).

Acest număr se regăsește adeseori în natură (dispunerea crengilor pe copaci, a frunzelor pe ramuri, proporții în corpul omenesc

etc.(Pentru amănunte vezi de exemplu Matila Ghika: *Estetică şi teoria artei*,Editura ştiinţifică şi enciclopedică,Bucureşti,1981).

b) $\Delta = 0$ (ecuaţia caracteristică are rădăcini egale $q_1=q_2$)

In acest caz considerăm a_n de forma:

$$a_n = c_1 \cdot q_1^n + n \cdot c_2 \cdot q_1^n$$

(adică $a_n = q_1^n \cdot P_1(n)$, cu P_1 – polinom de gradul unu) şi determinăm pe c_1 şi c_2 punând aceeaşi condiţie, ca primii doi termeni să aibă valorile date iniţial.

Exemplu: $a_{n+2} = a_{n+1} - \frac{1}{4} a_n$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$.

Luând $a_n = c \cdot q^n$ obţinem ecuaţia caracteristică:

$$q^2 - q + \frac{1}{4} = 0 \quad , \quad \text{cu rădăcinile} \quad q_1 = q_2 = \frac{1}{2} \ .$$

Considerând:

$$a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot (c_1 + c_2 n) \ ,$$

din sistemul: $\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 2 \end{cases}$, obţinem: $c_1 = -4$, $c_2 = 6$, deci:

$$a_n = \frac{1}{2^n} (6n - 4) \quad \text{şi} \quad \lim_{n \to \infty} a_n = 0 \ .$$

c) $\Delta < 0$ (ecuaţia caracteristică are rădăcini complexe)

Fie acestea: $q_1 = r(\cos t + i \cdot \sin t)$ şi $q_2 = r(\cos t - i \cdot \sin t)$

Avem: $a_n = c_1 \cdot q_1^n + c_2 \cdot q_2^n$, dar pentru a folosi doar numere reale, se arată că putem înlocui pe q_1^n şi q_2^n respectiv cu:

$$\frac{q_1^n + q_2^n}{2} = r^n \cos nt \quad \text{şi} \quad \frac{q_1^n - q_2^n}{2} = r^n \sin nt$$

Atunci putem scrie $a_n = r^n (c_1 \cos nt + c_2 \sin nt)$.

3. Recurenţă liniară de ordin h (mai mare decât 2)

Este de forma:

$$a_{n+h} = \alpha_1 \cdot a_{n+h-1} + \alpha_2 \cdot a_{n+h-2} + \ldots + \alpha_h \cdot a_n$$

cu primii h termeni daţi.

Procedând ca la recurenţa de ordin doi, combinăm $a^n = c \cdot q$ şi punem condiţia să fie satisfăcută relaţia de recurenţă. Obţinem ecuaţia caracteristică:

$$q^h = \alpha_1 \cdot q^{h-1} + \alpha_2 \cdot q^{h-2} + \ldots + \alpha_h$$

Distingem următoarele cazuri:

a) dacă ecuaţia caracteristică are toate rădăcinile reale şi distincte: q_1 , q_2 , ... , q_h , vom considera pe a_n de forma:

$$a_n = c_1 \cdot q_1^n + c_2 \cdot q_2^n + \ldots + c_h \cdot q_h^n$$

şi determinăm constantele c_i , $i \in \overline{1,h}$, punând condiţia ca primii k termeni ai şirului să aibă valorile date iniţial.

b) dacă o rădăcină, de exemplu q_1, este multiplă de ordin s, ($q_1 = q_2 = \ldots = q_s$), înlocuim suma $c_1 \cdot q_1^n + c_2 \cdot q_2^n + \ldots + c_s \cdot q_s^n$ din expresia lui a_n cu: $c_1 \cdot P_{s-1}(n)$, P_{s-1} fiind un polinom de grad s-1, ai cărui coeficienţi se determină punând condiţia ca primii s termeni să aibă valorile date iniţial.

c) dacă o rădăcină, de exemplu q_1, este complexă, atunci şi conjugata ei este o rădăcină a ecaţiei caracteristice (fie de exemplu $q_2 = \overline{q_1}$) . în acest caz înlocuim în expresia lui a_n suma: $c_1 \cdot q_1^n + c_2 \cdot q_2^n$ cu:

$$r^n (c_1 \cos nt + c_2 \sin nt)$$

iar dacă rădăcina q_1 este multiplă de ordin s ($q_1 = q_2 = \ldots q_s$ şi

$q_{s+1} = q_{s+2} = \ldots = q_{2s} = \overline{q_1}$) înlocuim în expresia lui a_n termenii ce conțin rădăcina complexă cu:

$$r^n(c_1 \cos nt + c_2 \sin nt) + n \cdot r^n(c_3 \cos nt + c_4 \sin nt) + \ldots$$
$$\ldots + n^{s-1} \cdot r^n(c_{2s-1} \cos nt + c_{2s} \sin nt).$$

EXERCITII:

I. Determinați expresia termenului general și calculați limita pentru:

1. $a_{n+1} = \frac{3}{2} a_n$, cu a_0 dat

2. $a_{n+1} = a_n \cdot \ln x$, cu $a_0 = a^x$

3. $a_{n+1} = a^x \cdot a_n$ cu $a_0 = \ln x$

4. $a_{n+2} = \frac{3 \cdot a_{n+1} - a_n}{2}$ cu $a_1 = 1$, $a_2 = 2$

5. $a_{n+2} = 2 \cdot a_{n+1} - 2 \cdot a_n$ cu $a_1 = 1$, $a_2 = 2$

6. $a_{n+3} = 7 \cdot a_{n+2} - 16 \cdot a_{n+1} + 12 \cdot a_n$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = -1$

7. $a_{n+3} = 3 \cdot a_{n+2} - 3 \cdot a_{n+1} + a_n$, $a_0 = 1$, $a_1 = 6$, $a_2 = 17$

8. $a_{n+4} + 2 \cdot a_{n+3} + 3 \cdot a_{n+2} + 2 \cdot a_{n+1} + a_n = 0$,
$a_0 = a_1 = 0$, $a_2 = -1$, $a_3 = 0$

II. 1. Să se determine α astfel încât șirul dat prin relația de recurență: $a_{n+2} = \alpha \cdot a_{n+1} = 3 \cdot a_n$, $a_1 = 0$, $a_2 = 2$ să aibă limită și să se calculeze limita.

2. Scrieți relațiile de recurență și termenii generali ai șirurilor pentru care: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, iar rădăcinile ecuației caracteristice sunt:

a) $q_1 = 1$, $q_2 = -\frac{1}{2}$

b) $q_1 = q_2 = 1$, $q_3 = \frac{1}{2}$

c) $q_1 = \frac{1 + i\cdot\sqrt{3}}{2}$, $q_2 = \frac{1 - i\cdot\sqrt{3}}{2}$

d) $q_1 = 1 + i$, $q_2 = 1 - i$, $q_3 = 1$

3. Fie $a_n = A\cdot\alpha^n + B\cdot\beta^n$; cu a , B , α , $\beta \in \mathbb{R}$ şi A , $B \neq 0$, $|\alpha| \neq |\beta|$. Să se determin α şi β astfel ca :

a) şirul (x_n) să fie convergent;

b) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$

c) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$

4. Fie $a_n = A\cdot\alpha^n + B.n.\beta^n$, $n \geq 1$, cu A , B , α , $\beta \in \mathbb{R}$, A , $B \neq 0$. Să se determine α şi, β astfel ca şirul să fie convergent.

(B) RECURENŢA NELINIARA

1. Recurenţă de forma $a_{n+1} = \alpha\cdot a_n + \beta$, cu a_0 dat

Expresia termenului general se obţine observând că dacă l este rădăcină a ecuaţiei $l = \alpha\cdot l + \beta$ (obţinută înlocuind pe a_{n+1} şi a_n cu l în relaţia de recurenţă) atunci şirul $(a_n - l)_{n\in\mathbb{N}}$ este o progresie geometrică.

Exemplu: $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_{n+1} = \frac{a_n + 1}{2}$

Din ecuaţia $l = \frac{l + 1}{2}$ deducem $l = 1$.

Atunci şirul $(a_n - 1)_{n\in\mathbb{N}}$ este o progresie geometrică.

Fie $b_n = a_n - 1$. Avem $b_1 = a_1 - 1 = -\frac{1}{2}$, $b_2 = a_2 - 1 =$

$= \frac{a_1 + 1}{2} - 1 = -\frac{1}{4}$.

Raţia progresiei geometrice este deci: $q = \frac{1}{2}$. Obţinem:

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1} = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = -\left(\frac{1}{2}\right)^n ,$$

deci $a_n = b_n + 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1$ şi $\lim_{n \to \infty} a_n = 1$.

2. Recurenţă de forma $a_{n+1} = \alpha \cdot a_n + f(n)$

(f fiind o funcţie oarecare)

Termenul general se găseşte pe baza observaţiei că dacă $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un şir care verifică aceeaşi relaţie de recurenţă, atunci orice şir $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ care verifică relaţia dată este de forma:

$$a_n = c \cdot \alpha^n + b_n \quad , \quad \text{cu} \quad c = a_0 - b_0 .$$

În practică se alege b_n de forma:

$$b_n = f(n)$$

coeficienţii lui f fiind nedeterminaţi. Aceşti coeficienţi se determină punând condiţia ca $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ să verifice relaţia de recurenţă.

Caz particular: recurenţă de forma:

$$a_{n+1} = \alpha \cdot a_n + \beta^n \cdot P(n)$$

cu P polinom de grad s .

Exemplu: $a_{n+1} = 3 \cdot a_n + 5^n (n^2 + 2n + 3)$, $a_0 = 1$

Căutăm şirul b_n de forma: $b_n = 5^n (u \cdot n^2 + v \cdot n + w)$. Punem con-

diţia ca $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ să verifice relaţia de recurenţă dată:

$$b_{n+1} = 3\cdot b_n + 5^n(n^2 + 2n + 3)$$

Obţinem:

$$5^{n+1}(u(n+1)^2 + v(n+1) + w) = 3\cdot 5^n(un^2 + vn + w) +$$

$$+ 5^n(n^2 + 2n + 3)$$

Prin identificare rezultă: $a = \frac{1}{2}$, $v = -\frac{3}{2}$, $w = \frac{21}{4}$,

deci: $b_o = \frac{21}{4}$ şi $a_n = 5^n(a_o - b_o) + b_n =$

$$= -\frac{17}{4}\cdot 5^n + 5^n\left(\frac{1}{2}u^2 - \frac{3}{2}u + \frac{21}{4}\right) = 5^n\left(\frac{1}{2}n^2 - \frac{3}{2}n + 1\right).$$

3. Recurenţă de forma $a_{n+1} = f(a_n)$

(cu $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ funcţie continuă)

Teoremă: 1. Dacă funcţia $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ este continuă şi crescătoare pe $[a,b]$, atunci:

a) dacă $a_1 > a_o$, şirul $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este crescător

b) dacă $a_1 < a_o$, şirul $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este descrescător

Linta şirului este un punct fix al lui f , adică o soţie a ecuaţiei caracteristice $f(x) = x$.

2. Dacă f este descrescătoare pe $[a,b]$, atunci subşirurile de indice par respectiv impar ale lui $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sînt monotone şi de monotonii diferite. Dacă aceste două subşiruri au limite, atunci acestea sunt egale.

Exemplu: $a_1 = 10$, $a_{n+1} = \frac{2 + a_n^2}{2\cdot a_n}$

Avem $f(x) = \frac{2 + x^2}{2x}$; din tabelul de variație deducem că f este descrescătoare pe $(0 , \sqrt{2})$ și crescătoare pe $(\sqrt{2} , \infty)$. Prin inducție se demonstrează că $a_n > \sqrt{2}$, și cum $a_2 = 5,1 < a_1$ înseamnă că șirul este descrescător.

Mărginirea se poate deduce din proprietatea funcțiilor continue definite pe intervale închise și mărginite de a fi mărginite.

Ecuația caracteristică $f(x) = x$ are rădăcinile $x_{1,2} = \pm \sqrt{2}$, deci $l = \sqrt{2}$.

Caz particular: recurența omografică:

$$a_{n+1} = \frac{\alpha \cdot a_n + \beta}{\gamma \cdot a_n + \delta} \quad , \quad \text{cu } a_0 \text{ dat}$$

Avem: $f(x) = \frac{\alpha \cdot x + \beta}{\gamma \cdot x + \delta}$ - numită funcție omografică și:

$f'(x) = \frac{\alpha \cdot \delta - \beta \cdot \gamma}{(\gamma \cdot x + \delta)^2}$, deci monotonia lui f depinde de semnul expresiei $\alpha \cdot \delta - \beta \cdot \gamma$.

Dacă $x_1 \neq x_2$ sunt rădăcinile ecuației caracteristice $f(x) = x$, notând: $\theta = \frac{\gamma \cdot x_1 + \delta}{\gamma \cdot x_2 + \delta}$ se poate arăta că termenul general a_n al șirului este dat de relația:

$$\frac{x_2 - a_n}{x_1 - a_n} = \theta^n \frac{x_2 - a_0}{x_1 - a_0}$$

Exemplu: $a_0 = 1$, $a_{n+1} = \frac{2}{1 + a_n}$.

Să se arate că: $a_1 < a_3 < a_5 < \ldots < 1 < \ldots < a_4 < a_2 < a_0$. De aici rezultă că șirul este convergent (se descompune în două

subşiruri convergente) . Se deduce că limita şirului este 1.

EXERCITII:

I. Determinaţi termenul general şi studiaţi convergenţa şirurilor:

1. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a \cdot a_n + 1$ cu $|a| < 1$

2. $a_o = \frac{1}{2}$, $a_{n+1} = 2a_n + 3^n (n^2 - n - 1)$

3. $a_o = 0$, $a_{n+1} = -\frac{1}{2} a_n + \frac{3}{2^n} \cdot n$

4. $a_o = 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} a_n + \frac{n^2}{2^n}$

5. $a_o = 1$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt{a_n^2 + 1}}$

6. $a_o > 1$, $a_{n+1} = \frac{2}{1 + a_n}$

7. $a_o = 1$, $a_{n+1} = \frac{2 \cdot a_n - 1}{2 \cdot a_n + 5}$

8. $a_o = \frac{1}{2}$, $a_{n+1} = a \cdot a_n + b$. Determinaţi coeficienţii a şi b astfel încât şirul să aibă limită finită. Calculaţi această limită.

9. $a_1 \neq 2$, $a_{n+1} = \frac{2}{2 - a_n}$ este periodic.

II. 1. $x_o \in \left(0 , \frac{\pi}{4} \right) \cup \left(\frac{3\pi}{4} , \pi \right)$; $\sin x_n + \cos x_n = 1$

2. $x_o = a$, $x_{n+1} = \frac{x_n^3 + 4 \cdot x_n}{8}$

3. $x_o = 1$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left[x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}} \right]$

4. $x_0 = 1$, $x_{n+1} = \sqrt{\frac{x_n}{a + b \cdot x_n}}$, $a,b > 0$.

15. ORICE SIR Cauchy DE NUMERE REALE ESTE CONVERGENT

Unul din exercițiile recapitulative din manualul de analiză pentru clasa a XI-a cere să se arate că dacă un șir $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de numere reale este convergent, atunci:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall m,n \geq \varepsilon \quad | a_m - a_n | < \varepsilon \qquad (3.9)$$

Un șir care satisface condiția (3.8) se numește șir Cauchy sau șir fundamental. Se demonstrează că un <u>șir de numere reale este convergent dacă și numai dacă este șir Cauchy.</u> Această propoziție permite demonstrarea convergenței unor șiruri arătând că ele sunt șiruri Cauchy.

În astfel de exerciții se folosește condiția:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall m,n \geq n_\varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad | a_{n+p} - a_n | < \varepsilon \qquad (3.9')$$

care este echivalentă cu (3.9) dar mai comod de folosit.

Exemplu: $a_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!}$

Trebuie arătat că:

(a) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_\varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad | a_{n+p} - a_n | < \varepsilon$

(b) fie $\varepsilon > 0$. Să vedem dacă există n_ε astfel încât să aibă loc proprietatea (a)

(c) avem: $| a_{n+p} - a_n | = \frac{1}{(n+p)!} + \frac{1}{(n+p-1)!} + \ldots$

$$\ldots + \frac{1}{(n+1)!} =$$

$$= \frac{1}{n!}\left(\frac{1}{(n+1)(n+2) \ldots (n+p)} + \ldots + \frac{1}{n+1} \right) <$$

$$< \frac{1}{n!}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^p + \left(\frac{1}{2}\right)^{p-1} + \ldots + \frac{1}{2}\right] = \frac{1}{n!}\cdot\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^p}{1-\frac{1}{2}} <$$

$$< \frac{1}{n!}\cdot\frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{n!} < \frac{2}{n}$$

(d) punem condiția: $\frac{2}{n} < \varepsilon$ și obținem $n > \frac{2}{\varepsilon}$, deci putem lua: $n_\varepsilon = \left[\frac{2}{\varepsilon}\right] + 1$.

EXERCITII:

I. Să se arate că următoarele șiruri sunt fundamentale:

1. $a_n = \frac{1}{n}$

2. $a_n = \frac{1}{1\cdot 3} + \frac{1}{2\cdot 4} + \ldots + \frac{1}{n(n+2)}$

3. $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots + \frac{1}{n^2}$

4. $a_n = 1 + \frac{\cos x}{3} + \frac{\cos 2x}{3^2} + \ldots + \frac{\cos nx}{3^n}$

5. $a_n = \frac{\sin x}{n^2+1} + \frac{\sin 2x}{n^2+2} + \ldots + \frac{\sin nx}{n^2+n}$

6. $a_n = \frac{\cos x}{2} + \frac{\cos 2x}{2^2} + \ldots + \frac{\cos nx}{2^n}$

7. $a_n = \frac{\cos \alpha_1}{1\cdot 2} + \frac{\cos \alpha_2}{2\cdot 3} + \ldots + \frac{\cos \alpha_n}{n(n+1)}$

8. $a_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n}$

9. Fie $a_n = b_1 + b_2 + \ldots + b_n$ unde:

a) $b_k \cdot b_{k+1} < 0$

b) $|b_1| > |b_2| > \ldots > |b_n| > \ldots$

c) $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$

Să se arate că $|a_{n+p} - a_n| < b_{n+1}$ pentru orice $n,p \in \mathbb{N}$. Să

se deducă de aici că şirul este Cauchy.

INDICATII:

3. $|a_{n+p} - a_n| < \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \ldots$

$$\ldots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)}$$

şi facem descompuneri în fracţii simple.

8. $|a_{n+p} - a_n| = \left|(-1)^{n+p-1}\frac{1}{n+p} + (-1)^{n+p-2}\frac{1}{n+p-1} + \ldots\right.$

$$\left.\ldots + (-1)^n \frac{1}{n+1}\right| = \left|\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} - \ldots\right.$$

$$\left.\ldots + (-1)^{p-1}\frac{1}{n+p}\right|$$

Dacă p este impar deducem:

$$|a_{n+p} - a_n| = \left|\frac{1}{n+1} - \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) - \ldots\right.$$

$$\left.\ldots - \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p}\right)\right| < \frac{1}{n+1},$$

iar dacă este par:

$$|a_{n+p} - a_n| = \left|\frac{1}{n+1} - \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) - \ldots\right.$$

$$\left.\ldots - \left(\frac{1}{n+p-2} - \frac{1}{n+p-1}\right) - \frac{1}{n+p}\right| < \frac{1}{n+1}$$

Deci: $|a_{n+p} - a_n| < \frac{1}{n+1}$. Din condiţia: $\frac{1}{n+1} < \varepsilon$ obţinem: $n_\varepsilon = \left[\frac{1}{\varepsilon} - 1\right] + 1$.

9. Procedăm ca la exerciţiul precedent, unde am avut:

$$b_n = (-1)^n \frac{1}{n}.$$

16. *UTILIZAREA DEFINITIEI INTEGRALEI*

Se ştie că suma Riemann ataşată funcţiei $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$, corespunzător unei diviziuni:

$$\Delta = \{ a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = b \}$$

şi puncelor intermediare $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, este:

$$\sigma_\Delta(f,\xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) \qquad (3.10)$$

Dacă punctele x_i sunt echidistante, atunci $x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$ şi avem:

$$\sigma_\Delta(f,\xi) = \frac{b-a}{n} \left[f(\xi_1) + f(\xi_2) + \ldots + f(\xi_n) \right] \qquad (3.11)$$

O funcţie este integrabilă dacă: $\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sigma_\Delta(f,\xi)$ există şi este finită. Valoarea limitei se numeşte integrala funcţiei f pe intervalul [a,b] :

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sigma_\Delta(f,\xi) = \int_a^b f(x)\, dx$$

Pentru a utiliza definiţia integralei în calculul limitelor de şiruri, observăm că pentru diviziuni Δ formate cu puncte echidistante, avem:

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sigma_\Delta(f,\xi) = \lim_{n \to \infty} \sigma_\Delta(f,\xi)$$

Deci putem proceda astfel:

a) arătăm că termenul general a_n se poate pune sub forma:

$$a_n = \frac{b-a}{n} \left[f(\xi_1) + f(\xi_2) + \ldots + f(\xi_n) \right]$$

cu f funcţie continuă pe [a,b] , iar ξ_i fiind punctele unei diviziuni echidistante.

b) f fiind continuă este şi integrabilă, iar:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \sigma_\Delta(f,\xi) \overset{\Delta \text{ are puncte echidistante}}{=\!=\!=} \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sigma_\Delta(f,\xi) \overset{f\text{-continua}}{=\!=\!=}$$

$$== \int_a^b f(x)\,dx \ .$$

Exemplu: $a_n = n^2 \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n^3 + k^3}$

a) scriem pe a_n sub forma:

$$a_n = \frac{b-a}{n}\left[f(\xi_1) + f(\xi_2) + \ldots + f(\xi_n) \right]$$

punînd în evidenţă factorul comun $\frac{1}{n}$. Avem:

$$a_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{n^3}{n^3 + k^3} = \frac{1}{n}\left(\frac{n^3}{n^3 + 1^3} + \frac{n^3}{n^3 + 2^3} + \ldots + \frac{n^3}{n^3 + n^3} \right)$$

b) în $f(\xi_i) = \frac{n^3}{n^3 + i^3}$ facem să apară punctele nidis-

tante $\frac{(b-a)i}{n}$:

$$\frac{n^3}{n^3 + i^3} = \frac{1}{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^3}$$

şi deducem funcţia f. Avem: $f(x) = \frac{1}{1 + x^3}$.

c) aşezăm punctele echidistante pe o dreaptă:



şi deducem diviziuna: $\Delta = \{ 0, \ldots, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \ldots, \frac{n}{n} = 1 \}$ şi intervalul [a,b] .

d) observăm că a_n este suma Riemann corespunzătoare funcţiei (continue, deci integrabile) f şi diviziunii Δ deduse, pe intervalul [a,b] . Cum punctele lui Δ sunt echidistante, avem:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \sigma_\Delta(f,\xi) = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sigma_\Delta(f,\xi) = \int_0^1 \frac{1}{1+x^3}\,dx = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

EXERCITII.

I. Utilizând definiţia integralei calculaţi limitele următoarelor şiruri:

1. $a_n = \frac{1}{n^6}\sum_{i=1}^{n} i^5$

2. $a_n = n\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{3n^2+i^2}$

3. $a_n = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i.e^{i/n}$

4. $a_n = \frac{\pi}{2n}\sum_{i=1}^{n-1} \cos\frac{i\pi}{2n}$

5. $a_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{n}{(n+i)\sqrt{n^2+i^2}}$

6. $a_n = \frac{1}{n}\sqrt{n(n+1)(n+2)\ldots(n+n)}$

7. $a_n = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n} \ln(i^2+n^2) - 2(n-1)\ln n)$

Indicatii: 4. $a_n = \frac{\pi/2}{n}\sum_{i=1}^{n} \cos\frac{(\pi/2)i}{n} \xrightarrow{n\to\infty} \int_0^{\pi/2} \cos x\,dx.$

6. Logaritmând obţinem $\ln a_n = -\ln n + \frac{1}{n}(\ln n + \ln(n+1) + \ldots +$

$\ln(n+n)) = -\ln n + \frac{1}{n}(\ln n + \ln n(1+\frac{1}{n}) + \ldots + \ln n(1+\frac{n}{n})) =$

$\frac{1}{n}(\ln(1+\frac{1}{n}) + \ln(1+\frac{2}{n}) + \ldots + \ln(1+\frac{n}{n})) \xrightarrow{n\to\infty} \int_0^1 \ln(1+x)\,dx.$

II. (a) Scrieţi suma Riemann $\sigma_\Delta(f,\xi)$ corespunzătoare funcţiei $f : [\varepsilon,1] \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$, diviziunii $\Delta = (\varepsilon, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \ldots, \frac{n}{n} = 1)$ şi punctelor intermediare $\xi_i = i/n$. (b) Calculaţi $\lim_{n\to\infty} \sigma_\Delta(f,\xi) = l(\varepsilon)$. (c) Calculaţi $\lim_{\varepsilon\to 0} l(\varepsilon)$ şi deduceţi că $\lim_{n\to\infty} (1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n}) = \infty$.

4. CONTINUITATE SI DERIVABILITATE

CONTINUITATE

DEFINITIE: Funcţia $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ este continuă în $x_o \in D$ dacă:

1. are limită în x_o ,
2. limita este egală cu $f(x_o)$,

adică

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 \quad \forall x \in D \quad |x - x_o| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(x_o)| < \varepsilon$$

CONSECINTA: Orice funcţie continuă într-un punct are limită în acel punct.

(A) Metode pentru studiul continuităţii

1. Utilizarea definiţiei.

Exemplu: $f(x) = \dfrac{x + 1}{2x + 3}$ este continuă în $x = 1$.

Într-adevăr, să arătăm că:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-\tfrac{3}{2}\} \quad |x - 1| < \delta_\varepsilon \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \left| \frac{x + 1}{2x + 3} - f(1) \right| < \varepsilon$$

Fie $\varepsilon > 0$ oarecare. Trebuie să determinăm pe δ_ε . Avem:

$$\left| \frac{x+1}{2x+3} - f(1) \right| = \left| \frac{x+1}{2x+3} - \frac{2}{5} \right| = \frac{|x-1|}{5|2x-3|} < \frac{\delta_\varepsilon}{5|2x+3|} <$$

$$< \frac{\delta_\varepsilon}{15}$$

deoarece pe intervalul [0,2] , de exemplu, $|2x+3|$ este mărginit între 3 şi 7 . Determinăm pe δ_ε din condiţia $\frac{\delta_\varepsilon}{15} < \varepsilon$.

Putem lua de exemplu $\delta_\varepsilon = 2\varepsilon$. Atunci:

$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta_\varepsilon = 2\varepsilon \quad \forall\, x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{-3}{2}\} \quad |x-1| < 2\varepsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow \quad |f(x) - f(1)| < \varepsilon$

şi deci f este continuă în $x = 1$.

2. Utilizarea criteriului cu limite laterale

$$f \text{ este continuă în } x_0 \iff l_s(x_0) = l_d(x_0) = f(x_0)$$

unde $l_s(x_0)$ şi $l_d(x_0)$ sunt respectiv limita la stânga şi la dreapta în x_0 .

EXEMPLU: Să studiem continuitatea funcţiei:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{\sin^2\alpha - \frac{x}{e^{1-x}} \sin\alpha + \frac{x^2}{4}} & x \in [0\ ,\ 1] \\ 1/2 & x = 1 \\ \frac{3}{2(x^2+x+1)} & x \in [1\ ,\ 2] \end{cases}$$

pentru $\alpha \in [0\ ,\ 2\pi]$.

REZOLVARE: Deoarece se cere să se studieze continuitatea, fără

a se specifica un punct anume, trebuie făcut studiul pe tot domeniul de definiție. Punctele domeniului apar ca fiind de două categorii:

1. Puncte de legătură între ramuri, în care se studiază continuitatea utilizând de exemplu limitele laterale.

2. Celelalte puncte, în care funcția este continuă, fiind exprimată prin funcții (elementare) continue (dar acest lucru trebuie specificat de fiecare dată).

În cazul nostru :

(a) în orice punct $x_o \neq 1$ funcția este continuă fiind exprimată prin funcții continue.

(b) studiem continuitatea în $x_o = 1$. Avem:

$$l_s(1) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x<1}} f(x) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x<1}} \sqrt{\sin^2\alpha - \frac{x}{x^{1-x}} + \frac{x^2}{4}} =$$

$$\lim_{\substack{x \to 1 \\ x<1}} \sqrt{\left(\sin\alpha - \frac{1}{2}\right)^2} = \left|\sin\alpha - \frac{1}{2}\right| ,$$

iar $l_d(1) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x<1}} f(x) = \lim_{x \to 1} \frac{3}{2}(x^2 + x + 1) = \frac{1}{2}$.

Valoarea funcției în punct este $f(1) = \frac{1}{2}$, deci f este continuă în $x = 1 \iff \left|\sin\alpha - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$. Pentru explicitarea modulului utilizăm tabloul cu semnul funcției $\sin\alpha - \frac{1}{2}$:

α	0		$\pi/6$		$5\pi/6$		2π
$\sin\alpha - 1/2$		$-$	0	$+$	0	$-$	

1. dacă $\alpha \in \left[0 , \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6} , 2\pi\right]$ ecuația devine:

$-\sin\alpha + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \iff \sin\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 0$, $\alpha = \pi$, $\alpha = 2\pi$

2. dacă $\alpha \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$ obținem $\sin\alpha = 1$, deci $\alpha = \frac{\pi}{2}$.

Pentru aceste patru valori ale lui α funcția este continuă și în punctul $x = 1$, deci este continuă pe $\mathbb{R}$.

3. Utilizarea criteriului cu șiruri.

Acest criteriu se obține din criteriul cu șiruri pentru limite de funcții înlocuind pe l cu $f(x_0)$ și renunțând la condiția $x_n \neq x_0$ (care în cazul limitelor este esențială, deoarece se poate studia limita unei funcții într-un punct în care $f(x)$ nu există).

EXEMPLU:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 2x & \text{dacă } x \in \mathbb{Q} \\ x + 4 & \text{dacă } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Procedând ca la Metoda 10 , cu cele două adaptări menționate mai sus, rezultă că f este continuă în punctele x_0 pentru care $3x_0^2 + 2x_0 = x_0 + 4$, adică $x_0 = \frac{-4}{3}$ și $x_0 = 1$.

(B) Tipuri de puncte de discontinuitate.

Punctul $x_0 \in D$ în care f nu este continua se spune ca este punct de discontinuitate de speta întîi daca limitele laterale în x_0 exista si sunt finite.

Orice alt punct de discontinuitate se spune ca este de speta a doua.

(C) Prelungirea prin continuitate.

A prelungi funcţia $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ înseamnă a adăuga domeniului D puncte noi, în care legea de corespondenţă se defineşte după voie.

Dacă M este mulţimea de puncte adăugată şi h este legea de corespondenţă pe M, prelungirea va fi:

$$f_p : D \cup M \longrightarrow \mathbb{R} \quad , \quad f_p(x) = \begin{cases} f(x) & \text{dacă } x \in D \\ h(x) & \text{dacă } x \in M \end{cases}$$

De exemplu, $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ poate fi prelungită la întreaga mulţime $\mathbb{R}$ punând

$$f_p(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{dacă } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ \alpha & \text{dacă } x = 0 \end{cases}$$

Există deci foarte multe prelungiri ale unei funcţii. Totuşi, dacă f este continuă pe D şi are limită finită într-un punct $x_o \notin D$, există o singură prelungire $f_p : D \cup \{x_o\} \longrightarrow \mathbb{R}$ care este continuă, numită prelungire prin continuitate a lui f în punctul x_o.

Deci, pentru exemplul nostru, deoarece $\lim_{x \to o} \frac{\sin x}{x} = 1$, funcţia

$$f_p(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{dacă } x \neq 0 \\ 1 & \text{dacă } x = 0 \end{cases}$$

este singura prelungire a lui $\sin x / x$ care este continuă pe $\mathbb{R}$.

(D) Continuitatea funcţiilor compuse.

Dacă f este continuă în x_o şi g este continuă în $f(x_o)$, atunci gof este continuă în x_o.

$$\begin{array}{ccccc} D & & E & & F \\ x_o & \longrightarrow & f(x_o) & \longrightarrow & g(f(x_o)) = (gof)(x_o) \end{array}$$

Deci compunerea a două funcţii continue este o funcţie continuă.

Reciproc nu este adevărat: s-ar putea ca f şi g să nu fie continue şi totuşi gof să fie continuă.

De exemplu,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{dacă } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

nu este continuă în nici un punct, dar funcţia $g(x) = (fof)(x)$ este funcţia identic egală cu 1 , deci este continuă în orice punct din $\mathbb{R}$.

EXERCITII:

I. Să se studieze, pe domeniul maxim de definiţie, continuitatea funcţiilor definite prin:

1. $f(x) = x \cdot [x]$

2. $f(x) = [x] \cdot \sin \pi x$

3. $f(x) = \lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{x^n + x}{x^{2n} + 1}$

4. $f(x) = \lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{nx}{1 + |nx|}$

5. $f(x) = \begin{cases} x & \text{dacă } x \in \mathbb{Q} \\ 2x & \text{dacă } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

6. $f(x) = \begin{cases} u(x) & \text{dacă } x \in \mathbb{Q} \\ v(x) & \text{dacă } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

7. $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \text{ sau } x = 0 \\ \dfrac{1}{q} & \text{dacă } x = \dfrac{p}{q} \end{cases}$ (funcţia lui Riemann)

8. $f(x) = \begin{cases} \left| \dfrac{x-1}{x+1} \right| \cdot e^{\frac{-1}{|x|}} & \text{dacă } x \neq 0 \\ 0 & \text{dacă } x = 0 \end{cases}$

9. $f(x) = \begin{cases} x - p & \text{dacă } x \in \left[p , p + \frac{1}{2} \right] \\ p + 1 - x & \text{dacă } x \in \left(p + \frac{1}{2} , p + 1 \right] \end{cases}$ $p \in \mathbb{Z}$ (Manual)

10. $f(x) = \begin{cases} 27 \ln(-1-x) & \text{dacă } x < 0 \\ m & \text{dacă } x = 0 \\ \frac{}{1+e^{-2x}} & \text{dacă } x > 0 \end{cases}$

II. Să se precizeze tipul punctelor de discontinuitate pentru funcțiile:

1. $f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{tg} x}{x} & x \neq 0 \\ \alpha & x = 0 \end{cases}$

2. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} & x \neq 0 \\ \alpha & x = 0 \end{cases}$

3. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} & x \neq 2k\pi \\ \alpha & x = 2k\pi \end{cases}$

4. $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{x^2 - 8x + 7} & x \neq 1 , \quad x \neq 7 \\ \alpha & x = 1 \end{cases}$

5. $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln|x|}{1 + \ln|x|} & x \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{e}, 0, \frac{1}{e}\} \\ \alpha & x \in \{-\frac{1}{e}, 0, \frac{1}{e}\} \end{cases}$

Să se determine prelungirile prin continuitate, unde este posibil.

III. Să se studieze continuitatea funcțiilor f , g , fog , gof , pentru:

1. $f(x) = \operatorname{sgn} x$ $\qquad g(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ -x & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

2. $f(x) = [x]$ $\qquad g(x) = \ln x$

3. $f(x) = \left[1 + [x] \right]$ $\qquad g(x) = \operatorname{sgn} x$

4. $f(x) = \operatorname{sgn}(\operatorname{sgn} x)$ $\qquad g(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ 3x^2 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

IV. 1. Fie $f,g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ funcţii continue astfel incât $f(x) = g(x)$ pentru orice $x \in \mathbb{Q}$. Să se arate că $f = g$
(Manual)

2. Fie $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ o funcţie cu proprietatea lui Darboux. Dacă f are limite laterale în orice punct din I, atunci f este continuă pe I .
(Manual)

3. Fie $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ astfel incât:

$|f(x) - f(y)| \leq \sqrt{|x-y|}$ pentru orice $x,y \in \mathbb{R}$. Să se arate că există $a > 0$ astfel incât pentru orice x cu $|x| \leq a$ să avem $|f(x)| < a$. Să se deducă existenţa unui punct fix pentru f . (x_o este punct fix pentru f dacă $f(x_o) = x_o$) . (Manual)

4. Fie $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$, continuă. Atunci:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 \quad \forall x,y \in [a,b] , \ |x-y| < \delta_\varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f(x)-f(y)| < \varepsilon \qquad (4.1)$$

(Manual)

O funcţie cu proprietatea (4.1) se numeşte <u>funcţie uniform continuă pe [a,b]</u>.

Uniform continuitatea se defineşte deci pe un interval, în timp ce continuitatea se poate defini într-un punct.

Luînd în (4.1) $y = x_o$ se deduce că orice funcţie uniform continuă pe un interval este continuă pe acel interval.

Exerciţiul 4. de mai sus afirmă reciproca acestei propoziţii, care este adevărată dacă intervalul este închis şi mărginit.

DERIVABILITATE

(A) Definiţie.Interpretare geometrică.Consecinţe.

DEFINITIE. Funcţia $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ este derivsbilă in $x_o \in D$ dacă există şi este finită limita:

$$\lim_{x \to x_o} \frac{f(x) - f(x_o)}{x - x_o}$$

Valoarea acestei limite se notează cu $f'(x_o)$ şi se numeşte derivata lui f in x_o .

INTERPRETATRE GEOMETRICA. Derivata unei funcţii intr-un punct x_o este panta tangentei la graficul lui f in punctul de abscisă x_o.



Fig. 4.1

Când x tinde la x_o , coarda AB tinde către tangenta in A la grafic, deci panta corzii

$$m_{AB} = \frac{f(x) - f(x_o)}{x - x_o}$$

tinde către panta tangentei. Aşadar $f'(x_o)$ este panta tangentei in punctul de abscisă x_o la grafic.

Interpretarea geometrică a derivatei rezultă deci din următorul şir de implicaţii:

$$AB \xrightarrow{x \to x_o} AT \Rightarrow m_{AB} \xrightarrow{x \to x_o} m_{AT} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to x_o} \frac{f(x) - f(x_o)}{x - x_o} = m_{AT} \Rightarrow f'(x_o) = m_{AT}$$

CONSECINTE. 1. Orice funcţie derivabilă într-un punct este continuă în acel punct.

2. Ecuaţia tangentei la graficul unei funcţii derivabile.

Se ştie că ecuaţia unei drepte ce trece prin punctul $(x_o, f(x_o))$ este:

$$y - f(x_o) = m(x - x_o)$$

şi înlocuind pe m cu $f'(x_o)$ (panta tangentei la grafic) obţinem <u>ecuaţia tangentei la grafic în punctul de abscisă x_o</u>:

$$y - f(x_o) = f'(x_o)(x - x_o)$$

3. Ecuaţia normalei (perpendiculara pe tangentă) se deduce din condiţia de perpendicularitate a două drepte ($m_1 \cdot m_2 = -1$) şi deci este:

$$y - f(x_o) = \frac{-1}{f'(x_o)}(x - x_o)$$

(B) <u>Derivarea funcţiilor compuse.</u>

$$(f(u(x)))' = f'(u(x)) \cdot u'(x) \qquad (4.2)$$

Din formula (4.2) se deduce:

$$(f_3(f_2(f_1(x))))' = f_3'(f_2(f_1(x))) \cdot f_2'(f_1(x)) \cdot f_1'(x)$$

Deci, pentru a deriva o funcţie compusă procedăm astfel:

(a) derivăm ultima funcţie care se compune (în cazul nostru f_3) şi înlocuim în această funcţie variabila x cu expresia rezultată din compunerea celorlalte funcţii (în cazul nostru $f_2 \circ f_1$).

(b) neglijând funcţia derivată la etapa precedentă (în cazul nostru pe f_3) se derivează funcţia care a devenit ultima (pentru noi f_2) şi de asemenea se înlocuieşte variabila x cu expresia rezultată din compunerea funcţiilor care încă nu au fost derivate (în această etapă noi avem doar $f_1(x)$

(c) se continuă procedeul până se derivează toate funcţiile.

EXEMPLU: $\cos^2 \sin \sqrt[3]{x^2+1}$

1 Aplicând formula (4.2) avem:

$$f'(x) = 2\cdot\cos \sin \sqrt[3]{x^2+1} \left(\cos \sin \sqrt[3]{x^2+1} \right)' = 2\cdot\cos \sin \sqrt[3]{x^2+1} \cdot$$

$$\cdot \left(-\sin \sin \sqrt[3]{x^2+1} \right) \left(\sin \sqrt[3]{x^2+1} \right)' = 2\cdot\cos \sin \sqrt[3]{x^2+1} \cdot$$

$$\cdot \left(-\sin \sin \sqrt{x^2+1} \right) \cdot \cos \sqrt{x^2+1} \cdot \left(\sqrt[3]{x^2+1} \right)' =$$

$$2\cdot\cos \sin \sqrt[3]{x^2+1} \cdot \left(-\sin \sin \sqrt[3]{x^2+1} \right) \cdot$$

$$\cdot \cos \sqrt[3]{x^2+1} \; \frac{1}{3\cdot\sqrt[3]{(x^2+1)^2}} \cdot 2x$$

Putem obţine acelaşi rezultat mult mai repede, utilizând generalizarea formulei (4.2), prezentată mai sus.

Astfel, funcţiile care se compun sânt:

$$f_1(x) = x^2 + 1 \quad , \qquad f_2(x) = \sqrt[3]{x} \quad , \qquad f_3(x) = \sin x$$

$$f_4(x) = \cos x \quad , \qquad f_5(x) = x^2$$

iar $f(x) = f_5(f_4(f_3(f_2(f_1(x)))))$, deci:

$$f'(x) = f_5'(f_4(f_3(f_2(f_1(x))))) \cdot f_4'(f_3(f_2(f_1(x)))) \cdot f_3'(f_2(f_1(x))) \cdot$$

$$\cdot f_2'(f_1(x)) \cdot f_1'(x) = 2 \cdot \cos \sin \sqrt[3]{x^2+1} \cdot \left(-\sin \sin \sqrt[3]{x^2+1} \right) \cdot$$

$$\cdot \cos \sqrt[3]{x^2+1} \cdot \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2+1}} \cdot 2x$$

CONSECINTE: 1. Derivata funcţiei inverse.

Din $f^{-1}(f(x)) = x$, aplicând formula (4.2) rezultă:

$\left(f^{-1}(f(x))\right) \cdot f'(x) = 1$, sau notând $y = f(x)$:

$$\left(f^{-1}(y)\right) = (f'(x))^{-1}$$

EXEMPLU: Pentru $f(x) = \ln x$, $f : (0,\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ avem:

$f^{-1}(x) = e^x$ şi deci cum $y = \ln x \Rightarrow x = e^y$ obţinem:

$$\left(e^y \right)' = \left((\ln x)' \right)^{-1} = \left(\frac{1}{x} \right)^{-1} = x = e^y .$$

2. Derivate de ordin superior alè funcţiilor compuse.

Din $\left(f(u(x))\right)' = f'(u(x)) \cdot u'(x)$, derivând din nou în raport cu x rezultă:

$$\left(f(u(x))\right)'' = \left(f'(u(x) \cdot u'(x)\right) = f''(u(x)) \cdot u'(x) \cdot u'(x) +$$

$$+ f'(u(x)) \cdot u''(x) = f''(u(x)) \cdot \left(u'(x)\right)^2 + f'(u(x)) \cdot u''(x)$$

Am obţinut astfel derivata de ordinul doi a funcţiei compuse, şi procedeul poate continua.

EXEMPLU: Să calculăm $f''(x)$ dacă $f(x) = g(e^{-x})$, g fiind o funcţie derivabilă de două ori pe $\mathbb{R}$.

Avem: $f'(x) = g'(e^{-x})\cdot(-e^{-x})$ şi $f''(x) = g''(e^{-x})(-e^{-x})^2 +$

$+ g'(e^{-x})(e^{-x}) = e^{-x}\left(g'(e^{-x}) - g''(e^{-x})\cdot e^{-x} \right)$.

(C) Derivate de ordinul n

Pentru calculul derivatei $f^{(n)}(x)$ putem utiliza una din următoarele metode:

1. Calculăm câteva derivate (f' , f'' , f''' , ...) pentru a deduce expresia lui $f^{(n)}$, pe care o demonstrăm apoi prin inducţie.

2. Utilizăm formula lui Leibniz de derivare a produsului a două funcţii:

$$\left(f(x)\cdot g(x) \right)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \, f^{(n-k)}(x)\cdot g^{(k)}(x)$$

Formula poate fi aplicată şi unui cât, deoarece:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x)\cdot\frac{1}{g(x)}$$

(D) Studiul derivabilităţii.

Pentru a studia derivabilitatea unei funcţii procedăm astfel:

(a) deosebim două categorii de puncte ale domeniului: puncte în care ştim că funcţia este derivabilă (fiind exprimată prin funcţii derivabile) şi puncte în care urmează să studiem derivabilitatea (în general puncte de legătură dintre ramuri).

(b) pentru studiul derivabilităţii în această a doua categorie

de puncte se utilizează una din următoarele metode:

(1) calculăm derivatele laterale cu ajutorul definiției

(2) calculăm derivatele laterale cu ajutorul Corolarului teoremei lui Lagrange: Dacă f este derivabilă într-o vecinătate a lui x_o și continuă în x_o și dacă există

$$\lambda_s = \lim_{x \to x_o} f'(x) \quad \text{(respectiv } \lambda_d = \lim_{x \to x_o} f'(x) \text{)}$$

atunci f are derivată la stânga (respectiv la dreapta) în x_o. și $f'_s(x_o) = \lambda_s$ (respectiv $f'_d(x_o) = \lambda_d$)

Condiția de continuitate în x_o care se cere în ipoteza corolarului este esențială pentru aplicarea acestuia, dar ea nu constituie de fapt o restricție când studiem derivabilitatea, deoarece dacă f nu este continuă în x_o nu este nici derivabilă.

EXEMPLU: Să determinăm parametri $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ astfel încât funcția:

$$f(x) = \begin{cases} \ln^2 x & x \geq e \\ \alpha x + \beta & x < e \end{cases}$$

să fie derivabilă. Care este interpretarea geometrică a rezultatului obținut ?

Raspuns: Metoda 1. (utilizarea derivatelor laterale)

(a) în orice punct $x \neq e$ funcția este derivabilă, fiind exprimată prin funcții derivabile.

(b) studiem derivabilitatea în $x = e$.

Datorită propoziției : f non continuă ==> f non derivabilă

studiem mai întîi continuitatea.

$$l_s(e) = \lim_{\substack{x \to e \\ x < e}} f(x) = \lim_{\substack{x \to e \\ x < e}} (\alpha x + \beta) = \alpha e + \beta$$

$l_d(e) = \lim\limits_{\substack{x \to e \\ x<e}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x \to e \\ x<e}} \ln^2 x = 1$ şi $f(e) = \ln^2 e = 1$

deci: f continuă în e $\Leftrightarrow$ $\alpha e + \beta = 1$ (4.3)

Dacă nu este îndeplinită condiţia de continuitate în $x = e$, funcţia nu este nici derivabilă în acest punct, deci studiem derivabilitatea presupunând că este îndeplinită condiţia de continuitate.

$$f'_s(e) = \lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \frac{f(x) - f(e)}{x - e} = \lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \frac{\alpha x + \beta - 1}{x - e} = \left[1 = \alpha e + \beta \right] =$$

$$\lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \frac{\alpha x + \beta - \alpha e - \beta}{x - e} = \alpha .$$

$$f'_d(e) = \lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \frac{f(x) - f(e)}{x - e} = \lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \frac{\ln^2 x - 1}{x - e}$$

Pentru calculul acestei limite putem:

(1) aplica definiţia derivatei,

(2) permuta limita cu logaritmul,

(3) utiliza regula lui l'Hospital.

(1) Observăm că notând $g(x) = \ln^2 x$ avem $g(e) = 1$ şi limita devine:

$$\lim \frac{g(x) - g(e)}{x - e} = g'(e) \text{ (deoarece g este derivabilă în e)}$$

$$g'(x) = (\ln^2 x)' = 2 \cdot \ln x \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow g'(e) = \frac{2}{e}, \text{ deci } f'_d(e) = \frac{2}{e}$$

$$(2) \lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \frac{\ln^2 x - 1}{x - e} = \lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \frac{\ln^2 x - \ln^2 e}{x - e} =$$

$$= \lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \frac{(\ln x - \ln e)(\ln x + \ln e)}{x - e} = 2 \cdot \lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \frac{\ln x - \ln e}{x - e} =$$

$$= 2 \cdot \lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \frac{\ln(x/e)}{x - e} = \lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \left[\frac{1}{x - e} \cdot \ln \left(\frac{x}{e} \right) \right] = \lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \ln \left(\frac{x}{e} \right)^{\frac{1}{x-e}} =$$

$= \ln \lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \left(\frac{x}{e}\right)^{\frac{1}{x-e}} = 1^{\infty}$, etc.

Aşadar, f este derivabilă în e $\Leftrightarrow$ $f'_s(e) = f'_d(e)$ $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ $\alpha = \frac{2}{e}$ şi din condiţia de continuitate obţinem $\beta = -1$.

Avem deci:

$$f(x) = \begin{cases} \ln^2 x & x > e \\ \frac{2}{e}x - 1 & x < e \end{cases}$$

Interpretarea geometrică a rezultatului obţinut: dreapta $y = \frac{2}{e}x - 1$ este tangentă la curba $y = \ln x^2$.

Dacă o ramură a unei funcţii este exprimată printr-o dreaptă ($y = \alpha x + \beta$) funcţia este derivabilă în punctul x_o de legătură dintre ramuri dacă şi numai dacă dreapta respectivă este tangentă în punctul de abscisă x_o . la graficul celeilalte ramuri.

Metoda 2: (Utilizarea Corolarului Teoremei lui Lagrange).

(a) În orice punct $x \neq e$ funcţia este derivabilă, fiind exprimată prin funcţii derivabile şi avem:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{x}\ln x & x > e \\ \alpha & x < e \end{cases}$$

(b) Studiem derivabilitatea în $x = e$. Punem mai întâi condiţia de continuitate: $l_s(e) = l_d(e) = f(e)$ $\Leftrightarrow$ $\alpha e + \beta = 1$.

Pentru a utiliza corolarul teoremei lui Lagrange calculăm limitele laterale ale derivatei:

$\lim_{\substack{x \to e \\ x<e}} \alpha = \alpha$. Din corolar deducem $f'(e) = \alpha$. Analog, $f'_d(e) =$

$$\lim_{\substack{x \to e \\ x < e}} f'(x) = \frac{2}{e} .$$

Deci f este derivabilă în $x = e$ dacă şi numai dacă $\alpha = \frac{2}{e}$.

Din condiţia de continuitate deducem $\beta = -1$.

(E) Aplicaţii ale derivatei în economie

(vezi manualul de analiză matematică cls.IX)

1. Fie $\beta(x)$ beneficiul realizat pentru o cheltuială de x lei . Pentru orice cheltuială suplimentară de h lei beneficiul suplimentar pe leu cheltuit este:

$$\frac{\beta(x + h) - \beta(x)}{h}$$

Dacă h este suficient de mic acest raport dă o indicaţie asupra variaţiei beneficiului corespunzător sumei de x lei.

Dacă există

$$\lim_{h \to 0} \frac{\beta(x + h) - \beta(x)}{h} = \beta'(x)$$

această limită se numeşte beneficiul marginal corespunzător sumei de x lei.

2. Fie $\gamma(p)$ costul total pentru producerea a p unităţi dintr-un produs. Atunci costul pe unitate suplimentară de produs este:

$$\frac{\gamma(p + h) - \gamma(p)}{h}$$

şi limita acestui raport, când h tinde la zero, dacă există, se numeşte cost marginal al producţiei pentru p unităţi din produsul considerat.

EXEMPLU: Beneficiul realizat pentru o cheltuială de x lei

este $\beta(x) = x^2 - 3x + 2$. Pentru orice cheltuială suplimentară de h lei, calculați beneficiul suplimentar pe leu cheltuit și beneficiul marginal corespunzător sumei de 1000 lei.

Răspuns: Beneficiul suplimentar pe leu cheltuit este:

$$\frac{\beta(x + h) - B(x)}{h} = \frac{(x + h)^2 - 3(x + h) + 2}{h}$$

Pentru $x = 1000$ acesta este egal cu $1997 + h$, iar

$$\lim_{h \to 0} \frac{\beta(x + h) - \beta(x)}{h} = 1997$$

EXERCITII:

I. Se cere:

1. Ecuația tangentei la graficul lui $f(x) = \ln \sqrt{1 + x^2}$ în punctul de abscisă $x_o = 1$.

2. Ecuația tangentei la curba $f(x) = \sqrt{x^2 - k^2}$, care este paralelă cu Ox .

3. Ecuația tangentei la curba $f(x) = x^3$, paralelă cu prima bisectoare.

4. Ecuația tangentei la curba $y = \frac{3x + 2}{2x + 6}$, care este paralelă cu coarda ce unește punctele de abscise $x = 1$ și $x = 3$.

5. Să se determine α și β astfel încât $y = \alpha x + \beta$ și $y = \frac{x - 1}{x}$ să fie tangente în $x = 1$. Să se scrie tangenta lor comună.

6. Să se arate că dreapta $y = 7x - 2$ este tangentă la curba $y = x^2 + 4x$. (Manual)

II.

1. Să se calculeze derivata funcției:

$$f(x) = \int_0^{x^2} e^{t^6} \cdot \sin t^2 \, dt$$

2. Fie $f : (-\infty,0) \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 3x$. Să se determine un subinterval $J \subseteq \mathbb{R}$ astfel încât $f : (-\infty,0) \longrightarrow J$ să fie bijectivă. Fie g inversa ei. Să se calculeze $g'(-1)$ și $g''(-1)$. (Manual)

3. Dacă $|f(x) - f(y)| \leq M \cdot |x - y|^{1+\alpha}$, cu $\alpha > 0$ pentru orice $x,y \in I$, funcția f este constantă pe I.

4. Dacă f are limită în punctul a, atunci funcția $g(x) = (x - a) \cdot f(x)$ este derivabilă în a.

5. Dacă f este mărginită într-o vecinătate a lui x_0 atunci $g(x) = (x - x_0)^2 f(x)$ este derivabilă în x_0. Caz particular: $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

Indicații:

1. Fie F o primitivă a funcției $f(t) = e^{t^6} \sin t^2$. Avem $I(x) = F(x^4) - F(0)$, deci $I'(x) = \left(F(x^4) \right)$.

3. Pentru $x \neq y$ inegalitatea din enunț este echivalentă cu:

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq M \cdot |x - y|^{\alpha}$$

de unde, pentru $y \longrightarrow x$ obținem $f'(x) = 0$, deci f este constantă pe I.

III. Calculați derivatele de ordinul n pentru :

1. $f(x) = \frac{1}{x - 3}$

2. $f(x) = \frac{1}{ax + b}$

3. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$

4. $f(x) = \ln(2x + 5)$

5. $f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2)$

6. $f(x) = (x^3 - 2x^2 + 5x - 3) \cdot e^{x+1}$

7. $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x + 3}$

8. $f(x) = \frac{x^3}{(x - 2)(x - 3)}$

9. $f(x) = \operatorname{arctg} x$

10. $f(x) = e^{ax}\, e^{bx}$ din expresia derivatei de ordinul n să se deducă formula binomului lui Newton.

IV.

1. Arătați că:

a) $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2} \right)$,

b) $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2} \right)$.

2. Aplicând formula lui Leibniz pentru $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$, să se arate că:

$$n! \cdot \left[\frac{1}{(x - 1)^{n+1}} - \frac{1}{(x - 2)^{n+1}} \right] =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} C_n^k \, (n - k)! \cdot k! \cdot \frac{1}{(x - 1)^{n+1} \cdot (x-2)^{n+1}}$$

Găsiți formule asemănătoare, cu ajutorul funcțiilor:

$f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$ și $f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 - 5x + 4}$

3. Fie $I = (0,1)$ și funcțiile $u,v : I \longrightarrow \mathbb{R}$, $u(x) = u(x) = \inf_{y \in I} (x - y)^2$, $v(x) = \sup_{y \in I} (x - y)^2$. Să se studieze derivabilitatea funcțiilor u și v și să se calculeze $\sup_{x \in I} u(x)$, $\inf_{x \in I} v(x)$. (Manual)

3. Dacă $f_n(x)$ este un şir de funcţii derivabile, având limită în orice punct x atunci:

$$\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x) \right)' = \lim_{n\to\infty} f'(x) \qquad \text{(Manual)}$$

V. Să se studieze derivabilitatea funcţiilor :

1. $$f(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + 3x) & x \in (0,1) \\ \frac{5}{4}(x - 1) + 2\cdot\ln 2 & x \geq 1 \end{cases}$$

2. $f(x) = \min (x^2 - x , 4x - 2)$

3. $f_1(x) = |(x - 2)(x - 3)|$ $\qquad f_2(x) = |(x - 2)^2\cdot(x - 3)|$

$f_3(x) = |(x - 2)^3\cdot(x - 3)|$

4. $$f(x) = \begin{cases} \frac{-\pi}{4} & x = -1 \\ \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{1 - t^2}}\, dt & x \in (-1 , 1) \\ \frac{\pi}{4} & x = 1 \end{cases}$$

5. $f'(x)$ dacă $$f(x) = \begin{cases} \ln^2(1 - x) & x \leq 0 \\ tg^2 x & x \geq 0 \end{cases}$$

6. $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}\left[1 + \frac{|x|}{x} \right] + \frac{1}{1 + e^{1/x}} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

7. $$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

este indefinit derivabilă pe $\mathbb{R}$ şi:

$$f^{(n)}(x) = \left[\frac{1}{x^{n+1}}\right] \cdot \int_0^x t^n \cdot \cos\left(t + \frac{n\pi}{2}\right)\, dt$$

8. $$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{x-1} & x \leq 0 \\ x \cdot \ln x & x \in (0,1) \\ \dfrac{e^{-x}}{e} & x \geq 1 \end{cases}$$

9. $$f(x) = \begin{cases} \arccos(\cos x) & x \in \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right] \\ \arcsin(\sin x) & x \in \left(\dfrac{\pi}{2}, 2\pi\right] \end{cases}$$

10. $$f(x) = \frac{|x-1| \cdot e^{nx} + a(x+1)^2 \cdot e^{-nx}}{e^{nx} + e^{-nx}}, \quad a \in \mathbb{R}$$

5. TEOREMELE FERMAT, ROLLE, LAGRANGE, CAUCHY

(A) TEOREMA LUI FERMAT (1601 - 1665)

1. Enunț: Dacă $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ este continuă pe $[a,b]$ și derivabilă pe (a,b), atunci în orice punct de extrem din (a,b) (din interiorul intervalului) derivata se anulează.

Observație: $x_0 \in (a,b)$ punct de extrem $\Longrightarrow$ $f'(x_0) = 0$

Dacă x_0 este punct de extrem la capetele intervalului, derivata poate să nu se anuleze în x_0.

Exemplu: $f(x) = 3x + 2$, $f:[-1,2] \longrightarrow \mathbb{R}$ are două puncte de extrem: în $x_1 = -1$ și în $x_2 = 2$, iar $f'(-1) = f'(2) = 3$.

2. Interpretare geometrică și algebrică

a) Interpretare geometrică rezultă din interpretarea geometrică a derivatei:

- dacă sînt îndeplinite condițiile teoremei lui Fermat în orice

punct din interiorul intervalului, tangenta la graficul funcției este paralelă cu axa Ox.

b) Interpretare algebrică: dacă sînt îndeplinite condițiile teoremei lui Fermat pe [a,b] , orice punct de extrem din (a,b) este rădăcină a ecuației $f'(x) = 0$.

EXERCITII:

1. Dacă a_1 , a_2 , ... a_n sunt numere pozitive astfel încât: $a_1^x + a_2^x + \ldots + a_n^x \geq n$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$, atunci avem:

$$a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n = 1$$

(Manual)

2. Fie a_1 , a_2 , ... a_n , b_1 , b_2 , ... , b_n numere reale pozitive astfel încât:

$$a_1 \cdot b_1^x + a_2 \cdot b_2^x + \ldots + a_n \cdot b_n^x \geq a_1 + a_2 + \ldots + a_n$$

pentru orice $x \in \mathbb{R}$. Atunci:

$$b_1^{a_1} \cdot b_2^{a_2} \cdot \ldots \cdot b_n^{a_n} = 1$$

(generalizare a exercițiului precedent)

3. Dacă f este continuă pe [a,b] și derivabilă pe (a,b), iar $f(a) = f(b) = 0$, atunci:

(i) dacă f' este crescătoare, rezultă $f(x) \leq 0$ pe [a,b] ;

(ii) dacă f' este descrescătoare, rezultă $f(x) \geq 0$ pe [a,b] .

4. Dacă $a^x \geq x^a$ pentru orice $x > 0$ atunci $a = e$.

5. $\frac{\operatorname{tg} a}{\operatorname{tg} b} < \frac{a}{b}$ dacă $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$.

REZOLVARI:

1. Exercițiul este caz particular al exercițiului 2.

2. Punem în evidență o funcție ce are un punct de extrem (global) pe $\mathbb{R}$, observând că inegalitatea din ipoteză se poate scrie: $f(x) \geq f(0)$, cu $f(x) = a_1 \cdot b_1^x + a_2 \cdot b_2^x + \ldots + a_n \cdot b_n^x$. Deoarece această inegalitate este adevărată pentru orice x real rezultă că x $x = 0$ este punct de minim global pentru f. Conform teoremei lui Fermat în acest punct derivata se anulează, deci $f'(0) = 0$. Avem:

$$f'(x) = a_1 \cdot b_1^x \cdot \ln b_1 + a_2 \cdot b_2^x \cdot \ln b_2 + \ldots + a_n \cdot b_n^x \cdot \ln b_n$$

deci: $f'(0) = 0 \iff a_1 \cdot \ln b_1 + a_2 \cdot \ln b_2 + \ldots a_n \cdot \ln b_n = 0 \iff$

$$\iff\iff b_1^{a_1} + b_2^{a_2} + \ldots + b_n^{a_n} = 1$$

3. (i) Presupunem prin absurd că există $c \in (a,b)$ astfel încât $f(c) > 0$. Putem presupune că c este chiar punct de maxim deoarece un astfel de punct există, conform teoremei lui Rolle deci avem $f'(c) = 0$.

Între c și b există cel puțin un punct d în care $f'(d) < 0$, căci dacă prin absurd $f'(x) \geq 0$ pentru orice $x \in (c,b)$ rezultă că f este crescătoare pe (c,b) și deci $f(c) \leq f(b) = 0$ implică $f(c) = 0$. Atunci din $f'(d) \leq 0 = f'(c)$ deducem contradicția:

$$f'(d) < f'(c) \quad \text{cu} \quad c < d$$

4. $a^x \geq x^a \iff x \cdot \ln a \geq a \cdot \ln x \iff \frac{\ln a}{a} \geq \frac{\ln x}{x}$ (pentru orice $x > 0$). Deci a este abscisa maximului funcției: $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Avem: $f'(x) = 0 \iff x = e$, deci $a = e$.

5. $\frac{\text{tg } a}{\text{tg } b} < \frac{a}{b} \iff \frac{\text{tg } a}{a} < \frac{\text{tg } b}{b}$

(dacă $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$).

Este suficient să arătăm că $f(x) = \frac{\text{tg } x}{x}$ este crescătoare, adică $f'(x) > 0$.

(B) TEOREMA LUI ROLLE (1652 - 1719)

1. Enunț: Dacă $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ este continuă pe $[a,b]$, derivabilă pe (a,b) și $f(a) = f(b)$, atunci există $c \in (a,b)$ astfel încât $f'(c) = 0$.

Teorema lui Fermat afirmă că într-un punct de extrem din interiorul unui interval derivata se anulează, dar nu spune și când există un asemenea punct.

Teorema lui Rolle dă o condiție suficientă pentru existența a cel puțin un astfel de punct, adăugând la ipotezele din teorema lui Fermat și condiția: $f(a) = f(b)$.

2. Interpretare geometrică și algebrică

a) Interpretare geometrică: dacă sunt îndeplinite condițiile teoremei lui Rolle, există cel puțin un punct în intervalul (a,b) în care tangenta la grafic este paralelă cu ox.

b) Interpretare algebrică: dacă sunt îndeplinite condițiile teoremei lui Rolle, ecuația $f'(x) = 0$ are cel puțin o rădăcină în intervalul (a,b) .

Interpretarea algebrică a teoremei pune în evidență o metodă pentru a arăta că ecuația $f(x) = 0$ are cel puțin o rădăcină în intervalul (a,b). Pentru aceasta este suficient să considerăm o primitivă F a lui f, pentru care sunt îndeplinite condițiile teoremei lui Rolle pe $[a,b]$. Va rezulta că ecuația $F'(x) = 0$ are cel puțin o rădăcină în intervalul (a,b), adică $f(x)$ are o rădăcină în intervalul (a,b).

O a doua metodă pentru a arăta că ecuația $f(x) = 0$ are cel

puţin o rădăcină în intervalul (a,b) este de a arăta doar că f este continuă şi $f(a)\cdot f(b) < 0$.

3. Consecinţe:

1. Între două rădăcini ale unei funcţii derivabile pe un interval există cel puţin o rădăcină a derivatei.

2. Între două rădăcini ale derivatei unei funcţii derivabile pe un interval există cel mult o rădăcină a funcţiei.

Consecinţa 2. permite determinarea numărului rădăcinilor unei funcţii pe un interval cu ajutorul rădăcinilor derivatei sale (şirul lui Rolle):

fie $x_1 , x_2 , \dots , x_n$ rădăcinile derivatei.

Atunci f are atîtea rădăcini reale simple cîte variaţii de semn sunt în şirul:

$$f(-\infty) , f(x_1) , f(x_2) , \dots , f(x_n) , f(\infty)$$

(dacă avem $f(x_i) = 0$, atunci x_i este rădăcină multiplă)

EXERCITII:

I. Să se studieze aplicabilitatea teoremei lui Rolle pentru funcţiile:

1. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 8x + 1 & x \in [2,4] \\ -15 & x \in (4,5) \\ -x^2 - 10x + 10 & x \in [5,7] \end{cases}$

2. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 2 & x \in [1,2] \\ 1 & x \in (-1,1) \\ x^2 + 2x + 2 & x \in [-2,-1] \end{cases}$

3. $f(x) = \begin{cases} \sin x & x \in \left[0 , 2\pi \right] \\ 1 & x \in \left(\frac{\pi}{2} , 2\pi \right] \\ \cos x & x \in \left[2\pi , \frac{9\pi}{2} \right] \end{cases}$

Care este interpretarea geometrică a rezultatului obţinut ?

Indicaţie: 1. Se obţine $c \in [4,5]$. În orice punct din intervalul [4,5], graficul coincide cu tangenta la grafic.

II. 1. Fie $a_1 , a_2 , \ldots , a_n , b_1 , b_2 , \ldots , b_n \in \mathbb{R}$. Să se arate că ecuaţia:

$$\sum_{k=1}^{n} (a_k \cdot \cos kx + b_k \cdot \sin kx) = 0$$

are cel puţin o suluţie în intervalul $(0,2\pi)$. (Manual)

2. Dacă $\sum_{i=0}^{n} \frac{i}{i+1} = 0$, atunci ecuaţia:

$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots . a_1 x + a_0 = 0$ are cel puţin o rădăcină în intervalul (0,1).

3. (i) Dacă $a_1 , a_2 , \ldots a_n \neq 0$, atunci ecuaţia:

$n \cdot a_n \cdot x^{n-1} + (n-1) \cdot a_{n-1} x^{n-2} + \ldots . + a_1 = 0$ are cel puţin o rădăcină în intervalul (0,1).

(ii) În ce condiţii aceeaşi ecuaţie are cel puţin o rădăcină în intervalul (-1,0) ?

(iii) Aceeaşi întrebare pentru ecuaţiile:

$$a_{2n} \cdot x^{2n} + a_{2n-1} \cdot x^{2n-1} + \ldots . + a_0 = 0$$

$$a_{2n+1} \cdot x^{2n+1} + a_{2n} \cdot x^{2n} + \ldots . + a_0 = 0$$

pe intervalul (-1,1).

4. Fie $f:\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ derivabilă şi $a_1 < a_2 < \ldots . < a_n$ rădăcini ale lui f. Să se arate că f' are cel puţin n - 1 rădăcini. (Manual)

Consecinţe:

a) O funcţie polinomială de grad n are cel mult n zerouri reale distincte.

b) Dacă toate rădăcinile unui polinom sunt reale și distincte , aceeași proprietate o are și derivata sa.

c) Dacă toate rădăcinile unui polinom sunt reale , atunci și derivata sa are aceeași proprietate.

5. Fie $f(x) = (x^2 - 1)^n$. Să se arate că ecuația $f^{(n)}(x) = 0$ are n rădăcini distincte în intervalul $(-1,1)$.

6. Dacă f este de n ori derivabilă pe I și are $n + 1$ rădăcini distincte pe I, atunci $f^{(n)}(x)$ are cel puțin o rădăcină pe I.

7. Fie $f,g:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue pe $[a,b]$, derivabile pe (a,b) cu $g(x) \neq 0$ și $g'(x) \neq 0$ pe $[a,b]$, iar $\frac{f(a)}{g(a)} = \frac{f(b)}{g(b)}$. Să se arate că există $c \in (a,b)$ astfel încât:

$$\frac{f(c)}{g(c)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

8. Fie $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continuă pe (a,b) și derivabbilă pe (a,b) . Atunci între două rădăcini ale lui f există cel puțin o rădăcină a lui $\alpha \cdot f + f'$.

9. Dacă funcțiile derivabile f și g au proprietatea:

$$f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x) = 0$$

pe un interval, atunci între două rădăcini ale lui se află o rădăcină a lui g și reciproc .

Consecință: Dacă $f'(x) \cdot \cos x + f(x) \cdot \sin x \neq 0$, în orice interval de lungime mai mare decît π se află cel puțin o rădăcină a lui f .

10. Dacă $f,g:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ sunt continue pe $[a,b]$, derivabile pe (a,b), $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0$ și $f(a) = f(b) = 0$, atunci există $c_n \in (a,b)$ astfel încât:

$$\frac{f(c_n)}{g(c_n)} = \frac{1}{n} \cdot \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}$$

REZOLVARI:

7. Egalitatea de demonstrat se mai poate scrie:

$$f(c)\cdot g'(c) - f'(c)\cdot g(c) = 0$$

Această egalitate apare în punctele c care sînt rădăcini ale derivatei lui $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, deci este suficient să demonstrăm că funcţia h îndeplineşte condiţiile teoremei lui Rolle pe [a,b].

8. Ecuaţia $\alpha\cdot f(x) + f'(x) = 0$ provine din egalarea cu zero a derivatei funcţiei $F(x) = e^{\alpha x} f(x)$, deci este suficient să arătăm că F satisface condiţiile teoremei lui Rolle.

9. Fie x_1, x_2 rădăcini ale lui f. Prin ipoteză avem $g(x_1) \neq 0$ şi $g(x_2) \neq 0$. Dacă prin absurd, între x_1, x_2 nu se găseşte o rădăcină a lui g, înseamnă că funcţia $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ satisface condiţiile din teorema lui Rolle şi deci $h'(x)$ se anulează cel puţin într-un punct între x_1 şi x_2, ceea ce contrazice ipoteza.

10. $\exists\, c_n \in (a,b)$ $\frac{f(c_n)}{g(c_n)} = \frac{1}{n} \cdot \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}$ $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ $\exists\, c_n \in (a,b)$ $n\cdot f(c_n)\cdot g'(c_n) - g(c_n)\cdot f'(c_n) = 0$ $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ ecuaţia: $n\cdot f(x)\cdot g'(x) - g(x)\cdot f'(x) = 0$ are cel puţin o rădăcină în (a,b) $\Leftrightarrow$ $h'(x) = 0$ are cel puţin o rădăcină în (a,b), unde $h(x) = \frac{f(x)}{g^{(n)}(x)}$.

Vom prezenta în cele ce urmează două metode pentru studiul rădăcinilor unei ecuaţii. Prima dintre acestea utilizează teorema lui Rolle, iar cealaltă este o consecinţă a faptului că orice funcţie

continuă are proprietatea lui Darboux.

Metode pentru studiul rădăcinilor unei ecuaţii

1. Utilizarea teoremei lui Rolle (interpretarea sa algebrică)

2. Utilizrea proprietăţii lui Darboux (dacă f are proprietatea lui Darboux (în particular dacă este continuă) pe [a,b] şi: $f(a)\cdot f(b) \leq 0$, atunci f are o rădăcină în [a,b]).

Exemple:

1) Dacă $f:[a,b] \longrightarrow [a,b]$ este o funcţie continuă, atunci există $u,v \in [a,b]$ astfel încît $f(u) = u$ şi $f(v) = v$.
(Manual)

2) Fie $f:[0,2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ o funcţie continuă astfel încât $f(0) = f(2\pi)$. Să se arate că există $c \in [0,\pi]$ astfel încât $f(c) = f(c + \pi)$. (Manual)

Consecinta: Dacă un drumeţ pleacă dimineaţa din localitatea A şi ajunge seara în localitatea B, iar a doua zi plecă înapoi şi jungein A, să se arate că există un punct pe drumul dintre A şi B în care drumeţul a fost la aceeaşi oră în cele două zile de drum.

Indicatie: Dacă S(t) este spaţiul parcurs de drumeţ, avem: $S(0) = S(24)$ şi deci există $t_o \in [0,12]$ astfel încât $S(t_o) = S(t_o + 12)$.

Astfel formulată problema,rezultatul pare surprinzător,dar ea este echivalentă cu a spune că doi drumeţi care pleacă unul din A către B şi celălalt din B către A,se întâlnesc pe drum.

3. Utilizarea şirului lui Rolle.

Exemplu: Să studiem natura rădăcinilor ecuaţiei:

$$x^3 - 3x^2 + a = 0$$

a fiind un parametru real.

Raspuns: Rădăcinile derivatei sunt: $x' = 0$ şi $x'' = 2$ şi avem: $f(x') = a$ şi $f(x'') = a - 4$. Rezultatele sunt cuprise in tabelul următor:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
f(x)	$-\infty$	a	a - 4	$+\infty$	Natura rădăcinilor
$a < 0$	-	-	-	+	o rădăcină reală $x_1 > 2$
$a = 0$	-	0	-	+	$x_1 = x_2 = 0$, $x_3 > 2$
$a \in (0,4)$	-	+	-	+	$x_1 \in (-\infty,0)$, $x_2 \in (0,2)$, $x_3 > 2$
$a = 4$	-	+	0	+	$x_1 < 0$, $x_2 = x_3 = 2$
$a > 4$	-	+	+	+	o rădăcină reală $x_1 < 0$

4. Metoda grafică. Ecuaţia $F(x,m) = 0$ se reduce la forma $f(x) = m$. Numărul rădăcinilor este egal cu numărul punctelor de intersecţie dintre graficele: $y = f(x)$ şi $y = m$.

Exemplu: $x^3 + mx^2 + 2mx + 1 = 0 \iff m = -\dfrac{x^3 + 1}{x(x + 2)}$.

Numărul rădăcinilor ecuaţiei date este egal cu numărul punctelor de intersecţie dintre graficele:

$$y = -\frac{x^3 + 1}{x(x + 2)} \quad \text{şi} \quad y = m$$

5. Relaţiile lui Viette.

EXemplu: Să se arate că ecuaţia:

$x^4 + (a + 1)\cdot x^3 + (a^2 + \dfrac{a}{2} + 1)\cdot x^2 + bx + c = 0$, cu $a,b,c \in \mathbb{R}$ are cel mult două rădăcini reale.

Raspuns: avem:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -a - 1 \\ x_1x_2 + x_2x_3 + \ldots + x_3x_4 = a^2 + \frac{a}{2} + 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^2 = a^2 + 2a + 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2\cdot(x_1x_2 + x_2x_3 + \ldots + x_3x_4) = a^2 + 2a + 1$$

$$\Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = -a^2 + a - 1 < 0 \text{ , deci ecuația are cel}$$

puțin două rădăcini complexe.

6. Utilizarea teoremei de medie.

Teoremă: Dacă $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ este integrabilă Riemann (deci mărginită), există $\mu \in [m,M]$ astfel încât:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \mu(b-a)$$

Exemplu: Fie $f:[0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ continuă și astfel încât $2\int_0^1 f(x)\,dx = 1$. Să se arate că ecuația $f(x) = x$ are o rădăcină $x_0 \in (0,1)$.

Raspuns: $f(x) = x \Leftrightarrow f(x) - x = 0$, deci notând: $h(x) = f(x) - x$ trebuie arătat că ecuația $h(x) = 0$ are o rădăcină în intervalul $(0,1)$. Avem: $\int_0^1 f(x)\,dx = 1 \Leftrightarrow 2\int_0^1 (h(x)+x)\,dx = 1$

$\Leftrightarrow 2\int_0^1 h(x) = 0$. Dar: $\int_0^1 h(x) = \mu$, conform teoremei de medie, cu $\mu \in (m,M)$. Funcția h fiind continuă, are proprietatea lui Darboux, deci pentru μ există $x_0 \in (0,1)$ astfel încât $\mu = h(x_0)$.

EXERCITII:

1. Ecuațiile:

a) $x^4 - x^3 + x^2 + \alpha x + \beta = 0$

b) $x^4 - (\sin\alpha)\cdot x^3 + x^2 + \beta x + \gamma = 0$

c) $x^4 - \sqrt{2\alpha}\, x^3 + \alpha x^2 + \beta x + 1 = 0$

nu pot avea toate rădăcinile reale dacă $\alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{R}$.

Indicatie: a) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 < 0$

b) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = \sin^2\alpha - 2 < 0$

c) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 0$, $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 < 0$

2. Dacă $f:[0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ este continuă şi cu proprietatea $\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{2}{\pi}$, atunci ecuaţia $f(x) - \sin \pi x = 0$ are o rădăcină în $(0,1)$.

3. Dacă $f:[0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ este continuă şi cu proprietatea $6\int_0^1 f(x)\,dx = 2a + 3b + bc$, atunci ecuaţia $f(x) - ax^2 - bx - c = 0$ are o rădăcină în $(0,1)$.

4. Dacă $f:[0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ este continuă şi există $n > 1$ pentru care $\int_0^1 f(x)\,dx = 1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n}$, ecuaţia: $(1 - x)\cdot f(x) = 1 - x^n$ are o rădăcină în $(0,1)$.

Indicatie: Se aplică teorema de medie funcţiei:

$h(x) = f(x) - (1 + x + \ldots + x^{n-1})$

(C) TEOREMA LUI LAGRANGE (1736 - 1813)
(Teorema creşterilor finite)

1. Enunţ: Fie $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ o funcţie continuă pe $[a,b]$ şi derivabilă pe (a,b). Atunci există $c \in (a,b)$ astfel încât:

$$f(b) - f(a) = f'(c)\cdot(b - a)$$

2. Interpretare geometrică şi algebrică

a) Interpretare geometrică: Dacă sunt indeplinite condiţiile

teoremei, există un punct $c \in (a,b)$ în care tangenta la grafic este paralelă cu coarda ce unește extremitățile graficului.

b) Interpretare algebrică: Dacă sunt îndeplinite condițiile teoremei, ecuația: $f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ are cel puțin o rădăcină în intervalul (a,b) .

3. Corolarul teoremei lui Lagrange: Dacă f este continuă pe un interval I și derivabilă pe $I \setminus \{ x_0 \}$ iar în x_0 există limita derivatei: $\lim\limits_{x \to x_0} f'(x) = \lambda$, atunci f este derivabilă în x_0 și $f'(x_0) = \lambda$.

Acest corolar permite efectuarea studiului derivabilității unei funcții într-un punct mult mai ușor decît cu ajutorul derivatelor laterale.

Exemple:

1. Să se studieze derivabilitatea funcției:

$$f(x) = \begin{cases} 2^{\frac{1}{x-1}} & x < 1 \\ \ln(x^2 - 2x + 2) & x \geq 1 \end{cases}$$

Rezolvare: În orice punct $x \neq 1$ funcția este derivabilă fiind exprimată prin funcții derivabile. Studiem derivabilitatea în $x = 1$ utilizând corolarul teoremei lui Lagrange:

- continuitatea în $x = 1$:

$$l_s(1) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x<1}} f(x) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x<1}} 2^{\frac{1}{x-1}} = 0$$

$$l_d(1) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x>1}} f(x) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x>1}} \ln(x^2 - 2x + 2) = 0$$

$f(1) = \ln 1 = 0$, deci f este continuă pe $\mathbb{R}$ (și derivabilă pe $\mathbb{R} \setminus \{ 1 \}$).

- derivabilitatea . Pentru studiul derivabilității în $x = 1$, avem:

$$f'(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{(x-1)^2} \cdot 2^{\frac{1}{x-1}} \cdot \ln 2 & x < 1 \\ \dfrac{2(x-1)}{x^2 - 2x + 2} & x > 1 \end{cases}$$

(f'știm că există doar pa $\mathbb{R} - \{1\}$)

EXERCITII:

I. Să se studieze aplicabilitatea teoremei lui Lagrange și să se determine punctele intermediare c pentru:

1. $f(x) = \begin{cases} 2x - 2 & x \in [0,1) \\ x^2 + 1 & x \in [1,2] \\ 4x - 8 & x \in (2,3] \end{cases}$

2. $f(x) = \begin{cases} \sin x & x \in [0, \frac{\pi}{6}] \\ x^2 + \alpha \cdot x + \beta & x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}] \end{cases}$

3. $f(x) = \left| \left(x - \frac{\pi}{2} \right)^3 \cdot \cos x \right|$, $x \in [0,\pi]$

4. $f(x) = \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1-x}{1+x}$, $x \in [0,n]$

5. $f(x) = \begin{cases} \left[e^{-\frac{1}{x^2}} \right]^{(n)} & x \in [-1,1] , \ x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

Indicatie: 2. Condiția de continuitate în $x = \frac{\pi}{6}$ este: $\frac{\pi^2}{36} + \alpha \frac{\pi}{6} + \beta = \frac{1}{2}$, iar condiția de derivabilitate (corola-

rul teoremei Lagrange) este : $2\frac{\pi}{6} + \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Punctul c este soluția ecuației: $f'(x) = \dfrac{f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f(0)}{\frac{\pi}{2} - 0} = 0$.

II. 1. Fie $f(x) = ax^2 + bx + c$. Să se aplice teorema creșterilor finite pe intervalul $[x_1, x_2]$, găsindu-se punctul c intermediar. Să se deducă de aici un mod de a construi tangenta la o parabolă într-un punct dat al ei.

2. Avem: $m \leq f'(x) \leq M$ pentru orice $x \in I$, dacă și numai dacă:

$$m \cdot |x - y| \leq |f(x) - f(y)| \leq M \cdot |x - y| \quad \forall\, x, y \in I \,. \qquad (L1)$$

3. (Generalizarea teoremei lui Rolle). Dacă f este continuă pe [a,b] și derivabilă pe (a,b), există $c \in (a,b)$ astfel încât:

$$\operatorname{sgn}\left(f(b) - f(a) \right) = \operatorname{sgn} f'(c) \qquad (L2)$$

4. Presupunând că f este de două ori derivabilă într-o vecinătate V a punctului a, să se arate că pentru h suficient de mic există $p, q \in V$ astfel încât:

a) $$\frac{f(a + h) - f(a - h)}{2h} = f'(p)$$

b) $$\frac{f(a + h) - f(a - h) - 2f(a)}{h^2} = f''(q)$$

(Manual)

5. Fie $f:[0,\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ o funcție derivabilă astfel încât $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0$ și fie $a > 0$ fixat. Aplicând teorema Lagrane pe fiecare interval $[\, a + n \,,\, a + n + 1 \,]$, $n \in \mathbb{N}$, să se arate că există un șir $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ având limita infinit și astfel încât:

$$\lim_{x \to \infty} \sum_{i=0}^{n} f'(x_i) = - f(a)$$

6) Teorema creșterilor finite se mai poate scrie:

$$f(x + h) - f(x) = h.f'(x + ch) \quad \text{cu } c \in (0,1).$$

Să se aplice această formulă funcţiilor a) $f(x) = x^2$ b) $f(x) = x^3$, c) $f(x) = mx + n$ şi să se studieze valorile corespunzătoare punctului real c.

REZOLVARI:

1. $c = \frac{x_1 + x_2}{2}$, deci fiind dat punctul de abscisă c, pentru a construi tangenta în punctul $(c, f(c))$ al graficului considerăm două puncte simetrice faţă de c: $x_1 = c-\varepsilon$, $x_2 = c+\varepsilon$. Tangenta trece prin punctul $(c, f(c))$ şi este paralelă cu coarda determinată de punctele $(x_1, f(x_1))$ şi $(x_2, f(x_2))$.

2. Necesitatea: Pentru $x = y$ (L1) este verificată, iar pentru $x \neq y$ avem: (L1) $\Leftrightarrow$ $m \leq \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq M \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ $m \leq f'(c_{x_j}) \leq M$ inegalităţi adevărate datorită ipotezei.

Reciproc, fie $x \in I$ oarecare. Pentru $x \neq y$ (L1) $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ $m \leq \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq M$ şi făcând pe y să tindă la x, avem: $m \leq f'(x) \leq M$.

3. Distingem trei cazuri: (1) $f(a) < f(b)$. În acest caz trebuie să arătăm că există $c \in (a,b)$ astfel încât $f'(c) > 0$. Dacă prin absurd, am avea $f'(c) \leq 0$ pe (a,b), ar rezulta că f este descrescătoare, deci $f(a) > f(b)$.

(2) $f(a) = f(b)$. Ne aflăm în condiţiile teoremei lui Rolle.

(3) Cazul $f(a) > f(b)$ este. analog cu (1).

4. a) Se aplică teorema lui Lagrange lui f pe $[a - h, a + h]$. b) Se aplică de două ori teorema lui Lagrange funcţiei $g(x) = f(a + x) - f(x)$ pe intervalul $[a - h, a]$.

6. a) $c = 1/2$, c) se obţine $mh = mh$, deci c nu se poate determina.

(D) TEOREMA LUI CAUCHY (1789 - 1857)

1. Enunţ: Fie $f,g:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue pe $[a,b]$ şi derivabile pe (a,b) astfel încât $g'(x) \neq 0 \ \forall x \in (a,b)$. Atunci există $c \in (a,b)$ astfel încât:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

2. Interpretare geometrică şi algebrică

a) Interpretare geometrică: În condiţiile teoremei există un punct în care raportul pantelor tangentelor la cele două grafice este egal cu raportul pantelor corzilor ce unesc extremităţile graficelor.

b) Interpretare algebrică: În condiţiile teoremei, ecuaţia: $f'(x)\big[\, g(b) - g(a) \,\big] - g'(x)\big[\, f(b) - f(a) \,\big] = 0$ are cel puţin o rădăcină în (a,b).

EXERCITII:

I. Să se studieze aplicabilitatea teoremei lui Cauchy şi să se determine punctul intermediar c pentru:

1. $f(x) = \ln x$, $g(x) = \frac{e}{x}$, $f,g:[1,e] \longrightarrow \mathbb{R}$

2. $f(x) = \ln x$, $g(x) = 2x - 1$, $f,g:[1,e] \longrightarrow \mathbb{R}$

3. $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$, $f,g:\left[\frac{\pi}{6} , \frac{\pi}{2}\right]$ (Manual)

4. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3} - x^2 + 1 & x \in [1,3] \\ -x + \frac{4}{3} & x \in [0,1] \end{cases}$

$g(x) = x^2 + 1$, $f,g:[0,3] \longrightarrow \mathbb{R}$

II. 1. Dacă f are derivate de orice ordin pe [a,b], aplicînd formula lui Cauchy funcţiilor:

a) $g(x) = f(x)$, $h(x) = b - x$, să se arate că există $c \in (a,b)$ astfel incit $f(b) = f(a) + (b - a)f'(c)$.

b) $g(x) = f(x) + (b - x)f'(x)$, $h(x) = (b - x)^2$, să se arate că există $c \in (a,b)$ astfel incât:

$$f(b) = f(a) + (b - a)f'(a) + \frac{(b - a)^2}{2!}f''(c)$$

c) $g(x) = f(x) + \frac{b - x}{1!}f'(x) + \frac{(b - x)^2}{2!}f''(x)$,

$h(x) = (b - x)^3$, să se arte că există $c \in (a,b)$ astfel incât:

$$f(b) = f(a) + \frac{(b - a)}{1!}f'(a) + \frac{(b - a)^2}{2!}f''(a) + \frac{(b - a)^3}{3!}f'''(c)$$

d) $g(x) = f(a) + \frac{b - a}{1!}f'(x) + \frac{(b - x)^2}{2!} + \ldots$

$\ldots + \frac{(b - x)^n}{n!}f^{(n)}(x)$, $g(x) = (b - x)^{n+1}$, să se arate că există $c \in (a,b)$ astfel incât:

$$f(b) = f(a) + \frac{b - a}{1!}f'(a) + \frac{(b - a)^2}{2!}f''(a) + \ldots$$

$$\ldots + \frac{(b - a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \frac{(b - a)^{n+1}}{(n + 1)!}f^{(n+1)}(c)$$

2. Aplicând concluzia de la punctul b), să se arate că nu există funcţii $f:\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ de două ori derivabile astfel incât:

$$f(x) \geq 0 \quad \text{şi} \quad f''(x) < 0$$

(nu există funcţii nenegative şi strict concave pe intreaga axă reală).

REZOLVARE:

2. Din $f''(x) < 0$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$, deducem că f' este

strict descrescătoare şi deci nu putem avea $f'(x) = 0$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$. Aşadar, există $x_0 \in \mathbb{R}$ astfel încât $f'(x_0) \neq 0$.

Dar atunci din relaţia:

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2} f''(c)$$

rezultă $f(x) - f(x_0) < (x - x_0)f'(x_0)$ (C1)

Avem două situaţii: (1) dacă $f'(x_0) > 0$, făcând pe x să tindă la $-\infty$ în (C1) avem:

$$\lim_{x \to -\infty} \left(f(x) - f(x_0) \right) = \lim_{x \to -\infty} (x - x_0)f'(x_0) = -\infty$$

prin urmare $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ — contradicţie .

(2) dacă $f'(x_0) < 0$ obţinem aceeaşi contradicţie dacă facem pe x să tindă la $+\infty$.

6. EGALITATI SI INEGALITATI

EGALITATI

Se ştie că dacă derivata unei funcţii este egală cu zero pe un interval, funcţia respectivă este constantă pe acel interval. Această observaţie permite demonstrarea unor egalităţi de forma:

$$f(x) = g(x) + C$$

sau, în particular,

$$f(x) = g(x) \quad \text{şi} \quad f(x) = C = \text{constant}$$

Într-adevăr, $f(x) = g(x) + C \iff f(x) - g(x) = C$ şi pentru demonstrarea acestei egalităţi este suficient să demonstrăm că: $\left(f(x) - g(x) \right) = 0$.

Observaţie: Dacă derivata este egală cu zero pe o reuniune de intervale disjuncte, este posibil să difere constanta de la un interval la altul.

Pentru determinarea constantei C, putem utiliza două metode:

1. Calculăm expresia $f(x) - g(x)$ într-un punct convenabil ales din intervalul considerat.

2. Dacă nu este posibil să aplicăm metoda precedentă, putem calcula $\lim_{x \to x_0} \left(f(x) - g(x) \right)$, x_0 fiind de asemenea un punct convenabil ales (un capăt de interval).

Exemplu: Să se arate că avem:

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1 - x}{1 + x} = \begin{cases} -\frac{3\pi}{4} & x \in (-\infty , -1) \\ \frac{\pi}{4} & x \in (-1 , \infty) \end{cases}$$

Rezolvare: Pentru $h(x) = \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1 - x}{1 + x}$ avem $h'(x) = 0$ pentru orice $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, domeniu ce este o reuniune de intervale disjuncte. Calculăm valoarea constantei pe fiecare interval.

(1) Pentru $x > -1$, alegem punctul $x = 0$ în care putem face uşor calculele: $h(0) = \operatorname{arctg}(0) + \operatorname{arctg}(1) = \frac{\pi}{4}$.

(2) Pentru $x < -1$ nu găsim un punct în care să putem calcula uşor valoarea lui h, dar observăm că putem calcula:

$$\lim_{\substack{x \to -1 \\ x < -1}} h(x) = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = -\frac{3\pi}{4}.$$

INEGALITATI

Metoda 1: Utilizarea teoremei lui Lagrange sau a teoremei lui Cauchy.

În unele inegalităţi poate fi pusă în evidenţă o expresie de

forma: $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, f şi punctele a,b fiind convenabil alese. În acest caz se poate utiliza teorema lui Lagrange pentru demonstrarea inegalităţii respective, înlocuind expresia:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

din inegalitate, cu f'(c). Noua formă a inegalităţii se demonstrează ţinând cont de faptul că $a < c < b$ şi de monotonia lui f'.

Un procedeu asemănător poate fi aplicat dacă în inegalitate se poate pune în evidenţă o expresie de forma $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$, utilizând teorema lui Cauchy.

EXEMPLE:

1. Utilizând teorema lui Lagrange, să se arate că:

$$\frac{b - a}{b} < \ln\frac{b}{a} < \frac{b - a}{a}, \quad \text{dacă} \quad 0 < a < b.$$

Rezolvare: Parcurgem următoarele etape:

(a) Punem în evidenţă o expresie de forma $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ observând că $\ln\frac{b}{a} = \ln b - \ln a$ şi împărţind cu $b - a$. Inegalitatea devine:

$$\frac{1}{b} < \frac{\ln b - \ln a}{b - a} < \frac{1}{a}$$

(b) aplicăm teorema lui Lagrange funcţiei $f(x) = \ln x$ pe intervalul $[a,b]$. Există $c \in (a,b)$ astfel încât:

$$\frac{\ln b - \ln a}{b - a} = f'(c) = \frac{1}{c}$$

(c) inegalitatea devine:

$$\frac{1}{b} < \frac{1}{c} < \frac{1}{a}$$

Această nouă formă a inegalităţii se demonsrează ţinând cont de faptul că $a < c < b$ şi $f'(x) = \frac{1}{x}$ este descrescătoare.

2. Utilizând teorema lui Lagrange, să se arate că $e^x > 1 + x$ pentru orice $x \neq 0$.

Rezolvare:

Pentru a folosi teorema lui Lagrange, căutăm un interval [a,b] şi o funcţie astfel încât în inegalitatea noastră să putem pune în evidenţă raportul $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Pentru aceasta observăm că dacă $x \neq 0$, avem două situaţii:

(1) $x > 0$. În acest caz putem considera intervalul [0,x].

(a) Punem în evidenţă în inegalitatea dată o expresie de forma: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ observând că dacă $x > 0$, avem $e^x > 1 + x$ <=> <=> $\frac{e^x - 1}{x} > 1$.

(b) Aplicăm teorema lui Lagrange funcţiei $f(t) = e^t$ pe intervalul [0,x]. Există $c \in (0,x)$ astfel încât $\frac{e^x - 1}{x} = f'(c) = e^c$.

(c) Inegalitatea devine: $e^c > 1$.

Această formă a inegalităţii se demonsrează ţinând cont că: $0 < c < x$, iar derivata $f'(x) = e^x$ este crescătoare (deci $e^0 < e^c$).

(2) Dacă $x < 0$ demonstraţia se face analog.

Metoda 2: Metoda minimului

Această metodă se bazează pe observaţia că dacă x_o este un punct de minim global (cel mai mic minim) pentru o funcţie h pe un domeniu $\mathbb{D}$ şi dacă $h(x_o) \geq 0$ (cea mai mică valoare a lui h este nenegativă), atunci $h(x) \geq 0$ pentru orice $x \in \mathbb{D}$ (toate valorile lui h sînt nenegative). Putem demonştra deci inegalităţi

de forma: $f(x) \geq g(x)$ adică $f(x) - g(x) \geq 0$, cu alte cuvinte, de forma: $h(x) \geq 0$.

Exemplu: Utilizând metoda minimului, să se arate că $e^x > 1 + x$ pentru orice $x \neq 0$.

Rezolvare: Pentru a utiliza această metodă procedăm astfel:

(a) Scriem inegalitatea sub forma: $h(x) \geq 0$:

$$e^x > 1 + x \iff e^x - x - 1 > 0$$

(b) Fie $h(x) = e^x - 1 - x$. Cu ajutorul tabelului de variație calculăm minimul global (cel mai mic minim) al lui h :

x	$-\infty$							0								$+\infty$
h'(x)	-	-	-	-	-	-	-	0	+	+	+	+	+	+	+	+
h(x)		↘		↘		↘		0	↗			↗			↗	

Din tabel se observă că h are un singur minim, în $x = 0$, deci acesta este și minimul global. Valoarea sa este $h(0) = 0$. Deci pentru $x \neq 0$, avem $h(x) > 0$.

Metoda 3: (Inegalități pentru integrale, fără calculul integralelo

Pentru demonstrarea unor inegalități de forma:

$$\alpha \leq \int_a^b f(x)\, dx \leq \beta$$

fără a calcula integrala, se folosește observația că dacă m, respectiv M, sunt valorile de minim și de maxim global ale lui f pe intervalul [a,b], avem:

$$m \leq f(x) \leq M \quad \text{pentru orice } x \in [a,b]$$

şi deci integrând, obţinem:

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a)$$

deci pentru demonstrarea inegalităţii propuse, mai trbuie demonstrate inegalităţile (numerice):

$$\alpha \le m(b-a) \quad \text{şi} \quad M(b-a) \le \beta$$

Exemplu: Să se arate că:

$$2\sqrt{e} \le \int_0^1 e^{x^2}dx + \int_0^1 e^{1-x^2}dx \le 1+e$$

Rezolvare: (a) Inegalitatea pote fi scrisă sub forma:

$$2\sqrt{e} \le \int_0^1 \left(e^{x^2} + e^{1-x^2} \right) dx \le 1+e$$

(b) Cu ajutorul tabelului de variaţie calculăm minimul şi maximul global al funcţiei $f(x)' = e^{x^2} + e^{1-x^2}$ pe intervalul [0,1] :

x	0				$\frac{1}{\sqrt{2}}$			1
f'(x)	0	−	−	−	0	+	+	+
f(x)	1 + e	↘	↘		$2\sqrt{e}$	↗	↗	1 + e

Avem deci , $m = 2\sqrt{e}$ şi $M = 1+e$.

(c) Integrăm inegalităţile $m \le f(x) \le M$ pe intervalul [a,b] şi obţinem:

$$\int_0^1 2\sqrt{e}\,dx \le \int_0^1 f(x)\,dx \le \int_0^1 (1+e)\,dx \quad <=>$$

$$<=> \quad 2\sqrt{e} \le \int_0^1 f(x)\,dx \le 1+e \ .$$

Metoda 4: Utilizarea inegalității din definiția funcțiilor convexe (concave)

Fie I un interval pe axa reală.

Definiție: Funcția $f:I \longrightarrow \mathbb{R}$ este convexă pe I dacă între orice două puncte $x_1, x_2 \in I$ graficul lui f se află sub coarda ce unește punctele de abscise x_1 și x_2.



Fig. 6.1

Cu notațiile din desenul alăturat, această condiție se exprimă prin inegalitatea: $f(x) \leq y$.

Pentru a explicita pe x și pe y, observăm că:

1. x este în intervalul $[x_1, x_2]$ dacă și numai dacă se poate scrie sub forma:

$$x = \alpha \cdot x_1 + (1 - \alpha) \cdot x_2 \ , \quad \text{cu} \quad \alpha \in [0,1] \qquad (E.I.1)$$

Într-adevăr, dacă $x \in [x_1, x_2]$ este suficient să luăm $\alpha = (x - x_2)/(x_1 - x_2)$ pentru a avea satisfăcută egalitatea dorită.

Reciproc, dacă x are exprimarea din (E.I.1), pentru a arăta că $x \in [x_1, x_2]$ trebuie verificat sistemul de inegalități:

$$\begin{cases} \alpha \cdot x_1 + (1-\alpha)\cdot x_2 \geq x_1 \\ \alpha \cdot x_1 + (1-\alpha)\cdot x_2 \leq x_2 \end{cases}$$

Prima inegalitate este echivalentă cu $\alpha \leq 1$, iar a doua inegalitate este echivalentă cu $\alpha \leq 0$.

Observatie: Condiția $\alpha \in [0,1]$ din (E.I.1) este deci esențială.

Inegalitatea din definiția convexității devine:

$$f\left(\alpha \cdot x_1 + (1-\alpha)\cdot x_2\right) < y$$

2. Pentru a-l exprima și pe y observăm că:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x} = \frac{CA}{CB} = \frac{y - f(x_1)}{f(x_2) - y}$$

deci:

$$\frac{\alpha \cdot x_1 + (1-\alpha)\cdot x_2 - x_1}{x_2 - \alpha \cdot x_1 - (1-\alpha)\cdot x_2} = \frac{y - f(x_1)}{f(x_2) - y}$$

de unde rezultă:

$$y = \alpha \cdot f(x_1) + (1-\alpha)\cdot f(x_2)$$

Înlocuind pe x și pe y, obținem:

$f:I \longrightarrow \mathbb{R}$ este convexă <=>

$$<=> \left[\forall\, x_1, x_2 \in I \quad \forall\, \alpha \in [0,1] \quad f\left(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2\right) < \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2)\right]$$

$f:I \longrightarrow \mathbb{R}$ se spune că este concavă dacă pentru orice $x_1, x_2 \in I$, între punctele de abscise x_1 și x_2 graficul funcției f este deasupra corzii ce unește aceste puncte, adică:

$$\forall\, x_1, x_2 \in I \quad \forall\, \alpha \in [0,1] \quad f\left(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2\right) > \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2)$$

Se ştie că putem verifica convexitatea şi concavitatea unei funcţii de două ori derivabile pe un interval cu ajutorul derivatei a doua:

$f''(x) > 0$ pe I $\Leftrightarrow$ f convexă pe I

$f''(x) < 0$ pe I $\Leftrightarrow$ f concavă pe I

Utilizând cele două moduri de exprimare a convexităţii putem formula şi demonstra unele inegalităţi.

Exemplu: Să se arate că pentru orice x_1 şi x_2 din $\mathbb{R}$ avem:

$$e^{\frac{x_1 + x_2}{2}} \leq \frac{e^{x_1} + e^{x_2}}{2}$$

Rezolvare: Funcţia $f(x) = e^x$ este convexă pe $\mathbb{R}$ $(f''(x) > 0)$, deci:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \quad \forall \alpha \in (0,1) \quad f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2)$$

de unde pentru $\alpha = \frac{1}{2}$ obţinem inegalitatea din enunţ.

EXERCITII:

I. Să se arate că:

1. $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ pentru orice $x \in [-1,1]$

2. $\operatorname{arcctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & x \in (-\infty, 0) \\ \frac{\pi}{2} & x \in (0, \infty) \end{cases}$

3. $2\operatorname{arctg} x + \arcsin \frac{2x}{1 + x^2} = \begin{cases} \pi & x \in [1, \infty) \\ -\pi & x \in (-\infty, -1] \end{cases}$

4. $\arcsin \frac{\cos\sqrt{x} + \sqrt{3} \cdot \sin\sqrt{x}}{2} - \sqrt{x} = \frac{\pi}{6}$, $x \in [0, 1 - \frac{\pi}{6}]$

5. Pentru intervalele $I_1, I_2 \subset \mathbb{R}$ să considerăm funcţiile con-

tinue şi injective $f:I_1 \longrightarrow \mathbb{R}$, $g:I_2 \longrightarrow \mathbb{R}$ şi constanta c în interiorul lui $f(I_1)$. Din condiţia $f(u(x)) = c + g(x)$ rezultă $u(x) = f^{-1}(c + g(x))$ pentru orice x care îndeplineşte condiţia $c + g(x) \in f(I_1)$. Utilizând această observaţie, să se construiască egalităţi de forma $h(x) = c$ pentru:

(a) $f(x) = \arccos x$, $g(x) = x^2$

(b) $f(x) = \operatorname{tg} x$, $g(x) = 3x + 2$

(c) $f(x) = e^{x+1}$, $g(x) = \operatorname{tg} x$

Răspuns: (a) Avem $f:[-1,1] \longrightarrow \mathbb{R}$, $f([-1,1]) = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $g:[0,\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$. Determinăm funcţia u din condiţia: $f(u(x)) = c + g(x)$ care devine $\arccos u(x) = c + x^2$, deci $u(x) = \cos(c + x^2)$. Pentru $c = \frac{\pi}{4}$ de exemplu avem $u(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos x^2 - \sin x^2\right)$, iar din condiţia: $\frac{\pi}{4} + x^2 \in [-1,1]$ deducem $x \in \left[-\sqrt{1 - \frac{\pi}{4}}, \sqrt{1 - \frac{\pi}{4}}\right]$ şi deci avem:

$$\arccos \frac{\sqrt{2}\left(\cos x^2 - \sin x^2\right)}{2} - x^2 = \frac{\pi}{4} ,$$

$$x \in \left[-\sqrt{1 - \frac{\pi}{4}}, \sqrt{1 - \frac{\pi}{4}}\right]$$

II. Utilizând teorema lui Lagrange, să se demonstreze inegalităţile:

1. $\frac{b - a}{\sin^2 b} < \operatorname{ctg} a - \operatorname{ctg} b < \frac{b - a}{\sin^2 a}$, $[a,b] \subset \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

2. $\frac{b - a}{\sin^2 a} < \operatorname{ctg} a - \operatorname{ctg} b < \frac{b - a}{\sin^2 b}$, $[a,b] \subset \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

3. $\frac{x + 1}{x + 2} < \ln(x + 2) < x + 1$, $x > -1$

4. $e^{\frac{x_1 + x_2}{2}} < \frac{e^{x_1} + e^{x_2}}{2}$, $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

5. $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$, $n > 1$

6. Utilizând teorema lui Cauchy aplicată funcţiilor:

$f(t) = (1 + t)\ln(1 + t)$, $g(t) = \operatorname{arctg} t$, $f, g:[0, x] \longrightarrow \mathbb{R}$

să se arate că $\ln(1 + x) > \frac{\operatorname{arctg} x}{1 + x}$, pentru $x > 0$.

III. Utilizând metoda minimului să se demonstreze inegalităţile:

1. $\frac{\pi}{2} < 2x \cdot \arcsin x + 2\sqrt{1 + x^2} - x^2 < \pi - 1$, $x \in (-1, 1)$

2. $-3 < 2\cos x - \cos 2x < \frac{3}{2}$, $x \in \mathbb{R}$

3. $\ln\left(1 + 2x + 2x^2\right) > -\frac{1}{2}$, $x \in \mathbb{R}$

4. $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$, $x > 0$

5. $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1 + x) < x$, $x > 0$

6. $\sin x > \frac{x}{x + 1}$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

7. $2\left(1 + x^{n+1}\right)^n > \left(1 + x^n\right)^{n+1}$, $x > 0$, $n \in \mathbb{N}$

IV. Fără a calcula integralele, să se arate că:

1. $\frac{1}{3} < \int_4^7 \frac{x - 3}{x + 5}\, dx < 1$

2. $1 < \int_0^1 e^{x^2} dx < e$

3. $\frac{16}{3} < \int_4^6 \frac{x^2}{x + 2}\, dx < 9$

4. $\sqrt{10} < \int_{-4}^{-3} \sqrt{x^2 + 1}\, dx < \sqrt{17}$

5. $0 < \int_{-\frac{1}{2}}^{0} x \ln\left(1 + x^2\right) dx < \frac{1}{4} \ln \frac{4}{3}$

6. $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{-\sin x}\, dx < \frac{\pi}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right)$

7. $\int_{0}^{\ln \pi} \sin e^x\, dx < \pi - 1$

V. Fără a calcula integrala, să se arate care din următoarele integrale are valoare mai mare:

1. $\int_{1}^{2} \ln(1 + x)\, dx$ sau $\int_{1}^{2} \frac{x}{x + 1} dx$

2. $\int_{2}^{10} x \cdot \operatorname{arctg} x\, dx$ sau $\int_{2}^{10} \ln\left(1 + x^2\right) dx$

3. $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\, dx$ sau $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+1} x\, dx$

Indicație: Utilizând metoda minimului se demonstrează inegalități de forma $f_1(x) < f_2(x)$ sau $f_1(x) > f_2(x)$ pe intervalele considerate. Integrăm apoi inegalitatea obținută.

VI. 1. Dacă $f: I \longrightarrow \mathbb{R}$ eate convexă, atunci pentru orice $x_1, x_2, \ldots, x_n \in I$, avem inegalitatea (lui Jensen):

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2) + \ldots + f(x_n)}{n}$$

(Manual)

2. Utilizând inegalitatea lui Jensen aplicată funcției con-

vexe $f(x) = e^x$, să se demonstreze inegalitatea mediilor:

$$\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}$$

3. Să se arate că pentru orice $x_1, x_2, \ldots x_n \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ avem:

$$\sin \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n} \geq \frac{\sin x_1 + \sin x_2 + \ldots + \sin x_n}{n}$$

$$\cos \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n} \geq \frac{\cos x_1 + \cos x_2 + \ldots + \cos x_n}{n}$$

Care sunt domeniile maxime ce conţin pe zero, în care au loc aceste inegalităţi ? Daţi exemple de alte domenii, ce nu conţin originea şi în care au loc inegalităţile de mai sus. În ce domenii au loc inegalităţile inverse ?

4. Utilizând concavitatea funcţiei logaritmice demonstraţi că pentru orice $x_1, x_2, \ldots, x_n > 0$ avem:

$$x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n \leq \left(\frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}\right)^n$$

5. Arătaţi că funcţia $f(x) = x^\alpha$, $\alpha > 1$, $x > 0$ este convexă. Utilizând această proprietate arătaţi că pentru orice numere nenegative $x_1, x_2, \ldots, x_n$ are loc inegalitatea:

$$(x_1 + x_2 + \ldots + x_n)^\alpha \leq n^{\alpha-1}(x_1^\alpha + x_2^\alpha + \ldots + x_n^\alpha)$$

6. Aplicând inegalitatea lui Jensen funcţiei $f(x) = x^2$ să se arate că pentru orice $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$, avem:

$$(x_1 + x_2 + \ldots + x_n)^2 \leq n \cdot (x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2).$$

Ce inegalitate analoagă se poate deduce din funcţia convexă

$f(x) = x^3$, pentru $x \geq 0$? Dar din funcţia concavă $f(x) = x^3$, pentru $x \leq 0$?

7. Aplicând inegalitatea lui Jensen pentru funcţia convexă $f(x) = \frac{1}{x}$, pentru $x > 0$, arătaţi că dacă:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$$

este un polinom cu toate rădăcinile reale şi pozitive, avem:

$n^2 \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}} \geq \frac{a_1}{a_0}$. Ce se poate spune dacă polinomul are toate rădăcinile reale şi negative ?

REZOLVARI:

2. Comparând membrul drept al inegalităţii de demonstrat cu membrul drept al inegalităţii lui Jensen, deducem că punctele $x_1, x_2, \ldots, x_n$ se determină din condiţiile:

$$f(x_1) = a_1 \,,\; f(x_2) = a_2 \,,\; \ldots \,,\; f(x_n) = a_n$$

Avem:

$$e^{x_1} = a_1 \Rightarrow x_1 = \ln a_1 \text{ şi, în general, } x_i = \ln a_i$$

Cu aceste puncte inegalitatea lui Jensen, pentru $f(x) = e^x$, devine:

$$e^{\frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \ldots + \ln a_n}{n}} < \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}$$

Făcând calculele în membrul sting, se obţine inegalitatea mediilor .

3. Pe intervalul $\left[0 \,,\, \frac{\pi}{2} \right]$ funcţiile sin x şi cos x sunt concave. Cel mai mare interval ce conţine originea şi în care este este concavă sin x este intervalul $[0,\pi]$. Pe $[\pi,2\pi]$ de exemplu aceeaşi funcţie este convexă, deci inegalitatea din enunţ se schimbă.

7. P R I M I T I V E

CONEXIUNI CU ALTE NOTIUNI SPECIFICE FUNCTIILOR

Definiţie: Funcţia $f:I \longrightarrow \mathbb{R}$ are primitive pe intervalul I dacă există o funcţie $F:I \longrightarrow \mathbb{R}$ derivabilă şi $F'(x) = f(x)$ pe I.

Se ştie că două primitive diferă printr-o constantă:

$$F_1(x) = F_2(x) + C$$

Mulţimea tuturor primitivelor se numeşte integrala nedefinită a funcţiei f şi se notează cu:

$$\int f(x)\,dx$$

Pentru a putea enunţa metoda prin care se poate arăta că o funcţie are primitive şi metoda pentru a arăta că o funcţie nu are

primitive , amintim o parte dintre legăturile care există între principalele noțiuni de analiză matematică studiate în liceu, relativ la funcții:

1. LIMITA
2. CONTINUITATEA
3. DERIVABILITATEA
4. PROPRIETATEA LUI DARBOUX
5. PRIMITIVA
6. INTEGRALA

Legăturile între aceste noțiuni sunt date de următoarele proprietăți:

P_1) Orice funcție continuă într-un punct x_0 are limită în acest punct: $C \longrightarrow L$

P_2) Orice funcție derivabilă într-un punct x_0 este continuă în acest punct: $D \longrightarrow C$

P_3) Orice funcție continuă pe [a,b] are proprietatea lui Darboux pe [a,b]: $C \longrightarrow Darb.$

P_4) Orice funcție continuă pe [a,b] are primitive pe [a,b]: $C \longrightarrow P$

P_5) Orice funcție continuă pe [a,b] este integrabilă pe [a,b]: $C \longrightarrow I$

P_6) Orice funcție care are primitive pe [a,b] are proprietatea lui Darboux pe [a,b]: $P \longrightarrow Darb.$

P_7) Dacă o funcție are proprietatea lui Darboux pe [a,b], atunci în orice punct x_0 în care limita (limita laterală) există, ea este egală cu $f(x_0)$.

Consecințe: 1. O funcție cu proprietatea lui Darboux (deci o funcție care admite primitive) nu poate avea într-un punct x_o limită (limită laterală) infinită.

Funcțiile pentru care cel puțin o limită laterală este infinită sau diferă de $f(x_o)$ nu au primitive .

2. Dacă f are proprietatea lui Darboux pe [a,b] și x_o este un punct de discontinuitate, CEL PUȚIN O LIMITA LATERALA NU EXISTA.

Darb. + x_o discont. ======> $\nexists\, l_s(x_o)$ sau $\nexists\, l_d(x_o)$

Datorită implicațiilor de mai sus, putem forma tabloul:



OBSERVAȚIE: Dacă x_o este un punct de discontinuitate pentru f, este posibilă una din următoarele situații:

(1) limitele laterale există și sunt finite

(2) o limită laterală este finită, cealaltă este infinită

(3) ambele limite laterale sunt infinite

(4) o limită laterală este infinită, cealălaltă nu există

(5) o limită laterală este finită, cealălaltă nu există

(6) ambele limite laterale nu există

DINTRE TOATE FUNCŢIILE DISCONTINUE ÎN CEL PUŢIN UN PUNCT, SINGURELE CARE EVENTUAL AU PRIMITIVE SUNT ACELEA PENTRU CARE CEL PUŢIN O LIMITA LATERALA NU EXISTA (IAR CEALALTA, DACA EXISTA, ESTE FINITA).

De asemenea, să observăm că deşi în cazul (1) funcţia nu are primitive pe [a,b] (nu are proprietatea lui Darboux) totuşi, dacă în plus limitele laterale sunt egale, atunci f are primitive pe $[a,b] \setminus \{ x_0 \}$, prin intermediul funcţiei f_p – prelungirea prin continuitate a restricţiei lui f la domeniul $[a,b] \setminus \{ x_0 \}$.

Exemplu: $f(x) = \begin{cases} a & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x} & x > 0 \end{cases}$ are proprietatea lui Darboux pentru orice $a \in [-1,1]$, dar nu are primitive dacă $a \neq 0$.

Într-adevăr, presupunând prin absurd că f are primitive, fie F o primitivă a sa. Atunci F trebuie să fie de forma:

$$F(x) = \begin{cases} a \cdot x + c_1 & x \leq 0 \\ \int \sin \frac{1}{x} dx + c_2 & x > 0 \end{cases}$$

Pentru a calcula $\int \sin \frac{1}{x} dx$ observăm că $\sin \frac{1}{x}$ provine din derivarea funcţiei $x^2 \cos \frac{1}{x}$. Într-adevăr,

$$\left(x^2 \cos \frac{1}{x} \right)' = 2x \cdot \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}$$

deci: $$\sin \frac{1}{x} = \left(x^2 \cos \frac{1}{x} \right)' - 2x \cdot \cos \frac{1}{x}$$ şi:

$$\int \sin \frac{1}{x} dx = \int \left(x^2 \cos \frac{1}{x} \right)' dx - 2 \int x \cdot \cos \frac{1}{x} dx =$$

$$= x^2 \cos \frac{1}{x} - 2 \int x \cos \frac{1}{x} dx \ .$$

Funcţia $g(x) = x \cos \frac{1}{x}$ are primitive pe $(0,\infty)$, deoarece este continuă pe acest interval, dar nu are primitive pe $[0,\infty)$ (ne interesează ca intervalul să fie închis la zero pentru a putea studia continuitatea şi derivabilitatea lui F).

Observăm că deoarece $\lim_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} g(x) = 0$, putem considera prelungirea sa prin continuitate:

$$g_p(x) = \begin{cases} x \cdot \cos \frac{1}{x} & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Această funcţie fiind continuă pe $[0,\infty)$, are primitive pe acest interval. Fie G una dintre aceste primitive. Atunci:

$$\int \sin \frac{1}{x} dx = x^2 \cos \frac{1}{x} - 2 \cdot G(x)$$ şi:

$$F(x) = \begin{cases} \alpha \cdot x + C_1 & x < 0 \\ x^2 \cos \frac{1}{x} - 2 \cdot G(x) + C_2 & x > 0 \end{cases}$$

Punem condiţia ca F să fie continuă în $x_0 = 0$. Avem:

$$F(0) = l_s(0) = C_1 \ , \quad l_d(0) = -2 \cdot G(0) + C_2 \ ,$$

deci trebuie să avem $C_2 = C_1 + 2 \cdot G(0)$ şi atunci pentru primitivă obţinem următoarea formă:

$$F(x) = \begin{cases} a\cdot x + C_1 & x < 0 \\ x^2\cos\frac{1}{x} - 2\cdot G(x) + 2\cdot G(0) + C_1 & x > 0 \end{cases}$$

Punem condiția ca F să fie derivabilă în zero:

$$F'_s(0) = \lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \frac{F(x) - F(0)}{x} = a ,$$

$$F'_d(0) = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{x^2\cos\frac{1}{x} - 2G(x) + 2G(0) + C_1 - C_1}{x}$$

$= -2 \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{G(x) - G(0)}{x} = -2G'(0)$ deoarece G este derivabilă în zero.Avem $G'(0) = g_p(0) = 0$ (G este o primitivă a lui g_p),deci $F'_d(0) = 0$. Prin urmare F nu este derivabilă în zero dacă $a \neq 0$.

Observație: Pentru studiul derivabilității am menționat două metode: utilizarea definiției și utilizarea corolarului teoremei lui Lagrange. Să observăm că în exemplul de mai sus nu putem utiliza corolarul teoremei lui Lagrange deoarece nu există $\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} F'(x)$.

Tabloul de la pagina 193 ne permite să formulăm metode pentru a arăta că o funcție are primitive și metode pentru a arăta că o funcție nu are primitive.

Vom enunța aceste metode și le vom exemplifica,în primul rând cu exerciții din manualul de analiză matematică cls. XII,pentru a sublinia astfel necesitatea familiarizării cu diversele noțiuni întâlnite în manualele de liceu.

(A) Metoda pentru a arăta că o funcție are primitive

Primele trei metode se deduc din tablou utilizînd implicații de forma a $\longrightarrow$ b :

(EP_1) Arătăm că funcţia este derivabilă.

(EP_2) Arătăm că funcţia este continuă.

(EP_3) Construim primitiva.

(EP_4) Arătăm că funcţia este o sumă de funcţii care admit primitive.

De reţinut că metoda EP_2 este preferată metodei EP_1 deoarece este mai uşor de demonstrat continuitatea decât derivabilitatea,iar metoda EP_3 se foloseşte doar dacă într-un punct de discontinuitate funcţia nu are limită (este singura situaţie în care mai poate avea primitive).

(B) Metode pentru a arăta că o funcţie nu are primitive

Primele trei metode se deduc din acelaşi tablou utilizând echivalenţa: a $\longrightarrow$ b $\Longleftrightarrow$ non b $\longrightarrow$ non a.

Avem deci:





Deducem astfel următoarele metode pentru a arăta că o funcţie nu are primitive:

(NP_1) Arătăm că <u>într-un punct de discontinuitate</u> ambele limite laterale există şi sunt finite sau cel puţin o limită laterală este infinită.

(NP_2) Arătăm că funcţia nu are proprietatea lui Darboux.

(NP_3) Presupunem prin absurd că f are primitive şi obţinem o contradicţie.

(NP_4) Dacă f este suma a două funcţii, una admiţind primitive, cealaltă nu, rezultă că f nu are primitive.

Exemple:

(EP_2) $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^5} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

are primitive deoarece f este continuă.

$$(EP_3)\quad f(x) = \begin{cases} 2x\cdot\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Rezolvare: Observăm că $2x\cdot\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$ provine din derivarea funcției $x^2\sin\frac{1}{x}$, deci o primitivă a lui f trebuie să fie de forma:

$$F(x) = \begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x} + C & x \neq 0 \\ \alpha & x = 0 \end{cases}$$

Punem condiția ca F să fie continuă în zero:

$$l_s(0) = l_d(0) = \lim_{x\to 0}\left(x^2\sin\frac{1}{x} + C\right) = C\,,\quad F(0) = \alpha$$

deci $\alpha = C$ și avem:

$$F(x) = \begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x} + C & x \neq 0 \\ C & x = 0 \end{cases}$$

Punem condiția ca F să fie derivabilă în zero:

$$F'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x} + C - C}{x} =$$

$$= \lim_{x\to 0} x\cdot\sin\frac{1}{x} = 0$$ (ceva mărginit înmulțit cu ceva care tinde la zero, tinde la zero), deci F este derivabilă în zero. Dar trobuie să avem și $F'(0) = f(0)$, egalitate care este de asemenea indeplinită, deci f are primitive.

$$(EP_4)\quad f(x) = \begin{cases} \cos^2\frac{1}{x} & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \end{cases}$$

Avem: $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1 - \cos\frac{2}{x}}{2} & x \neq 0 \\ \dfrac{1}{2} & x = 0 \end{cases} = g(x) + h(x)$,

unde $g(x) = \dfrac{1}{2}$, iar $h(x) = \begin{cases} (\cos\frac{2}{x})/2 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$,

iar funcţiile g şi h admit primitive.

(NP_1) a) $f(x) = [x] - x$ nu are primitive pe $\mathbb{R}$ deoarece în puncte $x_0 = n$ este discontinuă şi ambele limite laterale sunt finite.

b) $f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \sin\frac{1}{x} - \frac{1}{x}\cos x & x > 0 \end{cases}$ nu are primitive deoarece $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} f(x) = -\infty$.

(NP_2) Funcţiile pentru care se utilizează această metodă în manual sunt de forma:

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & x \in \mathbb{Q} \\ h(x) & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

cu g şi h funcţii continue, $g \neq h$. Vom demonstra pe acest caz general că f nu are proprietea lui Darboux. Demonstraţia poate fi adaptată la orice caz particular.

Trebuie să demonstrăm că există un interval a cărui imagine prin f nu este un interval. Utilizăm cele două condiţii din ipoteză.

Rezolvarea exercitiului: Trebuie să demonstrăm că există un in-

terval a cărui imagine prin funcția f nu este un interval,utilizând cele două condiții din ipiteză.

Din condiția $g \neq h$ deducem că există cel puțin un punct x_0 în în care $g(x_0) \neq h(x_0)$.Atunci pentru ε suficient de mic intervalele $(g(x_0) - \varepsilon, g(x_0)+\varepsilon)$ și $(h(x_0)-\varepsilon, h(x_0)+\varepsilon)$ sunt disjuncte (vezi figura de mai jos).



Din condiția g și h continue în x_0 deducem:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_1 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad |x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow |g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad |x - x_0| < \delta_2 \Rightarrow |h(x) - h(x_0)| < \varepsilon$$

Considerând,după cum am mai spu pe ε suficient de mic pentru ca intervalele $(g(x_0) - \varepsilon , g(x_0) + \varepsilon)$ și $(h(x_0) - \varepsilon , h(x_0) + \varepsilon)$ să fie disjuncte,iar $\delta = \min\{\delta_1,\delta_2\}$,rezultă că imaginea prin funcția f a intervalului$(x_0 - \delta , x_0 + \delta)$ nu este un interval, deoarece:

$$x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap \mathbb{Q} \Rightarrow f(x) = g(x) \in (g(x_0)-\varepsilon, g(x_0)+\varepsilon)$$

$x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}) \Rightarrow f(x) = h(x) \in (h(x_0)-\varepsilon, h(x_0)+\varepsilon)$.

(NP_3) Această metodă presupune aceleaşi etape ca şi metoda EP_3.

(a) căutăm primitive pentru ramurile lui f şi obţinem o primă expresie a lui F;

(b) punem condiţia ca F să fie continuă în punctul (punctele) de legătură între ramuri;

(c) punem condiţia ca F să fie derivabilă în aceste puncte:

- dacă F este derivabilă şi $F'(x_0) = f(x_0)$, am parcurs metoda (EP_3).

- dacă F nu este derivabilă în x_0 sau $F'(x_0) \neq f(x_0)$, am parcurs metoda (NP_3).

(NP_4) $f(x) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ nu are primitive pe $\mathbb{R}$.

Într-adevăr, avem $f(x) = g(x) + h(x)$ cu

$$g(x) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad \text{şi} \quad h(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

iar g este continuă deci are primitive şi h are limite laterale finite în zero, deci nu are primitive. Dacă prin absurd f ar avea primitive, ar rezulta că $h(x) = f(x) - g(x)$ are primitive.

Rezolvarea problemelor în care se cere să se studieze dacă o funcţie are primitive se poate face conform schemei logice următoare:


START
f cont ?
DA
F ARE PRIMITIVE
STOP
NU
∃ $l_s(x_o)$ sau $l_d(x_o)$?
DA
(NP1)
F NU ARE PRIMITIVE
NU
f are P. Darboux ?
NU
(NP2)
DA
INCERCAM SA CONSTRUIM PRIMITIVA F
F deriv. ?
NU
(NP3)
DA
F'(x0) = f(x0) ?
NU
(NP3)
DA
(P3)

EXERCITII:

I. Utilizând metoda (EP_2), să se arate că următoarele funcţii au primitive pe $\mathbb{R}$:

1. $f(x) = \max(x, x^2)$

2. $f(x) = \begin{cases} a \cdot \ln(3 - x) & x < 1 \\ \dfrac{2^x - 2}{x - 1} & x > 1 \end{cases}$

3. $f(x) = \left| \left[x - \dfrac{1}{2} \right] - x \right|$

4. $f(x) = \min_{x \in \mathbb{Z}} | x - k |$

5. $f(x) = \begin{cases} \ln(1 - x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

6. $f(x) = \begin{cases} |x|^x & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$

7. $f(x) = \begin{cases} x \cdot \left| \ln|x| + x \right| & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$

8. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(n \cdot \arccos x)}{\sqrt{1 - x^2}} & x \in (-1,1) \\ n & x = 1 \text{ sau } x = -1 \end{cases}$

II. Utilizând metodele (EP_3) - (NP_3), să se studieze dacă următoarele funcţii au primitive:

1. $f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & x < 2 \\ 2x + 1 & x > 2 \end{cases}$

2. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\cos^2 \frac{1}{x}} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$

3. $f(x) = \max(1 - x , \ln x)$

4. $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{1}{x} & x < 0 \\ \operatorname{arctg}(a + x) & x > 0 \end{cases}$

5. $f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} & x < 0 \\ \operatorname{arctg} x & x > 0 \end{cases}$

6. $f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{x}\cos x & x > 0 \end{cases}$

7. $f(x) = \begin{cases} g'(x)\cdot\sin \frac{1}{g(x)} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$ dacă $g:\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

și satisface: $g(x) = 0 \iff x = 0$.

8. $f(x) = \begin{cases} |x - a|\cdot\sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

9. $f(x) = \begin{cases} \sin(\sin \frac{1}{x}) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

10. Produsul dintre o funcție h care admite primitive și o funcție g derivabilă cu derivata continuă este o funcție care admite primitive.

Ind.: Dacă H este primitiva lui h,atunci H.g' este continuă,deci

admite primitive.Fie G o primitivă a sa.Avem $(H.g - G)' = h.g$.

11. $f(x) = \begin{cases} g(x)\cdot \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ g fiind o funcție deri-

vabilă cu derivata continuă pe $\mathbb{R}$.

III. Utilizând metoda (NP_1), să se arate că următoarele funcții nu au primitive:

1. $f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} & x < 0 \\ \operatorname{arctg} x & x \geq 0 \end{cases}$

2. $f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos x & x > 0 \end{cases}$

3. $f(x) = \begin{cases} \inf\limits_{t \leq x} (t^2 - t + 1) & x < \frac{1}{2} \\ \sup\limits_{t \geq x} (-t^2 + t - 3) & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$

4. $f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{x} \sin x & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

IV. Utilizând metoda (NP_2), să se arate că următoarele funcții nu au primitive:

1. $f(x) = \begin{cases} 3x & x \in \mathbb{Q} \\ 2x^2 + 1 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

2. $f(x) = \begin{cases} \sin x & x \in \mathbb{Q} \\ \cos x & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

3. $f(x) = \begin{cases} \ln x & x \in \mathbb{Q} \\ e^x & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

4. $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & x \in \mathbb{Q} \\ \sqrt[3]{x} & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

5. $f(x) = \begin{cases} x \cdot [x] & x \in \mathbb{Q} \\ -x^2 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

Raspuns:

1. Funcţiile $g(x) = 3x$ şi $h(x) = 2x^2 + 1$ sunt continue pe $\mathbb{R}$ şi $g \neq h$. Vom arăta că f nu are proprietatea lui Darboux. Fie x_o un punct in care avem $g(x_o) = h(x_o)$, de exemplu $x_o = 2$. Avem $g(2) = 6$, $h(2) = 9$.

h - continuă in $x_o = 2$ <=>

<=> $\left[\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_1 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \ |x - 2| < \delta_1 \Rightarrow |3x - 6| < \varepsilon \right]$

g - continuă in $x_o = 2$ <=>

<=> $\left[\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \ |x - 2| < \delta_2 \Rightarrow |2x^2 + 1 - 9| < \varepsilon \right]$

Fie ε astfel incăt intervalele $(6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon)$ şi $(9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$ să fie disjuncte. De exemplu $\varepsilon = 1$ şi fie $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Atunci imaginea intervalului $(2 - \delta, 2 + \delta)$ prin f nu este un interval deoarece pentru $x \in \mathbb{Q} \cap (2 - \delta, 2 + \delta)$ avem $f(x) = 3x \in (5,7)$ iar pentru $x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap (2 - \delta, 2 + \delta)$ avem $f(x) = 2x^2 + 1 \in (8,10)$.

V. Utilizând metodele (EP_4) - (NP_4) să se studieze dacă următoarele funcţii admit primitive:

1. $f(x) = \begin{cases} \cos^3 \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

Indicație: $\cos \frac{3}{x} = 4 \cdot \cos^3 \frac{1}{x} - 3 \cos \frac{1}{x}$, deci $f(x) = g(x) + h(x)$,

cu:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} \cos \frac{3}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad \text{și} \quad h(x) = \begin{cases} 3 \cdot \cos \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

2. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1 + \sin x} \sin \frac{1}{x} & x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \setminus \{0\} \\ a & x = 0 \end{cases}$

Indicație: $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \setminus \{0\} \\ 0 \end{cases}$ +

$$+ \begin{cases} \frac{1}{1 + \sin x} \sin \frac{1}{x} \\ 0 \qquad\qquad x = 0 \end{cases}$$ Se obține $a = 0$.

3. $f(x) = \begin{cases} \sin^n \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, $n \in \mathbb{N}$.

8. INTEGRABILITATE

Integrala se defineşte cu ajutorul unei limite. Mult mai uşor înţelege aspectele teoretice referitoare la integrală acela care a înţeles de ce este nevoie să se renunţe acum la cele două mari categorii de limite avute în vedere până la acest nivel:

1. limita când x tinde la x_0
2. limita când n tinde la infinit

şi se introduce o altă categorie de limite:

3. limita când norma diviziunii tinde la zero.

Precizările care urmează sunt tocmai pentru lămurirea acestui aspect.

Teoria integralei a apărut dintr-o necesitate practică, aceea de a calcula aria cuprinsă între graficul unei funcţii şi axa Ox.

Fiind dată o funcţie mărginită şi (deocamdată) nenegativă $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ putem aproxima aria dorită cu ajutorul unor dreptunghiuri având baza pe Ox.

Pentru aceasta se consideră punctele:

$$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b \quad .$$

Mulțimea acestor puncte formează o diviziune a intervalului [a,b] și se notează cu Δ :

$$\Delta = \{ x_0 , x_1 , x_2 , \ldots , x_n \}$$

Fâșiile verticale realizate cu ajutorul punctelor x_i au aria la fel de greu de calculat ca și aria inițială, datorită conturului superior. Obținem dreptunghiuri dacă înlocuim contururile superioare cu segmente orizontale.



Fig. 8.1

Pentru ca aproximația astfel obținută pentru arie să fie rezonabilă este firesc ca aceste segmente orizontale să întâlnească graficul funcției. Observăm că o astfel de orizontală este unic determinată de un punct ξ_i aflat între x_{i-1} și x_i. Am obținut astfel dreptunghiurile cu care urmăream să aproximăm aria căutată.

Ariile dreptunghiurilor sunt:

$$(x_1 - x_0) \cdot f(\xi_1) \ , \ (x_2 - x_1) \cdot f(\xi_2) \ , \ \ldots \ , \ (x_n - x_{n-1}) \cdot f(\xi_n)$$

Suma acestor arii se numește <u>sumă Riemann</u> atașată funcției f, diviziunii Δ și punctelor intermediare ξ_i. Această sumă:

$$\sigma_{\Delta}(f,\xi) = (x_1 - x_0)f(\xi_1) + (x_2 - x_1)f(\xi_2) + ..$$

$$... + (x_n - x_{n-1})f(\xi_n) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1})f(\xi_i)$$

aproximează aria căutată.

Necesitatea introducerii celei de-a treia categorii de limite se datorește necesității ca aproximația să fie cât mai bună.

Și acum o întrebare: aproximația este mai bună atunci când:

(a) dreptunghiurile sunt din ce în ce mai multe

sau când

(b) dreptungiurile sunt din ce în ce mai înguste ?

Observăm că "dreptungiurile sunt din ce în ce mai multe" dacă și numai dacă n tinde la infinit, dar făcând pe n să tindă la infinit nu obținem o aproximație "din ce în ce mai bună". Într-adevăr, lăsând primul dreptunghi neschimbat, de exemplu, și mărind numărul de puncte de la el spre dreapta oricât de mult (făcând pe n să tindă la infinit)aproximația rămâne grosieră.Aproximația devine însă din ce în ce mai bună dacă "dreptungiurile sunt din ce în ce mai subțiri".

Pentru a trece de la această observație intuitivă la concretul matematic, observăm că dreptunghiurile sunt din ce în ce mai subțiri dacă "cel mai gros dintre ele" devine din ce în ce mai subțire.

Cea mai mare grosime a dreptunghiurilor determinate de o diviziune Δ se numește norma diviziunii Δ.

$$\| \Delta \| = \max\{ x_1 - x_0 , x_2 - x_1 , ... , x_n - x_{n-1} \} = \max_{i=1,n} (x_i - x_{i-1})$$

Așadar,

"aproximații cât mai bune" <=> "dreptunghiuri din ce în ce mai

subțiri" <=> "cea mai mare grosime tinde la zero" <=> "norma lui Δ tinde la zero" <=> $\| \Delta \| \longrightarrow 0$.

Aria porțiunii aflate între graficul funcției f și axa Ox este deci:

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sigma_{\Delta}(f,\xi)$$

Această limită se notează cu $\int_a^b f(x)\,dx$ și se numește integrala funcției f pe intervalul [a,b].

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sigma_{\Delta}(f,\xi)$$

Pentru funcții care nu sunt neapărat nenegative pe [a,b] integrala reprezintă diferența dintre aria aflată deasupra axei ox și aria aflată sub axa Ox:



$$\int_a^b f(x)\,dx = S_1 - S_2 + S_3$$

Prin urmare, pentru a obține aria porțiunii aflată între grafic și axa Ox, într-un astfel de caz trebuie considerat modulul lui f:

$$A = \int_a^b |f(x)|\, dx$$



Fig. 8.3

Revenind la afirmaţiile (a) şi (b) de mai sus, să observăm că: "dreptunghiurile sunt din ce în ce mai subţiri" => "dreptunghiurile sunt din ce în ce mai multe", adică (b) => (a).

Altfel spus, $\| \Delta \| \longrightarrow 0 \Rightarrow n \longrightarrow \infty$.

Reciproc însă nu este adevărat întotdeauna. De aceea nu putem renunţa la $\| \Delta \| \longrightarrow 0$ în favoarea lui $n \longrightarrow \infty$. Totuşi există un caz în care este valabilă şi implicaţia reciprocă: atunci când punctele diviziunii sunt echidistante:

$n \longrightarrow \infty \Rightarrow \| \Delta \| \longrightarrow 0$ pentru puncte echidistante

În aceste caz dreptunghiurile au aceeaşi dimensiune a bazei şi anume $x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$ pentru orice $i = 1,2,\ldots,n$, iar suma Riemann devine:

$$\sigma_\Delta(f,\xi) = \frac{b-a}{n}\left(f(\xi_1) + f(\xi_2) + \ldots + f(\xi_n) \right) =$$

$$= \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)$$

Pentru astfel de diviziuni are deci loc echivalenţa:

$$\| \Delta \| \longrightarrow 0 \iff n \longrightarrow \infty$$

care permite, după cum s-a văzut la metoda 16 de calcul a limitelor, utilizarea definiției integralei la calculul limitelor de șiruri.

Înainte de a enumera și exemplifica metodele pentru studiul integrabilității, să observăm că <u>dacă funcția este continuă,</u> printre sumele Riemann $\sigma_\Delta(f,\xi)$ ce se pot obține modificând doar înălțimile dreptunghiurilor (modificînd doar punctele intermediare ξ_i) există o cea mai mare și o cea mai mică sumă Riemann și anume suma Riemann având valoarea cea mai mare se obține alegând punctele $\xi_i \in [\, x_{i-1}, x_i]$ pentru care:

$f(\xi_i) = \sup \{ f(x) \mid x \in [\, x_{i-1}, x_i] \} = M_i$, iar suma Riemann cu valoarea cea mai mică se obține alegând punctele ξ_i pentru care:

$f(\xi_i) = \inf \{ f(x) \mid x \in [\, x_{i-1}, x_i] \} = m_i$. Notând cu $S_\Delta(f)$ și respectiv $s_\Delta(f)$ aceste sume (numite suma Darboux superioară, respectiv inferioară) avem:

$$S_\Delta(f) = \sum_{i=1}^{n} M_i (x_i - x_{i-1}) \quad \text{și} \quad s_\Delta(f) = \sum_{i=1}^{n} m_i (x_i - x_{i-1})$$

și $s_\Delta(f) \leq \sigma_\Delta(f,\xi) \leq S_\Delta(f)$ oricare ar fi diviziunea Δ (8.1)

Punctele ξ_i care realizează supremul, respectiv infimul lui f pe intervalele $[\, x_{i-1}, x_i]$ există deoarece se știe că o funcție continuă, pe un interval închis și mărginit este mărginită și își atinge marginile. Se știe (vezi teorema 37 din manualul de analiză matematică cls. XI) că o funcție este integrabilă dacă și numai dacă:

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \left(S_\Delta(f) - s_\Delta(f) \right) = 0 \qquad (8.2)$$

CONEXIUNI INTRE INTEGRABILITATE SI ALTE NOTIUNI SPECIFICE FUNCTIILOR

Pentru a formula astfel de conexiuni, completăm lista propozițiilor $P_1 - P_7$ enunțate in capitolul precedent, cu următoarele:

P_8) orice funcție integrabilă pe [a,b] este mărginită

P_9) orice funcție monotonă pe [a,b] este integrabilă

P_{10}) orice funcție continuă pe [a,b] este integrabilă

P_{11}) orice funcție care are pe [a,b] un număr finit de puncte de discontinuitate de speța intăi este integrabilă.

Demonstrația lui P_{10} rezultă din faptul că dacă unei funcții integrabile pe [a,b] îi modificăm valorile intr-un număr finit de puncte se obține tot o funcție integrabilă și din proprietatea de aditivitate față de interval a integralei:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

Utilizând propozițiile de mai sus putem realiza următorul tablou



iar tabolul cuprinzând implicații între toate noțiunile de care ne-am ocupat este următorul (l_1 și l_2 fiind una din limitele laterale):



METODE PENTRU A ARATA CA O FUNCTIE ESTE INTEGRABILA (RIEMANN) PE [a,b]

(I_1) utilizarea definiției

(I_2) arătăm că este continuă

(I_3) arătăm că are un număr finit de puncte de discontinuitate de speța întâi

(I_4) arătăm că este monotonă

(I_5) arătăm că funcția este sumă de funcții integrabile

METODE PENTRU A ARATA CA O FUNCTIE NU ESTE INTEGRABILA (RIEMANN) PE [a,b]

(NI_1) utilizarea definiției (arătăm că $\sigma_\Delta(f,\xi)$ nu are limită finită pentru $\| \Delta \| \longrightarrow 0$)

(NI_2) arătăm că funcția nu este mărginită

(NI_3) arătăm că funcția este suma dintre o funcție integrabilă și una neintegrabilă .

Exemple:

(I_1) (a) Utilizînd definiția integralei, să se arate că orice funcție derivabilă cu derivata mărginită pe [a,b] este integrabilă pe [a,b].

Rezolvare: Fie $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ derivabilă. Trebuie arătat că $\sigma_\Delta(f,\xi)$ are limită finită când $\| \Delta \| \longrightarrow 0$. Funcția dată fiind derivabilă, este continuă, deci are primitive. Fie F o

primitivă a sa. Funcţiei F îi putem aplica teorema lui Lagrange pe orice interval $[x_{i-1},x_i]$. Există deci $c_i \in (x_{i-1},x_i)$ astfel încât: $F(x_i) - F(x_{i-1}) = f(c_i)(x_i - x_{i-1})$. Rezultă:

$$\sigma_\Delta(f,\xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \big(f(c_i) - f(c_i) + f(\xi_i) \big)(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} f(c_i)(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=1}^{n} \big(f(\xi_i) - f(c_i) \big)(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \big(F(x_i) - F(x_{i-1}) \big) + \sum_{i=1}^{n} \big(f(\xi_i) - f(c_i) \big)(x_i - x_{i-1}) .$$

Calculăm separat cele două sume:

$$\sum_{i=1}^{n} \big(F(x_i) - F(x_{i-1}) \big) = \big(F(x_1) - F(x_0) \big) +$$

$$+ \big(F(x_2) - F(x_1) \big) + \ldots + \big(F(x_n) - F(x_{n-1}) \big) =$$

$$= F(x_n) - F(x_0) = F(b) - F(a).$$

Arătăm că a doua sumă tinde la zero cînd $\| \Delta \| \longrightarrow 0$. Pentru aceasta ţinem cont că f' este mărginită, adică există $M > 0$ astfel încât $|f'(x)| < M$ pentru orice x din [a,b] şi aplicăm funcţiei f teoreme lui Lagranğe, dar pe intervalele de extremităţi ξ_i şi c_i. Există θ_i între ξ_i şi c_i astfel încât:

$$f(\xi_i) - f(c_i) = (\xi_i - c_i) f'(\theta_i)$$

Rezultă deci:

$$|f(\xi_i) - f(c_i)| = |\xi_i - c_i| \cdot |f'(\theta_i)| < |\xi_i - c_i| \cdot M <$$

$$< \| \Delta \| \cdot M$$

Pentru a doua sumă avem deci:

$$\left| \sum_{i=1}^{n} \left(f(\xi_i) - f(c_i) \right)(x_i - x_{i-1}) \right| \leq$$

$$\sum_{i=1}^{n} \left| f(\xi_i) - f(c_i) \right| \cdot |x_i - x_{i-1}| \leq$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n} |\xi_i - c_i| \cdot M \cdot |x_i - x_{i-1}| \leq \sum_{i=1}^{n} \|\Delta\| \cdot M \cdot |x_i - x_{i-1}| =$$

$$= \|\Delta\| \cdot M \cdot \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) = \|\Delta\| \cdot M \cdot (b - a) \xrightarrow{\|\Delta\| \longrightarrow 0} 0 .$$

Condiția din ipoteza acestui exercițiu este foarte puternică După cum se știe, se poate arăta că o funcție care indeplinește doar condiția de continuitate este de asemenea integrabilă. Totuși procedeul aplicat in acest exercițiu poate fi adaptat ușor la majoritatea exercițiilor in care se cere să se arate că o funcție este integrabilă.

(b) Să se arate că $f(x) = \sin x$ este integrabilă pe orice interval [a,b]. (Manual)

Rezolvare: Vom adapta demonstrația precedentă.Funcția dată este derivabilă și cu derivata $f'(x) = \cos x$ mărginită.Fiind derivabilă este și continuă și are primitive.

. Fie F o primitivă a sa, $F(x) = -\cos x$, și fie $\Delta = (a = x_0 , x_1 , \ldots , x_n = b)$ o diviziune a lui [a,b]. Aplicăm teorema lui Lagrange funcției F pe fiecare interval $[x_{i-1}, x_i]$. Există $c_i \in (x_{i-1}, x_i)$ astfel incât:

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = f'(c_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) .$$

Funcția f are derivata mărginită: $|\cos x| \leq 1$ pentru orice x dim $\mathbb{R}$, deci și pentru orice x din [a,b]. Trebuie arătat că $\sigma_\Delta(f,\xi)$

are o limită finită cînd $\| \Delta \| \longrightarrow 0$. Vom arăta că această limită este (după cum se ştie) $F(b) - F(a) = - \cos b + \cos a$.

Avem:

$$\sigma_\Delta(f,\xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\cdot(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \big(f(c_i) - f(c_i) + f(\xi_i) \big)(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} f(c_i)(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=1}^{n} \big(f(\xi_i) - f(c_i) \big)(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \big(F(x_i) - F(x_{i-1}) \big) + \sum_{i=1}^{n} \big(f(\xi_i) - f(c_i) \big)(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= F(b) - F(a) + \sum_{i=1}^{n} \big(f(\xi_i) - f(c_i) \big)(x_i - x_{i-1}) .$$

Aplicând teorema lui Lagrange şi funcţiei $f(x) = \sin x$, pe intervalul determinat de punctele ξ_i şi c_i , deducem că există θ_i între ξ_i şi c_i astfel încât:

$$\sin \xi_i - \sin c_i = (\xi_i - c_i)\cdot\cos \theta_i \text{ , deci}$$

$$\left| \sum_{i=1}^{n} \big(f(\xi_i) - f(c_i) \big)(x_i - x_{i-1}) \right| \leq$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n} | f(\xi_i) - f(c_i) | \cdot | x_i - x_{i-1} | =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} | \sin \xi_i - \sin c_i | \cdot | x_i - x_{i-1} | =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} | \cos \theta_i | \cdot | \xi_i - c_i | \cdot | x_i - x_{i-1} | \leq \sum_{i=1}^{n} 1 \cdot \| \Delta \| \cdot | x_i - x_{i-1} | =$$

$$= \| \Delta \| \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) = \| \Delta \| \cdot (b - a) \xrightarrow[\|\Delta\| \longrightarrow o]{} 0 .$$

Deci: $\lim\limits_{\|\Delta\| \to o} \sigma_\Delta(f,\xi) = F(b) - F(a) = - \cos b + \cos a$.

(I_2) Funcţia: $f : [0 , 3] \longrightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \dfrac{\pi}{2 - x} & \text{dacă } x \in [0,2) \\ \pi/2 & \text{dacă } x = 2 \\ (e^{x-2} + x - 2)^{\ln\left(\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{2(x-2)}}} & \text{dacă } x \in (2,3] \end{cases}$$

este integrabilă. Într-adevăr, ea este continuă în orice punct $x \neq 2$ din domeniul de definiţie, fiind exprimată prin funcţii continue. Studiem continuitatea în $x = 2$:

$$l_s(2) = \lim_{\substack{x \to 2 \\ x<2}} f(x) = \operatorname{arctg} \frac{\pi}{0+} = \operatorname{arctg}(+\infty) = \frac{\pi}{2}$$

$l_d(2) = \lim\limits_{\substack{x \to 2 \\ x>2}} f(x) = \dfrac{\pi}{2} = f(2)$. Funcţia este continuă pe intervalul $[0,3]$, deci este ihtegrabilă.

(I_3) $f(x) = x - [x]$, $f : [0 , 2\sqrt{3}] \longrightarrow \mathbb{R}$ poate fi discontinuă doar în punctele în care $[x]$ este discontinuă. Acestea sunt de forma $x = n$, $n \in \mathbb{Z}$. Dintre acestea doar punctele 0 , 1 , 2 , 3 , sunt în domeniul funcţiei. Studiem limita în aceste puncte. Avem:

$l_s(1) = l_s(2) = l_s(3) = l_s(3) = 1$ şi

$l_d(0) = l_d(1) = l_d(2) = l_d(3) = 0$, deci funcţia are un număr finit de puncte de discontinuitate de speţa întâi, aşadar este integrabilă.

(I_4) Despre funcţia $f(x) = [x]$ putem spune că este integrabilă fie utilizând criteriul precedent, fie utilizând faptul că ea este monotonă pe orice interval $[a,b]$.

(I_3) Funcţia $f : [-1,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ prin $f(x) = \operatorname{sgn} x + |x| + [x]$ este integrabilă deoarece este suma a trei funcţii integrabile: $f_1(x) = \operatorname{sgn} x$ este integrabilă deoarece are un număr finit de puncte de discontinuitate (un singur punct, $x = 0$) şi discontinuitatea este de speţa întâi; funcţia $f_2(x) = |x|$ este integrabilă deoarece este continuă, iar funcţia $f_3(x) = [x]$ este integrabilă fiind monotonă (sau pentru că are un singur punct de discontinuitate şi el este de speţa întâi).

(NI_1) $$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0,1] \cap \mathbb{Q} \\ 1 & x \in [0,1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$$

nu este integrabilă deoarece alegând în suma Riemann:

$$\sigma_\Delta(f,\xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

punctele intermediare ξ_i raţionale, avem $f(\xi_i) = 0$, deci în acest caz $\sigma_\Delta(f,\xi) = \sum_{i=1}^{n} 0 \cdot (x_i - x_{i-1}) = 0$, iar dacă ξ_i sunt iraţionale, avem $\sum_{i=1}^{n} 1 \cdot (x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) = b - a$.

(NI_2) $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \in (0,1] \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

nu este integrabilă (Riemann) pe $[0,1]$ deoarece nu este mărginită.

(NI_3) $$f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{x} & x \in (0,1] \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

este suma funcţiilor $f_1(x) = x$ şi $f_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \in (0,1] \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

Dacă f ar fi integrabilă, din $f = f_1 + f_2$ ar rezulta $f_2 = f - f_1$ deci f_2 ar fi integrabilă pe $[0,1]$, ca sumă de două funcții integrabile.

EXERCITII:

I. Utilizând definiția, să se arate că următoarele funcții sunt integrabile:

1. $f(x) = e^x$
2. $f(x) = \operatorname{tg} x$
3. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$
4. $f(x) = \arcsin \frac{x}{2}$
5. $f(x) = \cos^2 x$
6. $f(x) = \sin 2x$

II. Studiați integrabilitatea funcțiilor:

1. $f(x) = \begin{cases} x & x \in [0,1] \\ x^2 & x \in (1,2] \end{cases}$

2. $f(x) = \sup_{t \in [0,1)} \left(t^2 - \frac{1}{2} \right)$

3. $f(x) = \max_{t \in [0,\pi]} (\sin t , \cos t)$

4. $f(x) = \lim_{n \to \infty} \frac{x^2 + x \cdot e^{nx}}{1 + e^{nx}}$

5. $f(x) = \begin{cases} x \cdot \left[\frac{1}{x} \right] & x \in (0,1] \\ a & x = 0 \end{cases}$

6. $f(x) = \begin{cases} \left[\ln \frac{1}{x} \right] & x \in [0,1] \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

7. $f(x) = \frac{4}{3^n} - x$, $f:[a,1] \longrightarrow \mathbb{R}$, $a \in (0,1)$

8. Funcția caracteristică a mulțimii $[0,1] \subset \mathbb{R}$.

9. $f(x) = \begin{cases} ax + b & x \in [-1,0] \\ cx + d & x \in (0,1] \end{cases}$

III. Pentru ce valori ale parametrilor a și b funcțiile de mai jos sunt integrabile ? Pentru ce valori ale parametrilor au primitive ?

1. $f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg}(\ln x) & x \in (0,1] \\ a & x = 0 \end{cases}$

2. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \left[\frac{1}{x}\right] = 2n + 1 \\ ax + b & \left[\frac{1}{x}\right] = 2n \end{cases}$

3. $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & x \in (0,1] \\ a & x = 0 \end{cases}$

4. $f(x) = \begin{cases} e^x \cos \frac{1}{x} & x \in (0,1] \\ \alpha & x = 0 \end{cases}$

5. $f(x) = \begin{cases} 1 & x = \frac{1}{n} \\ 0 & \text{in rest} \end{cases}$ $\qquad f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$, $\quad a \in (0,1)$

INDICATII:

1. $l_d(0) = -\frac{\pi}{2}$, deci pentru orice valoare a parametrului, funcția are o singură discontinuitate, de speța întâi pe $[0,1]$.

2. Pentru orice valoare a lui $a \in (0,1)$ funcția are un număr finit de puncte de discontinuitate de speța întâi.

4. Funcţia $e^x \cos \frac{1}{x}$ provine din derivarea lui $x^2 e^x \sin \frac{1}{x}$.

IV. 1. Arătaţi că orice funcţie continuă pe un inter/val [a,b] este integrabilă.

2. Adaptaţi demonstraţia de la punctul precedent pentru a arăta că funcţiile următoare sunt integrabile pe intervalul [0,1]:

(a) $f(x) = x^2$ (b) $f(x) = \sin x$ (c) $f(x) = e^x$

RASPUNSURI:

1. Vom arăta că $\lim_{\|\Delta\| \to 0} \left(S_\Delta(f) - s_\Delta(f) \right) = 0$

Avem:

$$S_\Delta(f) - s_\Delta(f) = \sum_{i=1}^{n} M_i (x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^{n} m_i (x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) .$$

unde $M_i = \sup \{ f(x) \mid x \in [x_i, x_{i-1}] \}$,

$m_i = \inf \{ f(x) \mid x \in [x_i, x_{i-1}] \}$. Folosim acum două proprietăţi ale funcţiilor continue pe un interval închis şi mărginit:

(1) o funcţie continuă pe un inteval închis şi mărginit este mărginită şi îşi atinge marginile; deci există $u_i, v_i \in [a,b]$ astfel încât $M_i = f(u_i)$, $m_i = f(v_i)$.

Prin urmare,

$$S_\Delta(f) - s_\Delta(f) = \sum_{i=1}^{n} \left(f(u_i) - f(v_i) \right)(x_i - x_{i-1})$$

Pentru evaluarea diferenţei $f(u_i) - f(v_i)$ utilizăm proprietatea:

(2) o funcţie continuă pe un interval închis şi mărginit este uniform continuă (vezi cap. 4, proprietatea 4.1), adică:

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 \quad \forall x_1, x_2 \in [a,b], \ | x_1 - x_2 | < \delta_\varepsilon \quad \Longrightarrow$

$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

Pentru a putea lua în locul lui x_1 pe u_i şi în locul lui x_2 pe v_i trebuie să considerăm o diviziune Δ având norma mai mică decât δ_ε (lucru posibil deoarece facem limita pentru $\|\Delta\| \longrightarrow 0$). Aşadar, presupunând $\|\Delta\| < \delta_\varepsilon$ avem $| f(u_i) - f(v_i) | < \varepsilon$, adică $M_i - m_i < \varepsilon$ şi deci:

$$S_\Delta(f) - s_\Delta(f) = \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) < \sum_{i=1}^{n} \varepsilon(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \varepsilon \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon(b - a).$$

Deoarece ε este arbitrar (de mic) deducem că:

$$S_\Delta(f) - s_\Delta(f) \xrightarrow[\|\Delta\| \longrightarrow 0]{} 0$$

deci funcţia este integrabilă.

2. Arătăm că $S_\Delta(f) - s_\Delta(f)$ tinde la zero cînd $\| \Delta \|$ tine la zero. Avem:

$$S_\Delta(f) - s_\Delta(f) = \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1})$$

unde $M_i = \sup \{ x^2 \mid x \in [x_{i-1}, x_i] \} = x_i^2$

$m_i = \inf \{ x^2 \mid x \in [x_{i-1}, x_i] \} = x_i^2$, deoarece pe intervalul [0,1] funcţia $f(x) = x^2$ este crescătoare. Deci:

$$S_\Delta(f) - s_\Delta(f) = \sum_{i=1}^{n} (x_i^2 - x_{i-1}^2)(x_i - x_{i-1})$$

Funcţia $f(x) = x^2$ este continuă pe [0,1], deci este uniform

continuă, adică:

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta_\varepsilon > 0 \quad \forall\, x_1, x_2 \in [0,1],\ |x_1 - x_2| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |x_2^2 - x_1^2| < \varepsilon$$

Considerând diviziunea Δ astfel incât $\|\Delta\| < \delta_\varepsilon$ (posibil deoarece $\|\Delta\| \longrightarrow 0$), avem $x_i^2 - x_{i-1}^2 < \varepsilon$, deci:

$$S_\Delta(f) - s_\Delta(f) = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon(x_i - x_{i-1}) = \varepsilon \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon(b - a).$$

Deoarece ε este arbitrar de mic, deducem că:

$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \left(S_\Delta(f) - s_\Delta(f) \right) = 0$, adică $f(x) = x^2$ este integrabilă pe $[0,1]$.

BIBLIOGRAFIE

T. ANDREESCU şi colectiv : *Probleme de matematica date la concursurile si examenele din 1983*,Tiparul executat de Intreprinderea Poligrafică "Banat" ,Timişoara,1984.

L. ARAMA , T. MOROZAN : *Probleme de calcul diferential si integral*,Ed. Tehnică,Bucureşti,1978.

C. AVADANEI, N. AVADANEI, C. BORS, C. CHIREA : *De la matematica elementara spre matematica superioara*,Ed. Acad. R.S.R, Bucureşti,1977.

D. M. BATINETU : *Probleme de matematica pentru treapta a doua de liceu*,Ed. Albatros,Bucureşti,1979.

D. M. BATINETU-GIURGIU,V. GHIORGHITA,I. V. MAFTEI,I. TOMESCU F. VORNICESCU : *Probleme date la olimpiadele de matematica pentru licee*.Ed. Stiinţifică,Bucureşti,1992.

D. BUSNEAG,I. MAFTEI : *Teme pentru cercurile si concursurile de matematica ale elevilor*,Ed. Scrisul Românesc,Craiova,1983.

A. CORDUNEANU,G. RADU,L. POP,V. GRAMADA : *Culegere de probleme de matematica*,Ed. Junimea,Iaşi,1972.

GH. CALUGARITA, V. MANGU : *Probleme de matematica pentru treapta I-a si a II-a de liceu*,Ed. Albatros,Bucureşti,1977.

M. COCUZ : *Culegere de probleme de matematica*,Ed. Acad. R.S.R. Bucureşti,1984.

N. DONCIU , D. FLONDOR : *Algebra si analiza matematica,culegere de probleme*,E.D.P. , Bucureşti, 1978.

M. GANGA : *Teme si probleme de matematica*,Ed. Tehnică, Bucureşti,1991.

B. R. GELBAUM,J. M. H. OLMSTED : *Contraexemple in analiza*, Ed. St. Bucureşti,1973.

I. GIURGIU ,F. TURTOIU : *Culegere de probleme de matematica*, E.D.P. ,Bucureşti,1980.

I. ILIESCU,B. IONESCU,D. RADU : *Probleme de matematica pentru admiterea in invatamantul superior*,E.D.P., Bucureşti,1976.

C. IONESCU-TIU,L. PIRSAN :*Calcul diferential si integral pentru admitere in facultate*,Ed. Albatros,Bucureşti,1975.

AL. LEONTE,C. P, NICULESCU : *Culegere de probleme de algebra si analiza matematica*,Ed. Scrisul Românesc,Craiova,1984.

I. A. MARON : *Problems in Calculus of one variable*,Mir Publishers,Moscow,1973.

A. S. MURESAN,V. MURESAN :*Probleme de algebra si analiza matematica,concursuri de admitere 1981 - 1990*,Ed. Tehnică, Bucureşti,1991.

C. NASTASESCU, C. NITA, M. BRANDIBURU, D. JOITA :*Exercitii si probleme de algebra*,E.D.P. , Bucureşti,1981.

C.P.NICOLESCU : *Analiza matematica*,Ed.Albatros,Bucureşti,1987.

C. P. NICOLESCU : Sinteze de matematică Ed. Albatros, Bucureşti,1990.

G. RIZESCU,E. RIZESCU : *Teme pentru cercurile de matematica din liceu*,Ed. Tehnică,Bucureşti,1977.

V. SCHNEIDER, GH. A. SCHNEIDER : *Culegere de probleme de analiza matematica pentru clasele XI - XII*,Ed. Hyperion-Apollo, Craiova,1993.

GH. SIRETCHI : *Exercitii de analiza matematica*,Tipografia Universităţii din Bucureşti,1975.

N. TEODORESCU, A. CONSTANTINESCU, M. MIHAI, L.PIRSAN, E.PERJERIU, A. POPESCU-ZORICA, P. RADOVICI-MARCULESCU, M.TENA : *Probleme din Gazete Matematica,Editie selectiva si metodologica*, Ed. Tehnică,Bucureşti,1984.

R. TRANDAFIR, AL. LEONTE : *Culegere de probleme si exercitii de matematica*,Ed. Junimea,Iaşi,1975.

* * * *Culegere de probleme pentru admiterea in invatamantul superior,Matematica,Fizica si Chimie*,Ed. St. Encicl. Bucureşti, ediţiile 1984 şi 1989.

* * * *Manualele de matematica de liceu,diverse editii.*

* * * *Colectia revistei Gazete Matematica.*

Tipărit la S.C. FEVRODEST-TIPO S.R.L.
Tel: 051 / 134662 , 134809

În această carte puteți găsi:

- metode pentru demonstrarea egalităților de mulțimi,
- metode pentru demonstrarea bijectivității funcțiilor,
- metode pentru studiul monotoniei șirurilor și funcțiilor,
- metode comune pentru calculul limitelor de șiruri și de funcții,
- metode specifice pentru calculul limitelor de șiruri,
- metode pentru studiul continuității și a derivabilității,
- metode pentru a determina existența rădăcinilor unei ecuații,
- aplicații ale teoremelor lui Fermat, Roile, Lagrange, Cauchy,
- metode pentru demonstrarea unor egalități și inegalități,
- metode pentru a arăta că o funcție are primitive,
- metode pentru a arăta că o funcție nu are primitive,
- metode pentru a arăta că o funcție este integrabilă,
- metode pentru a arăta că o funcție nu este integrabilă.

Autorii sunt cadre didactice universitare cu o bogată experiență didactică și activitate științifică recunoscută pe plan internațional.

*

* *

Comenzile le puteți face și cu plata ramburs, adresându-vă autorilor la C.P.811, Craiova (1100), Dolj.

Observațiile și sugestiile d-voastră le puteți trimite la aceeași adresă. Vă mulțumim.

ISBN: 973 - 96940 - 0 - 4